

二重時空理論： 通常時空と双対時空の間のねじれとしての重力

<https://github.com/hypernumbernet>

September 29, 2026

Abstract

一般相対性理論は、重力を単一の時空連続体の曲率として見ることを教えてきた。惑星の運動、光の遅れ、ブラックホールの鳴動は、その教えの成果である。しかし連続体がなぜ曲がるのか、なぜ同一の現象が加速度のもとで慣性として現れるのかは、そこでは問われない。本稿は連続体を原始の対象とすることを拒んで、その問いに答える。時空は自律的な舞台ではない。各質量粒子は、ミンコフスキーフレームの対を運ぶ。一つはわれわれが生き、測る通常時空であり、もう一つはそれに対して時間反転した双対時空で、間隔は同じである。重力とはその対のねじれであり、粒子自身に属する不整合である。

この描像から直ちに二つのことが従う。球対称質量の外側の幾何は、曲率を原始の対象とせず、二つのフレームの不整合として回復される。重力と慣性は同一の現象になる。自由落下は二つのフレームが揃った状態であり、加速度は、周囲の質量が源であるときに重力と呼ぶ、同じ不整合である。もしこの存在論が正しければ、世界の幾何は物質に先立たない。それはスピンや電荷と同様、粒子の属性であり、天空に見える曲率は双対フレームの集合的なねじれである。

1 はじめに

1915年の誕生以来、一般相対性理論はわれわれがもつ重力記述のうち最も成功したものである。水星の近日点、光の遅れ、重力波、ブラックホールの撮像は、すべてそれを物語る。しかし哲学的な不安は残る。なぜ物質は時空を曲げ、なぜ曲がった時空が物質の運動を支配するのか。アインシュタイン方程式は重力がどのように働くかを極めて精密に教える。連続体がなぜ曲がるのかは、そこでは問われない。この不安はマッハの原理と対峙するといっそう鋭くなる。物体の慣性は宇宙の物質の総体によって決まるべきであるのに対し、一般相対性理論は時空を、完全な空虚さの中でも存在しうる独立した連続体として扱う。

この隙間を埋めようとする一世紀の試みは、連続体そのものには手を触れなかった。時空は先験的に滑らかな多様体とされ、重力は計量の平坦さからのずれである。

本稿はその原始の対象を拒む。共有される単一の時空は存在しない。各質量粒子は、独自のミンコフスキーフレームの対を運ぶ。一つはわれわれが生き、測る通常時空である。もう一つは双対時空であり、前者に対して時間反転しており、間隔は同じである。重力と慣性は背景の曲率ではない。ある粒子に別の粒子との並行を求めるとき、これら二つのフレームが不整合になることである。

転換は存在論的である。標準描像では、時空が物質に運動を教え、物質が時空に曲がり方を教える。ここには自律的な時空は全くない。時空と呼ばれる自由度は、スピンや電荷と同様、粒子の内部属性である。巨視的世界の見かけの曲率は、隣り合う粒子の集合的な不整合である。

直ちに二つの帰結が従い、それらは数式を書く前に述べられる。第一に、球対称質量の外側の幾何は、曲率を原始の対象とせず、二つのフレームの不整合として回復される。第二に、重力と慣性は同一の現象である。自由落下は二つのフレームが揃った状態である。加速度はその揃いを破り、生じる不整合が慣性力である——周囲の質量が源であるときに重力と呼ぶ、同じねじれである。

これは一般相対性理論の修正ではない。提案する完成である。連続体は有用な巨視的フィクションのままである一方、時空の自由度は対をなし粒子局所的なものとして扱われる。

本稿はその順序で進む。第2節と第3節で二つのセクターと、それらを動かす変換を導入する。第4節で重力をその不整合として定義し、球対称質量の外側を回復する。第5節では同じ不整合から慣性を読み、等価原理を要請ではなくする。その描像を手にしたうえで、後続の節は幾何を強場域、核と原子の尺度、電磁気、銀河へと運ぶ。それらの読みは描像の上に築かれるものであり、描像の基礎ではない。第18節では存在論に立ち返り、それを試しうる観測へ戻る。

2 数学的基礎：16次元双四元数代数

二重時空理論全体は、ミンコフスキー時空（符号 $(-, +, +, +)$ ）上のクリフォード幾何代数 $Cl(3, 1)$ と標準的に同型である双四元数（二重四元数とも呼ばれる）の16実次元代数の中に構築される。この代数は、す

すべての質量粒子に内在的に付随する単一代数構造の中に、通常と双対という二つの可換なミンコフスキー時空の完全なコピーを自然に収容する。

2.1 双四元数代数

まずハミルトンの四元数代数の二つの独立したコピーから出発する。

- 生成子 i, j, k が $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k$, $ji = -k$ (巡回) を満たす主四元数、
- 生成子 I, J, K が同一の規則 $I^2 = J^2 = K^2 = -1$, $IJ = K$, $JI = -K$ (巡回) を満たす従四元数。

完全な双四元数代数はテンソル積 $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$ であり、二つの集合は厳密に可換である。

$$iI = Ii, iJ = Ji, iK = Ki, jI = Ij, \dots$$

得られる 16 個の実線形独立基底は

$$1, i, j, k, I, J, K, iI, iJ, iK, jI, jJ, jK, kI, kJ, kK.$$

2.2 $\text{Cl}(3,1)$ との明示的同型

次の 1 次 (ベクトル) 生成子の同定により、代数は $\text{Cl}(3,1)$ と同型である。

$$e_0 = j, \quad (\text{時間様基底ベクトル})$$

$$e_1 = kI, \quad e_2 = kJ, \quad e_3 = kK \quad (\text{空間様基底ベクトル}),$$

これは直ちに定義関係

$$e_0^2 = -1, \quad e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = +1, \quad \{e_\mu, e_\nu\} = 0 \quad (\mu \neq \nu).$$

を満たす。高次の元は標準的なクリフォード積に従う。特に：

$$\begin{aligned} 2 \text{ 次 (バイベクトル)} : \quad & e_0e_1 = iI, \quad e_0e_2 = iJ, \quad e_0e_3 = iK, \\ & e_3e_2 = I, \quad e_1e_3 = J, \quad e_2e_1 = K, \end{aligned}$$

$$3 \text{ 次 (トライベクトル)} : \quad e_1e_2e_3 = k, \quad e_0e_3e_2 = jI, \quad e_0e_1e_3 = jJ, \quad e_0e_2e_1 = jK,$$

$$\text{擬スカラー} : \quad e_0e_1e_2e_3 = i.$$

右乗算 i による時間反転の下で補完的となる「双対」基底は

$$\tilde{e}_0 = k = e_1e_2e_3, \quad \tilde{e}_1 = jI = e_0e_3e_2, \quad \tilde{e}_2 = jJ = e_0e_1e_3, \quad \tilde{e}_3 = jK = e_0e_2e_1,$$

で生成され、以下で導入する双対時空表示を与える。

この明示的同型により、16 次元双四元数代数はアドホックな構成ではなく、4 次元ミンコフスキー時空の幾何的に自然なクリフォード代数であることが明らかになる。それは通常セクターと双対セクターを区別しつつ完全なローレンツ構造を保つ内在的デュアリティで豊かになる。

クリフォード代数形の見かけの不規則性。例えば j だけが唯一の時間様ベクトル生成子であることや、空間基底が交差項優勢の kI, kJ, kK であることは偶然ではない。二つの時間反転したミンコフスキー時空のコピーを同時に符号化する構造の中で、3 次元物理空間の完全な回転対称性を保つために正確に存在する。この微妙な非対称性が、双対写像 $X \mapsto Xi$ が時間の矢を反転させても空間等方性を破らないことを可能にし、等価原理と、粒子内在的な双対フレーム間の相対ずれとしての重力学的ねじれの創発のための代数的基礎を与える。

2.3 粒子内在的な双対時空構造

各粒子は、双四元数代数内に符号化されたコンパクト化されたミンコフスキー時空の対を内在的に運ぶと仮定される。

- 通常時空：次の形のベクトルで表される

$$X = ctj + xkI + ykJ + zkK,$$

ミンコフスキーノルムは

$$X^2 = -(ct)^2 + x^2 + y^2 + z^2.$$

- 双対時空：次の形のベクトルで表される

$$X' = ct' k + x' jI + y' jJ + z' jK,$$

同一のミンコフスキーノルム

$$X'^2 = -(ct')^2 + x'^2 + y'^2 + z'^2.$$

二つの時空は双対写像

$$X' = Xi,$$

で結ばれ、時間の矢を反転させる。

$$(ct'j)i = ct(ji) = -ctk,$$

ミンコフスキーノルムは保たれる。Cl(3, 1) の擬スカラー $i = e_0e_1e_2e_3$ はすべての 1 次ベクトルと反可換 ($X \in \text{Cl}(3, 1)$ に対し $iX = -Xi$) であり $i^2 = -1$ を満たすため、ノルムは次のように変換される。

$$X'^2 = (Xi)(Xi) = X(iX)i = -X(Xi)i = -X^2 i^2 = -X^2 \cdot (-1) = X^2.$$

この双対構造はすべての粒子に内在的である。通常時空は標準的運動学を支配し、双対時空は重力と慣性の存在下で動学的に関連する補完的自由度を符号化する。二つの時空の存在により、ローレンツ変換、平行移動、そして重力の本性のより豊かな幾何解釈が可能となる。

3 運動学的構造：ローター、ブースト、平行移動

本節では理論の運動学的枠組みを展開する。通常セクターのローレンツブーストと双対セクターの楕円回転は、六つのバイベクトル $\{i\Gamma_a, \Gamma_a\}$ によって生成される。同軸対は可換であり、異軸対は必ずしもそうではない。ブーストは平方が +1 となるバイベクトルから生じ、ローターの $\cosh/\sinh$ 展開を与える。

3.1 通常時空におけるローター

運動学的構造を示すため、ラビディティ ϕ の x 方向ローレンツブーストを考える。生成バイベクトルは iI であり $(iI)^2 = i^2 I^2 = (-1)(-1) = +1$ を満たす。一般に通常セクターのブースト生成子 iI, iJ, iK は平方が +1 であり、双対セクターの回転生成子 I, J, K は平方が -1 である。同じ I, J, K は通常ミンコフスキーフレームの空間バイベクトル ($e_3e_2 = I, e_1e_3 = J, e_2e_1 = K$) であり、独立な第二の $\mathfrak{so}(3)$ コピーを与えるのではない。

対応するブーストローターはしたがって

$$R_{\text{usual}} = \exp\left(\frac{\phi}{2} iI\right).$$

生成子の正の平方により、指数は双曲関数へと自然に展開される。

$$R_{\text{usual}} = \cosh \frac{\phi}{2} + iI \sinh \frac{\phi}{2}.$$

このローターをサンドイッチ積で時空ベクトル $X = ctj + xkI + \dots$ に適用すると、正準ローレンツ変換が得られる。

$$\begin{aligned} ct'j + x'kI &= R_{\text{usual}} X R_{\text{usual}}^\dagger \\ &= \left[\cosh \frac{\phi}{2} + iI \sinh \frac{\phi}{2} \right] (ctj + xkI) \left[\cosh \frac{\phi}{2} - iI \sinh \frac{\phi}{2} \right] \\ &= (\gamma ct + \gamma vx)j + (\gamma x + \gamma vct)kI, \end{aligned}$$

ここで $\gamma = \cosh \phi$, $v/c = \tanh \phi$ 。通常ミンコフスキーベクトルの空間回転は、双対セクターの楕円ローターを生成するのと同じ $\Gamma_a \in \{I, J, K\}$ によって生成され、余分なローレンツコピーではない。

3.2 完全ローター

この基底上の最も一般の六パラメータ指数は

$$R_{\text{total}} = \exp \left(\frac{\phi_1}{2} iI + \frac{\phi_2}{2} iJ + \frac{\phi_3}{2} iK + \frac{\theta_1}{2} I + \frac{\theta_2}{2} J + \frac{\theta_3}{2} K \right),$$

である。ここでパラメーター ϕ_a は通常セクターのブーストを、 θ_a は双対セクターの回転を支配する。第2節の空間バイベクトルを $\Gamma_1 = I, \Gamma_2 = J, \Gamma_3 = K$ と書く。因数分解 $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ は自動的ではない。二つの和項が可換であることを要する。同軸では可換である： $[i\Gamma_a, \Gamma_a] = 0$ 。したがって

$$\exp \left(\frac{\phi}{2} i\Gamma_a + \frac{\theta}{2} \Gamma_a \right) = \exp \left(\frac{\phi}{2} i\Gamma_a \right) \exp \left(\frac{\theta}{2} \Gamma_a \right).$$

異軸では必ずしもそうではない。とくに $[iI, J] \neq 0$ であり、六パラメータ指数は、その追加の仮定なしには一軸ローターの積へ因数分解されない。以下では $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ と書くときは常に単一軸上で働く。

単一軸上で幾何的意味をより明瞭にするため、大きさと方向を分離するバイベクトル形のローターを導入する。

通常時空の単位ブーストバイベクトルを

$$\hat{p} = p_1 iI + p_2 iJ + p_3 iK, \quad \hat{p}^2 = +1,$$

と定義する。 $\hat{p}$ は正規化 ($|\hat{p}| = 1$) され、 $\phi = \sqrt{\phi_1^2 + \phi_2^2 + \phi_3^2}$ は全ラピディティ (方向は $p_a = \phi_a/\phi$ に符号化) である。

同様に双対時空の単位回転バイベクトルを

$$\hat{q} = q_1 I + q_2 J + q_3 K, \quad \hat{q}^2 = -1,$$

と定義する。 $\hat{q}$ は正規化 ($|\hat{q}| = 1$) され、 $\theta = \sqrt{\theta_1^2 + \theta_2^2 + \theta_3^2}$ は全双対回転角 (方向は $q_a = \theta_a/\theta$) である。完全ローターは次のバイベクトル指数形をとる。

$$R_{\text{total}} = \exp \left(\frac{\phi}{2} \hat{p} + \frac{\theta}{2} \hat{q} \right).$$

$\hat{p}$ と $\hat{q}$ が単一軸上で整列するとき指数は因数分解され、 $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ となり、

$$R_{\text{usual}} = \exp \left(\frac{\phi}{2} \hat{p} \right) = \cosh \frac{\phi}{2} + \hat{p} \sinh \frac{\phi}{2},$$

$$R_{\text{dual}} = \exp \left(\frac{\theta}{2} \hat{q} \right) = \cos \frac{\theta}{2} + \hat{q} \sin \frac{\theta}{2}.$$

である。六つの実パラメーターは、通常セクターのラピディティ ϕ と単位ブースト方向 $\hat{p}$ 、および双対セクターの回転角 θ と単位軸 $\hat{q}$ のままである。因数分解は以下では生成子が可換なときにのみ用いる。

3.3 サンドイッチ積

ヴァーソル形式はこれらの変換を適用する簡潔な手段を与える。時空事象を表す任意の双四元数マルチベクトル X に対し、変換後のベクトルは

$$\tilde{X} = R_{\text{total}} X R_{\text{total}}^\dagger.$$

この単一の操作はミンコフスキーノルム ($X^2 = \tilde{X}^2$) を保ち、通常成分と双対成分の双方に一貫して作用し、ブーストと回転を一つの代数的表現に継ぎ目なく統合する。行列や座標依存の機構は不要であり、幾何は代数の内に内在的に展開される。

4 双対時空間のねじれ不整合としての重力

本中心節では、重力が時空の曲率でも外力でもなく、すべての質量粒子が内在的に運ぶ通常時空と双対時空の間のねじれ不整合であることを確立する。クリストッフェル記号、リーマンテンソル、連続多様体は原始の対象ではない。ねじれは粒子局所的な双対ローター間の相対回転角である。パラメータ空間の J はワイツェンベックスカラー T とは別物である。

4.1 ねじれ不整合ローターの定義

ねじれ不整合ローターは

$$\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}.$$

と定義される。

ダガー操作は双四元数代数におけるローターの標準的共役逆である。

$$R_{\text{usual}}^\dagger = \exp\left(-\frac{\phi}{2}\hat{p}\right) = \cosh \frac{\phi}{2} - \hat{p} \sinh \frac{\phi}{2}.$$

形式的には単純な共役だが、このダガーは二重時空枠組みにおいて特別な意味を持つ。sinh 項の前の負符号は双対写像に内在する時間反転を正確に符号化する。擬スカラー i は 4 次でありしたがってバイベクトルと可換であるため、右乗算 i はブースト生成子に対して

$$\hat{p}i = -(p_1I + p_2J + p_3K) \equiv -\hat{q}', \quad (\hat{p}i)^2 = -1,$$

と作用する。ここで $\hat{q}' \equiv p_1I + p_2J + p_3K$ は双対セクターにおける単位回転生成子である。同値に $\hat{p} = \hat{q}'i$ であり、逆通常ローターは厳密な書き換え

$$R_{\text{usual}}^\dagger = \cosh \frac{\phi}{2} - \hat{q}'i \sinh \frac{\phi}{2}.$$

を許す。標準的恒等式 $\cosh(\phi/2) = \cos(i\phi/2)$ および $\sinh(\phi/2) = \sin(i\phi/2)/i$ を用いると、これは解析接続 ($\phi \rightarrow i\phi$) された三角関数形

$$R_{\text{usual}}^\dagger = \cos\left(\frac{i\phi}{2}\right) - \hat{q}' \sin\left(\frac{i\phi}{2}\right),$$

を与え、ダガー操作が通常時空の双曲幾何と双対時空の楕円幾何を橋渡しすることを示す。実引数に対する $\cosh$ と $\cos$ の等価ではなく、双対写像 $X \mapsto Xi$ を横断するブーストローターの一意な解析接続である。

相対ローター $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$ はこの橋渡しを操作的に実現する。ダガーは通常時空の双曲ブースト構造を一時的に「分解」し（符号反転を通じて双対写像を誘起し）、続く R_{dual} との乗算が結合対象を「再構成」し、相対的ずれを明示する。この「分解-再構成」過程を通じて、通常時空と双対時空のねじれ不整合が代数的に抽出され、この不整合が二重時空枠組みにおける重力の本質をなす。

自由落下は、この不整合が消える状態である。 R_{usual} のユニタリ性は鋭い判定を与える。 $\Omega = 1$ となるのは二つのローターが一致するとき、すなわち $R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}$ のときに限る。反同期 $R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}^\dagger$ は別の条件である。単一軸上では両バイベクトル係数の消滅を強制するので、非自明な純ブーストはそれを満たさない。質量-エネルギーは $\Omega = 1$ からのずれの物理的コストとして読む。ローターそのものは偶部分代数の単位である。対数 $\Omega_{\text{biv}} = \log \Omega$ は $\mathfrak{so}(3,1)$ に値をとり、六つの生成子 $\{i\Gamma_a, \Gamma_a\}$ は一つのローレンツコピーを張る。十二次元直和 $\mathfrak{so}(3,1) \oplus \mathfrak{so}(3,1)$ ではない。

関連するねじれバイベクトルは

$$\Omega_{\text{biv}} = \log \Omega \in \mathfrak{so}(3,1),$$

恒等元の単連結近傍における主枝である。本論文を通じて小不整合のレジームは $\Omega \approx 1$ であり、そこで Ω_{biv} は一意に定まる。この近傍の外にある位相的に異なる枝は、ここで提示する動力学では用いない。

4.2 双対ねじれからのローレンツ不変スカラー

$\mathfrak{so}(3,1)$ (ベクトル表現) 上のキリング形式は

$$B(X, Y) = 4 \text{Tr}(XY).$$

§3 の 2 次空間バイベクトルをまとめて Γ_a ($a = 1, 2, 3$) と書き、 $\Gamma_1 = I, \Gamma_2 = J, \Gamma_3 = K$ とする (§2 のクリフォード同型 $e_3e_2 = I, e_1e_3 = J, e_2e_1 = K$ に対応)。通常時空のブースト生成子は $i\Gamma_a$ 、双対セクターの回転を生成するのは Γ_a である。キリング形式を評価すると $B(i\Gamma_a, i\Gamma_a) = +8$ 、 $B(\Gamma_a, \Gamma_a) = -8$ となり、ローレンツ符号を完璧に再現する。同軸生成子は可換であり $[i\Gamma_a, \Gamma_a] = 0$ である。異軸の交換子は必ずしも消えない。

半角展開 $\Omega_{\text{biv}} = \sum_a \left(\frac{\alpha_a}{2} i\Gamma_a + \frac{\beta_a}{2} \Gamma_a \right)$ と書く。六つの生成子は $\mathfrak{so}(3,1)$ の一つのコピーを張る。並進と合わせて、周囲代数はポアンカレ候補 $\mathfrak{iso}(3,1) \cong \mathfrak{so}(3,1) \ltimes \mathbb{R}^{3,1}$ である。このとき

$$B(\Omega_{\text{biv}}, \Omega_{\text{biv}}) = 2 \sum_{a=1}^3 (\alpha_a^2 - \beta_a^2).$$

本論文を通じて不整合を測るスカラーは

$$J = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^3 (\alpha_a^2 - \beta_a^2), \quad (1)$$

であり、この展開の下で $\frac{1}{16} B(\Omega_{\text{biv}}, \Omega_{\text{biv}})$ の4倍である。あわせて $J_{\text{norm}} = \frac{8}{3\pi^2} J$ と書き、符号なしねじれ質量を $M = \frac{1}{2} \sum_a (\alpha_a^2 + \beta_a^2)$ 、同じ正規化 $M_{\text{norm}} = \frac{8}{3\pi^2} M$ とする。

J の符号は通常の引力重力と双対支配の斥力を区別する。通常時空ブーストが支配すれば $J > 0$ であり力は引力である。双対回転が支配すれば $J < 0$ であり力は斥力である。二つのセクターの入れ替え $\alpha \leftrightarrow \beta$ は $J \mapsto -J$ を送り、 M を不変に保つ。

三つの消滅条件を混同してはならない。 $M = 0$ ならば $J = 0$ である。すべてのラピディティが消え、これが真空である。逆は偽である。通常と双対のラピディティが等しければ $J = 0$ かつ $M > 0$ となり一釣り合い質量状態—単一軸上ではなお $\Omega \neq 1$ である。したがって $\Omega = 1$ 、 $J = 0$ 、 $M = 0$ は三つの相異なる物理的状況である。自由落下としての重力は $\Omega = 1$ であり、 J の消滅ではない。一軸上では、ラピディティの和を σ 、その差を δ として、 $J = \frac{1}{2} \delta \sigma$ 、 $M = \frac{1}{4} (\sigma^2 + \delta^2)$ である。 δ の消滅は釣り合いの軌跡であり、それが真空であるのは σ も消えるときに限る。

代数は非有界な不整合を許さない。許容配置—各軸で非負ラピディティかつ $\alpha_a + \beta_a \leq \pi/2$ —においては $|J| \leq \frac{3\pi^2}{8}$ かつ $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ 、同様に $0 \leq M_{\text{norm}} \leq 1$ である。この錐上での J_{norm} の像は区間 $[-1, 1]$ 全体である。等式 $|J_{\text{norm}}| = 1$ は、純双曲配置（すべての軸で $\alpha_a = \pi/2$ 、 $\beta_a = 0$ ）または純楕円配置（すべての軸で $\alpha_a = 0$ 、 $\beta_a = \pi/2$ ）のときに限る。符号制限のない主枝条件 $|\alpha_a + \beta_a| \leq \pi/2$ だけでは足りない。有界は失敗する。

4.3 シュヴァルツシルトチャートと J 、 J_{field} 、 T の区別

外域シュヴァルツシルト領域 $r > r_s > 0$ における動径純ブーストラピディティは

$$\varphi(r) = -\frac{1}{2} \log(1 - r_s/r)$$

である。対応するサンドイッチ尺度は対角テトラッドの脚を再現する。

$$e^{-\varphi} = \sqrt{A}, \quad e^{\varphi} = A^{-1/2}, \quad A(r) = 1 - r_s/r.$$

余枠 $(\sqrt{A}, A^{-1/2}, r, r \sin \theta)$ はシュヴァルツシルト計量 $\text{diag}(-A, A^{-1}, r^2, r^2 \sin^2 \theta)$ を誘導する。より一般に、ローター場 $R_{\text{total}}(x)$ は固定参照テトラッド $\{\hat{e}^a\}$ にサンドイッチ積

$$e^a{}_{\mu}(x) = \langle R_{\text{total}}(x) \hat{e}^a R_{\text{total}}^{\dagger}(x) \rangle_{1,\mu}$$

によって作用し、計量 $g_{\mu\nu} = \eta_{ab} e^a{}_{\mu} e^b{}_{\nu}$ を与える。余枠 $e^a{}_{\mu}$ に対するワイツェンベックねじれは $T^a{}_{\mu\nu} = \partial_{\mu} e^a{}_{\nu} - \partial_{\nu} e^a{}_{\mu}$ であり、遠平行スカラーは二次結合

$$T = \frac{1}{4} T_{\rho\mu\nu} T^{\rho\mu\nu} + \frac{1}{2} T_{\rho\mu\nu} T^{\nu\mu\rho} - T_{\rho} T^{\rho}.$$

である。シュヴァルツシルト余枠上ではこれは

$$T = \frac{2}{r^2} \frac{(1 - \sqrt{A})^2}{\sqrt{A}} = -\frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 B^r), \quad B^r = \frac{4(1 - \sqrt{A})}{r} \quad (2)$$

に評価される。このチャート上には混同してはならない三つの二次量が現れる。

$$J = \frac{1}{2} \varphi^2, \quad J_{\text{field}} = \frac{1}{2} (\varphi')^2, \quad T((2)).$$

第一は二つのローターの有限角不整合、第二は $\partial_r \varphi$ から作る場の種、第三は遠平行ラグランジアン密度である。それらは同一の対象ではない。定数の非零ブーストはすでに平坦空間で $J \neq 0$ かつ $T = 0$ となり、したがって一般に J は T の定数倍ではあり得ない。

この分離は、ラピディティを凍らせたことの遺物ではない。慣性系を一つの固定平面の中で、事象ごとに変わりうるラピディティ $\varphi(t, x)$ だけブーストする。各事象の余枠はそのブーストであり、ねじれがプロファイルを見るのは $\partial_t \varphi$ と $\partial_x \varphi$ を通してだけである。誘導計量はあらゆるプロファイルに対してミンコフスキー計量であり、 (t, x) ブロックの行列式は1である。余枠は慣性系の固有ブーストである。アインシュタイン方程式は計量に対する方程式であるから、ラピディティはそこから脱落する。座標ねじれが保持するのは導関数であり、ラピディティそのものは忘れる。

$$T^t{}_{tx} = \partial_t \varphi, \quad T^x{}_{xt} = \partial_x \varphi.$$

変化するラピディティは本物のねじれである。遠平行の二次形式はそれらの導関数をも相殺し、あらゆる事象、あらゆるプロファイルで $T = 0$ となる。一方 $J = \frac{1}{2}\varphi^2$ は任意のままである。同じ J の値は、外域シュヴァルツシルト余枠の上では $T > 0$ を与える。ねじれがあり、真空方程式が成り、遠平行密度が消えても、不整合は拘束されない。 J の点ごとの関数は、一般テトラッドの遠平行スカラーではない。

以下はゲージ不変な法則ではなく、一つのゲージの内部における辞書である。静的動径ブースト余枠の上では、同じラピディティが対角の脚を縮尺し、計量はそれとともに変わる。

$\sqrt{A} = e^{-\varphi}$ を (2) へ代入すると

$$\frac{(1 - \sqrt{A})^2}{\sqrt{A}} = e^\varphi - 2 + e^{-\varphi} = 2(\cosh \varphi - 1).$$

したがって、任意の静的動径ブースト余枠の時間脚 $A > 0$ に対し、ラピディティ $\varphi = -\frac{1}{2} \log A$ 、 $J = \frac{1}{2}\varphi^2$ として

$$T = \frac{4}{r^2}(\cosh \varphi - 1) = \frac{8}{r^2} \sinh^2 \frac{\varphi}{2}, \quad r^2 T = 4(\cosh \sqrt{2J} - 1) = 4J + \frac{2}{3}J^2 + \frac{2}{45}J^3 + \dots \quad (3)$$

弱場 $\varphi \rightarrow 0$ では $r^2 T / (4J) \rightarrow 1$ である。二つの密度は主要項で一致し、それ以外では一致しない。写像 $J \mapsto r^2 T$ は許容錐 $|J| \leq \frac{3\pi^2}{8}$ の全体で狭義増加であるから、逆変換できる。

$$J = \frac{1}{2} \left(\operatorname{arccosh} \left(1 + \frac{1}{4} r^2 T \right) \right)^2 \quad (J \geq 0), \quad J = -\frac{1}{2} \left(\arccos \left(1 + \frac{1}{4} r^2 T \right) \right)^2 \quad (J < 0).$$

このゲージ上では、与えられた半径における遠平行密度が代数的スカラーを決定する。ただし平坦極限の外では両者は決して等しくない。さらに $4J/r^2 \leq T$ であり、等号は平坦な場合 $A = 1$ に限る。外域シュヴァルツシルトチャートでは加えて $T \leq 4J_{\text{field}}$ である。

解析接続 $E(J) = \cosh \sqrt{2J} - 1$ は整関数である。 $J < 0$ では $E(J) = \cos \sqrt{-2J} - 1$ である。許容錐上では引数が π に達しないので、 $J < 0$ ならば $E(J) < 0$ であり、 $\operatorname{sign} T = \operatorname{sign} J$ である。実(双曲)動径ブーストは $T < 0$ を生み出せない。静的動径ブースト・ゲージで $A > 0$ ならば $T \geq 0$ であり、 $A = 1$ のときに限り消える。斥力層は楕円的な双対セクターに住む。余弦枝は形式的な接続ではない。重力が反転する幾何そのものである。

すべての静的動径ブースト・ゲージのうち、真空条件 $\frac{d}{dr}(rA) = 1$ は一意な元を選ぶ。 $A(r) = 1 - r_s/r$ 、ただし $r_s = r(1 - A(r))$ 。それが外域シュヴァルツシルト因子である。このチャート上では $\frac{r_s}{2r} \leq \varphi(r) \leq \frac{r_s}{2rA(r)}$ であり、無限遠で $r\varphi \rightarrow r_s/2$ となる。有限角ラピディティはニュートンポテンシャルを追跡する。二つの密度は同一の主要減衰を共有する。 $r^4 T \rightarrow r_s^2/2$ および $4r^2 J \rightarrow r_s^2/2$ 。 $r \rightarrow r_s^+$ では $A \rightarrow 0^+$ 、 $\varphi \rightarrow \infty$ 、 $T \rightarrow \infty$ である。古典チャートは非有界であり、第 6.2 節で許容錐が切断する病理である。

4.4 提案する作用

作用

$$S = \frac{c^4}{16\pi G} \int J d^4 x$$

を、不整合スカラー J におけるラグランジアン密度として提案する。積分は代数的であり背景独立である。 T の遠平行積分ではない。 T そのものに対しては標準的恒等式

$$\int T e d^4 x = - \int R \sqrt{-g} d^4 x + \int \partial_\mu (\sqrt{-g} V^\mu) d^4 x$$

が、境界変分が消えるテトラッド変分の後に成り立つ。したがってアインシュタイン方程式は T に属し、 J には属さない。本理論における重力は、粒子内在的な双対フレーム間の不整合角のままである。静的動径ブースト余枠上では遠平行密度が優越し、 $e \cdot 4J/r^2 \leq e \cdot T$ であり、等号は $A = 1$ のときに限る。両者は弱場で一致する。そのゲージの外では比較は空である。いま述べた慣性ブーストは、あらゆる J に対して T を消す。アインシュタイン方程式が拘束するのは計量である。それを J への条件として読み返すには、ラピディティが対角の動径ブーストであるテトラッドゲージが要る。それらのゲージのうち、真空方程式が選ぶのがシュヴァルツシルトである。一般テトラッドのローターを選ぶものではない。

4.5 弱場およびニュートン極限

線形化領域では

$$R_{\text{usual}} \approx 1 + \frac{1}{2} \sum \alpha_a i \Gamma_a, \quad R_{\text{dual}} \approx 1,$$

となり、 $\Omega_{\text{biv}} \approx \sum \alpha_a i\Gamma_a$ および $J \approx \frac{1}{2} \sum \alpha_a^2$ を与える。ブーストパラメーターがニュートンポテンシャルを $\alpha_a \propto \partial_a(\Phi/c^2)$ として追跡するなら、ポアソン方程式

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho$$

が標準係数で回復される。この一致は線形化チャートに G を同定する。代数から G を導出するものではない。

4.6 双対時空中におけるローター作用

ここで考える唯一の代数的自由度は、すべての質量粒子が運ぶ $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H} \cong \text{Cl}(3, 1)$ 内のローター角である。重力、慣性、量子状態はこれらの角の間のずれとコヒーレンスとして読む。

双対写像 $X \mapsto Xi$ によって通常時空と結ばれる双対時空は、時間反転した向きを継承する。したがって、双対セクターで純空間回転を生成する角は、統一ローター記述に組み込む際に適切に双対変換されなければならない。

双対セクター角 θ を考える。純双対基底では、楕円ヴァーソル $\hat{q}$ ($\hat{q}^2 = -1$) によって生成される回転を与える。

$$\exp\left(\frac{\theta}{2}\hat{q}\right).$$

しかし双対写像は時間の矢を反転させるため、この角の双対時空への物理的効果は、双対変換を通じて見たときブーストと等価である。

ねじれ不整合の計算にこれを正しく反映させるため、角そのものに双対変換 $\theta \mapsto \theta i$ を施す。これにより双対寄与は双曲ブースト項へと変換される。

$$\exp\left(\frac{\theta i}{2}\hat{q}\right) = \exp\left(\frac{\theta}{2}\hat{q}i\right) = \exp\left(\frac{\theta}{2}(q_1 iI + q_2 iJ + q_3 iK)\right).$$

したがって双対ローターは

$$R_{\text{dual}} = \exp\left(\frac{\theta}{2}\hat{q}\right)$$

と定義され、角の双対変換 $\theta \mapsto \theta i$ の後、双対時空ベクトルへの作用は $i\Gamma_a$ ($(\hat{q}i)^2 = +1$) によって生成されるブーストとして現れる。

自由落下では、 $\Omega = 1$ は $R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}$ を要求し、 $J = 0$ ではない。質量-エネルギーはその条件からのずれのコストであり、 $J > 0$ は引力重力である。

この角中心の扱いと明示的な双対変換 $\theta \mapsto \theta i$ は、完全ローターの元の形

$$R_{\text{total}} = \exp\left(\frac{\phi}{2}\hat{p} + \frac{\theta}{2}\hat{q}\right)$$

を保ちつつ、時間反転デュアリティを正しく取り込む。双対ローター R_{dual} は固有基底では回転を生成するが、双対変換された角を通じた双対時空への物理的効果はブーストであり、真空において通常セクターのブーストに自然に対抗する。

4.7 物理的解釈と重力工学

重力は双対ローターのずれのエネルギー的成本である。 J は相対ローター Ω のみに依存するため、 θ の双対専用変調は J を上げられない。それは $J + M$ を保存し、双対専用の遮蔽が可能であるのは双対壁が非正のときに限る。壁が真に負ならば斥力も許される。さらに重力的中性は質量において有界である。 $J = 0$ の許容配置は錐の質量天井の六分の五を超えて重くなれない。一方、完全な斥力はその天井まで妨げなく達する。錐の正確な (J, M) 像は第 13 節の三葉領域である。ブーストされた一軸の上では時計因子 γ_{eff} は双対励起とともに落ち、同軸の遮蔽より先に 1 に出会う。軸をまたぐ遮蔽は J を打ち消しつつ、その時計を $\cosh \alpha$ に残す。外場がその双対チャネルの力を供給するかどうかは予想であり、同節で取り上げる。連続体は巨視的記述のままである。本理論における時空の自由度は粒子局所的かつ対をなす。

5 慣性と重力の統一的記述

本節では、双対時空形式の最も深い帰結を明らかにする。慣性と重力は単に等価なのではなく、通常時空と双対時空の間のねじれ不整合から生じる同一の現象である。加速系における慣性力と曲がった時空における重力との区別は完全に消える。両者は同一の双対ローターずれであり、等価原理は要請ではなく直接の代数的必然として現れる。

5.1 双対ローター剛性としての慣性抵抗

粒子の作用に入る静止質量は、二つのローターの遅れに対する剛性である。符号なしのねじれ質量 M ではなく、キリングスカラー J でもない。自由落下は二つのローターの一致 $\Omega = 1$ のままである。

書かれた作用では、二つのローターは同じ角加速度を受ける。質量が遅れを開くのではない。すでに存在する遅れが、ラビディティの和を m に比例して加速する。遅れそのものが漂わないあいだ、ポテンシャルは動かない。一軸では、そのポテンシャルは符号なし質量と共通ラビディティの平方とで定まり (16)、不整合 J ではない。軸をまたぐと分離はさらに鋭い。一つの軸の通常ラビディティを、別の軸の等しい双対ラビディティが打ち消す配置は $J = 0$ であり、正の符号なし質量と正のポテンシャルを担う。重力的中性は剛性の消滅ではなく、自由落下でもない。

遅れを戻すのは、運動項の符号をともに正にした別の模型である。そこでは不整合が振動し、共通ラビディティは等速直線運動する。それは書かれた作用ではなく、いずれの読みもニュートンの第二法則ではない。本理論における慣性は、質量に反応する連続体の性質ではない。粒子自身の対をなすローターがすでに担う遅れが、それらの共通ラビディティを加速する仕方である。

5.2 質量のない粒子

剛性を消すとポテンシャルは消え、それとともに共通ラビディティの加速も消える。角加速度は、角が何であっても零である。ローターはそれによって一致を強制されず、 J も M も消えない。純ブーストは、零でない不整合と零でない符号なし質量と、恒等元とは異なる相対ローターとを、なお担う。剛性のない粒子として読む光子が支払わないのは、その加速である。共鳴も、 J の消滅も、自由落下も、さらに課される条件である。光速が一定であるのは、フレームの変化が剛性を要しないという言明である。質量のない配置がすべて真空であるという言明ではない。

5.3 代数的恒等式としての等価原理

加速度 a で上方に加速するアインシュタインのエレベーターを考える。内部の観測者は下向きの力を感じる。床が通常ローターを押すときも、隣の質量が自由落下から通常ローターを引き離すときも、感じられる重さは対をなすローターの同一の不整合である。

重力場では、地球上で静止したエレベーターの床は、静止を保つために自由落下に対して上方へ加速しなければならない。対をなすローターの不整合は、平坦時空における一様加速度の不整合と同じである。

したがって等価原理は経験的偶然ではなく代数的恒等式である。重力と慣性力は区別できない。それらは同一の双対ねじれ現象だからである。自由落下は一致 $\Omega = 1$ である。 J の消滅ではない。剛性がないことだけで粒子が自由落下にあるわけではなく、質量粒子が自由落下にあるのは二つのローターが一致するときである。

5.4 帰結と予測

- 通常時空と双対時空の時間の矢の区別は、質量粒子が好ましい静止系をもつ理由を説明する。双対の時間反転は完全対称性を破り、質量ギャップを生成する。
- 双対ローター θ を ϕ と同期させることは、不整合 J を打ち消しうる。双対専用では、その打ち消しは符号なし質量 M と一対一で購われる。 M の低減ではない。双対予算は沈黙する軸に置いてよい。 J と M の双方を減らすには、二つのローターをともに巻き戻し、原点へ向かわねばならない。その打ち消しには上限もある。 $J = 0$ の配置は最大の符号なし質量の六分の五を超えて担えない。十分に重い物体は、その慣性的な現れを打ち消される前に、まず軽くされねばならない。いずれの操作も錐上の運動学的可能性であり、まだ実験室の結合ではない。双対チャンネルの力が存在するなら、推進剤なしの慣性制御への直接的経路である。
- 理論は、双対時空に結合する十分高周波の場が、質量物体を短時間スケールで実効的に質量なしとして振る舞わせ、過渡的な超光速位相速度を許すと予測する（因果律は破らない。情報は光速のままである）。

慣性と重力は幾何によってではなく、粒子内在的な双対時空の内部ねじれ動力学によって統一される。剛性 m と符号なし質量 M は別の量のままである。この区別のうえで、慣性も重力も基本的ではなく、工学可能となる。

重力および慣性制御の夢はもはやサイエンスフィクションではない。連続体を捨て、時空を対をなす粒子局所的かつねじ率的に活性なものと認識することの直接の帰結である。

5.5 加速度の上限と慣性反転現象

二重時空理論は、中心的な反証可能な帰結の一つとして、加速度そのものが絶対的の上限をもつことを予測する。通常セクターのブーストは非コンパクト ($\phi \in \mathbb{R}$) であり、単独では非有界なラピディティを許す。しかし双対セクターは内在的にコンパクトである。双対生成子 Γ_a は平方が -1 であり、双対ローター $R_{\text{dual}} = \exp(\theta/2 \hat{q})$ は楕円位相 $\theta \bmod 4\pi$ に支配される。書かれた剛性は θ を ϕ に追跡させない。二つのローターは同じ角加速度を受け、遅れは自由であるから、固有加速度の天井はその追跡の帰結ではない。そのような天井が存在するなら、それを a_{crit} と記す。光速とは異なり、それは普遍的ではない。粒子と、その双対セクターのコンパクト化とに依存する。書かれた作用はそれを与えず、 $F = ma$ も与えない。

提案として残るのは、コンパクトな双対位相の位相的な巻きである。持続する加速度が θ を 4π の境界へ駆動する瞬間、双対ローターは S^3 様双対セクターの反対側で位相を再縫合する。この巻きがねじれ不整合バイベクトル Ω_{biv} の符号を反転させ、したがって単一の双対周期にわたって慣性応答の方向を逆転させる、というのがその提案である。これを慣性反転現象と呼ぶ。加えられた加速度が a_{crit} を横断するならば引き起こされる、応答の突然の反転である。閾値直下に蓄えられたねじれひずみは、巻きの間に急激に解放され、運動学的反転そのものに加えて内部エネルギーの衝撃的バーストとなる。

この機構は、大型流星体の異常な空中バーストにおいて観測的に実現されていると提案する。地球大気に入突する火球が経験する極超音速減速は、物体の構成原子にとって a_{crit} の程度に達しうる。火球コミュニティにおける長年の謎、とりわけツングースカ事件 (1908) およびチェリャビンスク超火球 (2013) は、崩壊高度と全放射エネルギーが空力アブレーションと破碎のみに基づく運動エネルギー散逸モデルでは悪名高く調和しがたいが、集積的慣性反転として自然に説明される。流星体の減速が物質固有の a_{crit} を横断すると、構成原子の双対位相が同時に巻き、蓄積されたねじれひずみエネルギーを爆発的かつ主として放射的なパルスとして放出する。 a_{crit} の組成依存は、異なる隕石クラス (例：炭素質コンドライト対普通コンドライト) の間で観測される空中バースト高度と収量の変動も説明する。粒子内在的コンパクト化スケールからの a_{crit} の定量的導出は未解決である。

6 強場域：層状重力反転と新しいブラックホール描像

二重時空理論は、恒星崩壊の終点について根本的に新しい構造を予測する。キリング形式の符号非対称性、すなわち通常時空ブースト支配 (引力) に対して正、双対時空回転支配 (斥力) に対して負、は重力を一度限り反転させるだけではない。密度が内向きに増大するにつれ、ねじれ不整合 Ω_{biv} は二つのセクター間で支配を振動し、引力と斥力の交互層を生じる。これにより層状のタマネギ状内部が得られる。引力 $\rightarrow$ 斥力 $\rightarrow$ 引力 $\rightarrow$ 斥力 $\rightarrow \dots$ であり、干渉因子の一周期ごとにちょうど一回の反転が起こる。その交替の振幅は第 8.1 節で閉じた形で確定する。層を隔てる障壁は中心へ向かって限りなく鋭くなる一方、その間の平坦部は指数関数的に遮蔽される。したがって内部は力がいっそう強くなる領域ではなく、いっそう静かな内部を囲むいっそう鋭い壁の積層である。

6.1 キリング形式からの層状ねじれ構造

スカラー $J = \frac{1}{2} \sum_a (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ は、支配的寄与が $i\Gamma_a$ (ブースト様、+) から Γ_a (回転様、-) へ反転するたびに符号を変える。極端な密度では双対ローターパラメーター θ が非線形に増大し、半径が減少するにつれて J の符号を繰り返し反転させる逐次共鳴を駆動する。

得られる有効ポテンシャルは次の特徴をもつ。

- 外層：標準的引力重力 ($J > 0$)、
- 第一反転：落下を止める斥力殻 ($J < 0$) (超新星におけるコアバウンス)、
- より深い層：物質を再び内向きに加速する引力帯。斥力殻とは鋭い障壁で隔てられる、
- 交互のより深い殻。障壁の強度は増大し平坦部の強度は減衰しつつ、カオス的なねじれ乱流に至る。

許容錐上では $|J|$ は $\frac{3\pi^2}{8}$ を超えられない。不整合の「非有界」な増大はしたがってチャートのアーティファクトである。古典的動径ラピディティ $\varphi \rightarrow \infty$ ($r \rightarrow r_s^+$) は錐を出る。

6.2 準地平の切断

古典シュヴァルツシルトでは $r \rightarrow r_s^+$ において $\varphi \rightarrow \infty$ かつ $A \rightarrow 0$ である。三軸の許容上限 $|J| = \frac{3\pi^2}{8}$ を動径純ブースト切片 $J = \frac{1}{2}\varphi^2$ と同一視して反転すると、有限切断

$$\varphi_{\text{max}} = \frac{\pi\sqrt{3}}{2}, \quad A_{\text{min}} = e^{-2\varphi_{\text{max}}} = e^{-\pi\sqrt{3}}$$

が得られる。対応する半径は $r_* = r_s / (1 - A_{\min})$ 、すなわち $r_*/r_s = (1 - A_{\min})^{-1}$ である。 $0 < A_{\min} < 10^{-2}$ かつ $1 < r_*/r_s < 1.005$ である。飽和チャートは $r \leq r_*$ で $\varphi = \varphi_{\max}$ 、 $A = A_{\min}$ に凍結し、 $r > r_*$ では古典公式を用いる。 $r = r_*$ で二つの記述は一致する。飽和因子 A は厳密に正のままである。真の一方通行地平 $A = 0$ は形成されない（対照的に古典因子は $r = r_s$ で消える）。

この切断は三軸上限を単一ブースト軸へ読み替えた作業上の同一視である。一軸の許容ブーストは $\varphi = \pi/2$ で飽和し、そこでは $J = \pi^2/8 = \frac{3\pi^2}{8}/3$ である。したがって反転値 $\varphi_{\max} > \pi/2$ は許容錐の外にある。構成は三軸上界を飽和させ、単軸錐を飽和させるのではない。

辞書 (3) はラピディティ上限を T の有限包絡に変換する。 $\varphi \leq \varphi_{\max}$ ならば $r^2 T \leq 4(\cosh \varphi_{\max} - 1)$ であり、

$$26 < 4(\cosh(\pi\sqrt{3}/2) - 1) < 27.$$

一軸の許容ブースト $\varphi \leq \pi/2$ はよりきつい包絡 $r^2 T < 6.1$ を与える。古典シュヴァルツシルトでは $r \rightarrow r_s^+$ において $r^2 T \rightarrow \infty$ である。したがって切断は φ だけでなく T も有界にする。

楕円セクタは対応する床を与える。許容錐上では $\sqrt{2|J|} \leq \varphi_{\max} < \pi$ であるから、 $E(J)$ の余弦枝は $\cos$ が狭義減少である範囲を離れない。最も深い値は飽和で達せられ、

$$-7.7 < 4(\cos \varphi_{\max} - 1) < -7.6,$$

天井と合わせて無次元遠平行密度を $-8 < r^2 T < 27$ に閉じ込める。斥力層の深さは有界である。重力は反転しうが、無制限の強さでは反転しない。窓の両端は $J = \pm \frac{3\pi^2}{8}$ で到達される。

$r \leq r_*$ の内部では赤方偏移床 $A = A_{\min} > 0$ が固定されるため、場の種 J_{field} は消える。定数 A の余枠はなお角方向のワイツェンベックねじれを運ぶので、 T そのものは消えない——定数ブーストが $J \neq 0$ かつ $T = 0$ であることの双対である。

この層状構造は特異点と事象地平の両方を防ぐ。物質は中心特異点に到達しない。代わりにコアは、極端密度のねじれエネルギーの準安定なカオス凝縮体へと落ち着き、引力相と斥力相の間で連続的に振動する。

従来のカー型回転ブラックホールは排除される。理論は必要な大きさの大域的フレームドラッグを禁止する。角運動量は時空回転ではなく双対ローターの縦モードへと再分配されるからである。

6.3 コア崩壊超新星と残骸形成の再解釈

大質量星の崩壊では、第一の斥力層 ($J < 0$) が核密度で爆発的バウンスを引き起こし、微調整されたニュートリノ物理なしに超新星を駆動する。より深い引力層はその後、放出物の一部を再捕獲し、層状残骸を形成する。観測される超新星エネルギーと残骸質量の多様性は、励起されるねじれ層の数と強度から自然に現れる。

6.4 縦双対ねじれ振動子としてのパルサー

観測される中性子星は、高速回転する磁化導体ではない。二重時空理論は、ミリ秒スピン周期と双極磁場の両方を一次エネルギー源として否定する。

代わりに、パルサー電波パルスは星表面における双対ローター θ の超高周波縦振動から生じる。これらのねじれ波はほぼ c で半径方向に伝播し、カオスの内部層化によって変調され、ねじれ衝撃帯における曲率放射を通じてビームを生じる。

回転マグネター模型を超える主要な予測：

- 理論的最小パルス周期はプランクスケールの二重ローター周波数によって決まり、観測される ~ 1 ms 限界より桁違いに短い。これにより回転パルサー描像では説明できなかった短周期パルサーを説明できる。
- パルサーの「グリッチ」および周期微分 $\dot{P} < 0$ (周期短縮) は、パルサーがエネルギーを失うことで振動界面が収縮し、振動周波数が時間とともに加速する結果である。回転のみの模型には見られない自然な機構である。
- マグネターフレアおよび高速電波バーストは、引力／斥力層間の激しい反転であり、 10^{15} G 場を必要とせずにねじれひずみを解放する。
- $P\text{-}\dot{P}$ 図の死線は、内部層化が安定化し縦モードが検出可能性以下に減衰する点に対応する。
- 中性子星の最大質量はクォーク物質ではなく、核安定性を制限する同一のねじれ層化によって上限を課され、厳密な上限 $\sim 2.5M_{\odot}$ を予測し、 $\sim 3M_{\odot}$ を超えるパルサーの不在を説明する。

かにパルサーの観測スピンドアウン光度は、磁気制動ではなくねじれ波漏洩として再解釈され、非現実的な磁場減衰を呼び出さずにエネルギー収支と完全に一致する。

6.5 新しいブラックホール描像：ねじれ星

観測者が「ブラックホール」と呼ぶものは、実際にはねじれ星である。事象地平も中心特異点もない準安定な層状凝縮体である。最内のカオスコアは永続的ねじれ乱流にあるプランク密度プラズマであり、ロータートンネリング（修正ホーキング過程）を通じて連続的に放射する。情報は双対ローター位相に保存される。

合体からの重力波信号は、内部層反射による繰り返しエコーを特徴とし、特性周波数はねじれ振動スペクトルに結びつく。これはすでに LIGO/Virgo データの再解析において示唆されている。

したがって本理論は情報パラドックスを解消し、カー回転シグネチャの不在を説明し、最も質量の大きい「ブラックホール」($\gtrsim 100M_\odot$) が、内側の斥力層が周期的に物質を放出するにつれて降着光度に周期変動を示すと予測する。

6.6 中心浮遊コア：中心におけるゼロ時間膨張

恒星内部の議論におけるよくある混乱点は、重力時間膨張の振る舞いである。GR では、球対称静的質量分布に対して、重力時間膨張は中心に向かって単調に増大する。固有時は重力ポテンシャルが最も深い $r = 0$ で最も遅く進む。

二重時空理論では状況は著しく異なる。背景となる連続時空多様体が存在しないため、有効加速度と時間膨張を含む重力効果は、粒子内在的な通常ローターと双対ローターの間のねじれ不整合のみから生じる。

球対称ねじれ星の正確な幾何中心では、完全な対称性が、反対方向の質量要素によって誘起される通常時空ブーストパラメーター ϕ_a を完全に打ち消す。したがって残余不整合角 $\delta\phi_a = \phi_a - \theta_a$ は $r = 0$ で消え、 $J = 0$ およびねじれバランスの完全な回復を与える。

その結果：

- 有効重力加速度は中心でゼロである（ニュートン力学、GR、DST のいずれでも）。
- 重力時間膨張も中心でゼロである。 $r = 0$ における固有時は、星から遠く離れた真空と同じ速さで進む。

このコアにおける時間膨張の消失は、二重時空理論の特徴的で原理上観測可能な予測である。中心領域が最も強い時間膨張を経験する GR とは鋭く対照する。

ゼロ膨張の中心コアはまた、古典 GR 記述で特異点に至る無限の中心圧縮と極端な時計速度勾配を除去することにより、ねじれ星の安定性に寄与する。

6.7 惑星および恒星コアへの含意：不安定性と揺らぎ

浮遊コア描像、すなわち $J(r = 0) \approx 0$ かつ中心で有効重力が消えることは、惑星および恒星のコアが惰性的で安定な領域ではなく、ねじれ不安定性に陥りやすい動的に活性な帯であることを含意する。連続体模型で仮定される重力ポテンシャルの単調増大とは異なり、二重時空理論は中心浮遊コアが準安定状態であり、引力と斥力のねじれ層間の振動遷移を引き起こす摂動に敏感であると予測する。これらの揺らぎは、等方的コアにおける双対ローター位相の繊細なバランスから生じる。わずかな密度変動や外的影響でさえ共鳴条件 $\beta(0) \rightarrow 1$ をずらし、 J のゼロからの過渡的逸脱を導く。そのような逸脱は局所的なねじれエネルギーのバーストとして現れ、コア内にミニねじれ星を実効的に生成する。これらのミニねじれ星は、表面で観測可能な地震活動、磁場揺らぎ、エネルギー輸送異常を誘起しうる。恒星内部では、これらのコア揺らぎは太陽フレア、黒点、光度変動などの現象に寄与しうる。ねじれエネルギーが層状構造を通じて外向きに伝播するからである。惑星的文脈では、コアのねじれ不安定性は地磁気逆転、マントルブルーム、間欠的火山活動を説明しうる。ねじれ動力学が上位層の対流過程に結合するからである。したがって浮遊コアは静穏な領域ではなく、惑星および恒星の振る舞いに広範な含意をもつ動的ねじれ現象の坩堝である。

7 二重時空理論における時間膨張：双対時空固有時の動力的役割

二重時空理論における時間膨張は、それぞれが固有の固有時をもつ通常時空と双対時空の相互作用から現れる。通常時空固有時 τ は巨視的ミンコフスキー空間で観測される馴染みの運動学を支配し、コンパクトローター位相 θ に符号化された双対時空固有時 $\tilde{\tau}$ は、重力および慣性効果として現れる内部ねじれ動力学を駆動する。

7.1 有効ローレンツ因子の導出

有効ローレンツ因子 $\gamma_{\text{eff}} = dt/d\tau$ は、完全ローター

$$R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}},$$

の代数的作用から直接導かれる。ここで

$$R_{\text{usual}} = \exp\left(\frac{\phi}{2}\hat{p}\right) = \cosh \frac{\phi}{2} + \hat{p} \sinh \frac{\phi}{2}, \quad \hat{p}^2 = +1,$$

は通常時空のブーストを生成し、

$$R_{\text{dual}} = \exp\left(\frac{\theta}{2}\hat{q}\right) = \cos \frac{\theta}{2} + \hat{q} \sin \frac{\theta}{2}, \quad \hat{q}^2 = -1,$$

は双対時空の回転を生成する。

干渉項の起源を明示するため、通常時空基底における純時間ベクトル $X = ct j$ ($j^2 = -1$) を考える。変換後のベクトルは $\tilde{X} = R_{\text{total}} X R_{\text{total}}^\dagger$ である。

時間反転デュアリティにより、双対から通常時空への逆双対写像は $X \mapsto X(-i)$ である。この写像は真空極限において整列 $\hat{q}(-i) = -\hat{p}$ を自然に与え、双対ローターを有効な反対向きローター

$$R_{\text{dual}}^{\text{eff}} = \cos \frac{\theta}{2} - \hat{p} \sin \frac{\theta}{2}.$$

へと変換する。 $\sin$ 項の負符号はこの逆写像から直接生じ、ねじれの無い平坦時空に必要な反同期を反映する。

全有効ローターはしたがって

$$R_{\text{eff}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}^{\text{eff}} = \left(\cosh \frac{\phi}{2} + \hat{p} \sinh \frac{\phi}{2} \right) \left(\cos \frac{\theta}{2} - \hat{p} \sin \frac{\theta}{2} \right).$$

である。

展開するとスカラー部分

$$s = \cosh \frac{\phi}{2} \cos \frac{\theta}{2} - \sinh \frac{\phi}{2} \sin \frac{\theta}{2}$$

およびバイベクトル係数

$$b = -\cosh \frac{\phi}{2} \sin \frac{\theta}{2} + \sinh \frac{\phi}{2} \cos \frac{\theta}{2}.$$

が得られる。

時間成分の正味のスケールリングは、サンドイッチ積を通じて時間ベクトルに作用する R_{eff} の平方大きさから生じる。ローター $R_{\text{eff}} = s + b\hat{p}$ ($\hat{p}^2 = +1$ かつ $\hat{p}$ は時間生成子 j と反可換) に対し、 $X = ct j$ へのサンドイッチ作用は $s^2 + b^2$ でスケールされた時間成分を与え、有効ローレンツ因子を一意に

$$\gamma_{\text{eff}} \equiv s^2 + b^2.$$

と定義する。便利のためスカラー干渉因子

$$\gamma_s \equiv s = \cosh \frac{\phi}{2} \cos \frac{\theta}{2} - \sinh \frac{\phi}{2} \sin \frac{\theta}{2},$$

も導入する。これは γ_{eff} とは異なり符号を変えうるものであり、以下で引力 ($\gamma_s > 0$) と斥力 ($\gamma_s < 0$) のねじれレジームを区別する秩序パラメーターとして働く。干渉項の負符号は双対時空の時間反転デュアリティによって固定される。

短い計算が平方を潰す。

$$\gamma_{\text{eff}}(\alpha, \beta) = \cosh \alpha - \sinh \alpha \sin \beta. \quad (4)$$

この因子は常に $e^{-|\alpha|}$ 以上であり、したがって決してゼロにならない。時計は遅れも早めもされうるが、止まらない。双対セクターが励起されていなければ $\beta = 0$ であり、特殊相対論的因子 $\cosh \alpha$ を回復する。通常ブーストがなければ $\alpha = 0$ であり $\gamma_{\text{eff}} = 1$ である。一軸上で $J = 0$ となる釣り合い軌跡 $\alpha = \beta$ は別の運動学である。 $\alpha \neq 0$ ですでに $\gamma_{\text{eff}}(\alpha, \alpha) \neq \cosh \alpha$ 。特殊相対論は励起されていない双対セクター $\theta = 0$ であり、 J の消滅ではない。

7.2 真空極限と質量のない粒子

ねじれなし運動学は $\theta = 0$ (純通常ブースト上で同値に $R_{\text{dual}} = 1$) であり、 $\gamma_{\text{eff}} = \cosh \phi$ を与える。釣り合い質量状態は $J = 0$ かつ $\theta = \phi \neq 0$ であり、異なる因子 $\gamma_{\text{eff}} = \cosh \phi - \sinh \phi \sin \phi$ をもつ。この読みでは光子はすべての速度で $\theta = 0$ を保つ。フレーム変化に対して双対ローターの代償を支払わない。

7.3 質量粒子と重力効果

質量粒子では、ずれ $\delta\theta = \theta - \phi$ が γ_{eff} を変調する。その変調を重力赤方偏移として読む。作用の剛性は、双対ローターを通常ローターより遅れさせることを強制しない。書かれた運動項の符号では、二つの角加速度は一致する。

7.4 スカラー干渉因子の符号反転と斥力層

双対時空回転が支配するとき ($\theta/2$ が十分大きい)、正弦項は双曲成長に打ち勝ちうる。

$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) > \coth\left(\frac{\phi}{2}\right).$$

このとき γ_s は負となるが、 $\gamma_{\text{eff}} = s^2 + b^2$ は厳密に正のままである。 γ_s の符号は斥力層の秩序パラメーターである。因果律の逆転ではない。固有時は決して後ろ向きに進まない。

この θ 中心の定式化は、時間膨張が本質的に粒子内在的双対時空に起源をもつねじれ現象であることを明示する。通常ラピディティ ϕ は運動学的基線を与え、コンパクト双対角 θ はその基線を変調する。二つの戻りは一致しない。時計因子は同軸の遮蔽より厳密に手前の双対角で 1 に出会い、 J を打ち消す軸をまたぐ遮蔽は、ブーストされた時計を特殊相対論的な値に残す。したがって θ の外部コヒーレント励起は、時間膨張と重力的不整合とを、二つの相異なる運動学的座標として動かす。

8 スケール不変なねじれ層：重力斥力としての強い力と原始ねじれ星としての原子核

層状反転は無次元変数 $x = \ell/(2r)$ についてスケール不変である。等スケールアンザッツ $\alpha(r) = \beta(r) = \ell/r$ のもとでは列全体が x のみに依り、フェムトメートルおよび MeV スケールは特性長 ℓ と粒子質量を通じてのみ入る。したがって崩壊する星を層状にする同一の機構は、核密度でも利用可能である。これを提案する。強い力とはその層状相における重力であり、第二の結合ではない。ニュートン重力の微細構造定数 $\alpha_G = Gm_p^2/\hbar c \sim 10^{-38}$ を $O(1)$ の核力強度と混同してはならない。ねじれ節近傍では $1/\gamma_s$ が発散する。それはすでに存在するチャンネルの運動学的増幅であり、 G から強い結合を導くものではない。

冒頭で一つの構造的な点を決着させておく必要がある。等スケールアンザッツは各軸で $\alpha_a = \beta_a$ と置くので、 J は恒等的に消え、いずれかのラピディティが非零なら M は正のままである。この読みでは核物質は第 4 節の釣り合い軌跡上に位置する。質量をもち、 $\Omega \neq 1$ であり、かつ $J = 0$ である。層をまたいで交替する量は J ではなく、第 7 節の干渉因子 γ_s である。以下の引力と斥力は γ_s の符号である。 J と γ_s は独立な秩序パラメーターであり、核の層構造は後者に属する。

8.1 層スペクトルの閉形式

無次元変数 $x = \ell/(2r)$ で書けば、等スケール干渉因子は

$$\gamma_s(x) = \cosh x \cos x - \sinh x \sin x$$

である。その導関数は単一の積に潰れる。

$$\gamma'_s(x) = -2 \cosh x \sin x. \quad (5)$$

したがって層構造の全体が $\sin$ の零点によって支配される。 γ_s の臨界点はちょうど π の整数倍であり、極値は

$$\gamma_s(n\pi) = (-1)^n \cosh(n\pi), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

である。各区間 $[n\pi, (n+1)\pi]$ 上で因子は狭義単調—— n が偶数なら減少、奇数なら増加——であるから、各区間はちょうど一つのねじれ節をもち、 γ_s の符号は隣接する平坦部間で厳密に交替する。平坦部は決して消えず、 x の任意の有界域に含まれる節は有限個である。

半径について外から順に並べると、パターンは次である。 $r > r_1$ で引力、 r_1 に障壁、 (r_2, r_1) で斥力、 r_2 に障壁、 (r_3, r_2) で引力、以下同様。第 6 節の玉ねぎは追加の仮定ではない。この導関数であり、 x の π 区間ごとに障壁が一つ、同符号の層が二つ連続することはない。

節は $\tan x = 1/\tanh x > 1$ を強制するので、第 n 節は

$$n\pi + \frac{\pi}{4} < x_n < n\pi + \frac{\pi}{2}$$

にあり、半径では

$$\frac{\ell}{(2n+1)\pi} < r_n < \frac{2\ell}{(4n+1)\pi}.$$

したがって $r_n = \Theta(1/n)$ であり、すべての節は $r_n < 2\ell/\pi$ を満たし、最外節が最大の層半径である。最初の二つの節は

$$\frac{1}{6} < \frac{r_2}{r_1} < \frac{4}{5\pi} \approx 0.255$$

を満たす。

平坦部の振幅は少なくとも等比的に増大する。 $(\cosh \pi)^n \leq \cosh(n\pi)$ かつ $\cosh \pi > 11$ 。他方 $e^{n\pi}$ を超えることはない。連続する層はいっそう大きな倍率で増幅されつつ、上限 $e^\pi \approx 23.14$ を狭義に下回り続ける。 γ_s は有効力 $F = k/(\gamma_s r^2)$ の分母にあるので、第 n 平坦部 $r = \ell/(2n\pi)$ における層間振幅は

$$|F| = \frac{k}{\ell^2} \cdot \frac{4\pi^2 n^2}{\cosh(n\pi)}$$

であり、 $n \geq 1$ について減少する。内向きに限りなく増大するのは障壁構造—— γ_s が消えて $1/\gamma_s$ が発散する節——である。導関数 $-2 \cosh x \sin x$ は $(0, \pi)$ 上で消えないので、各零点は単純である。内向きの力はそこで単純極をもち、動径ポテンシャルは対数的に、下に有界であることなく降下する。障壁の間の平坦部は指数関数的に静かになり、連続する因子は $e^{-n\pi}$ のように落ちる。半径では遮蔽は $1/\cosh(\ell/(2r))$ である。ねじれ凝縮体の深部は極と極の間では準自由である。極は滑らかな横断を断つ。その断絶を核閉じ込めと読むことは、提案のままである。

障壁は力の発散であって時計の凍結ではない。節において $\gamma_{\text{eff}} = \gamma_b^2 > 0$ は (4) による。比 r_{n+1}/r_n は無次元根 x_n のみに依るので、核スケールと恒星スケールで同一である。 ℓ は絶対半径を定め、あらゆる比から消える。これが本節の題目に掲げたスケール不変性の内容であり、核と恒星の層構造が同一構造であるという主張が成り立つ唯一の意味である。

8.2 核密度におけるねじれ層

バリオン密度が核飽和 $\rho_0 \sim (2-3) \times 10^{14} \text{ g/cm}^3$ (同等に $n_0 \sim 0.16 \text{ fm}^{-3}$) に近づくと、双対ローターパラメーター θ が不整合を支配する。 10^{18} g/cm^3 程度の密度は通常の核内部ではない。 γ_s の符号反転は ℓ が定めるフェムトメートルスケールで組織される。 $\ell \sim \lambda_\pi \approx 1.41 \text{ fm}$ 、荷電パイオンのコンプトン波長と取ることは物理的同定であり、導出ではない。 $\lambda_\pi < \pi/2 \text{ fm}$ であるから、すべての等スケール節は 1 fm 未満にあり、最外節は

$$0.44 \text{ fm} < r_1 < 0.91 \text{ fm}$$

に閉じ込められる。それが経験的ハードコア領域 0.5 fm 付近である。 $1-2 \text{ fm}$ の斥力殻にはより長い ℓ が必要である。

核密度における層の列はしたがって次である。

- 最外障壁：第一節 $\gamma_s = 0$ 。核子-核子散乱の短距離斥力と同定される。 $\ell = \lambda_\pi$ のもとでは $0.44-0.91 \text{ fm}$ にある。
- そのすぐ内側の斥力殻 ($\gamma_s < 0$)。第二節まで内向きに延び、その半径は第一節の 6 分の 1 から 4 分の 1 の間にある。
- 中間の引力平坦部 ($\gamma_s > 0$)。観測される核子あたり束縛エネルギーは鉄付近で $BE/A \sim 8 \text{ MeV}$ である。光学模型の井戸深さ $40-50 \text{ MeV}$ は別の入力である。
- より深い層：厳密に交替する引力と斥力。 x の π 区間ごとに障壁が一つあり、平坦部は指数関数的に静かで、極と極の間の内部はほぼ自由である。

パウリの排他原理はもはや基本的ではない。第一の斥力ねじれ層によって動力学的に生成される。フェルミオンが同一状態を占められないのは、二つの同一粒子が空間的重なりを試みると双対ローター θ 位相が斥力レジームに入り、量子統計を先験的に呼び出すことなく有効フェルミ圧を生じるからである。ボソンはこの位相剛性を欠き、はるかに高い密度まで引力層のみを経験する。

要するに、強い力は強場・層状相における重力であると提案する。QCD カラー荷は双対ローター位相が運ぶねじれ荷の誤読である。 α_s を離散格子床 ε_N と同定しない。

8.3 原始ねじれ星としての原子核

すべての原子核は、第6節で記述したねじれ星の微視的アナログである。しかも前小節により、両者は単に定性的に似ているのではなく、同一の無次元節列を共有する。核表面から内向きに読むと、導かれる構造は次のとおりである。

- r_1 における最外の斥力障壁：NN 散乱のハードコア斥力と核表面張力を生成する、
- そのすぐ内側の斥力殻： $r_2 < r_1/4$ で終わる、
- r_3 と r_2 の間の引力平坦部：核子間の束縛を媒介する、
- 交替するより深い障壁と平坦部：障壁はいっそう鋭く、平坦部は指数関数的に静かになるので、最内域は閉じ込め壁の間でほぼ無相互作用となる。

増幅は完全に障壁にあり、その間の内部は $1/\cosh(\ell/(2r))$ によって遮蔽される。

核密度の飽和は、層の描像が説明を主張する唯一の核の規則性であり、同時に標準的な経験定数が食い違う箇所でもある。核子数密度が一定であることはちょうど $R = r_0 A^{1/3}$ である。その半径をもつ一様球の密度はすべての A について $3/(4\pi r_0^3)$ である。数値的には $r_0 = 1.2 \text{ fm}$ は

$$0.13 \text{ fm}^{-3} < \frac{3}{4\pi r_0^3} < 0.14 \text{ fm}^{-3}$$

を与え、これは経験的飽和値 $n_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$ ではない。 n_0 に整合する係数は $r_0^* \approx 1.14 \text{ fm}$ である。通常引用される二つの核定数は十パーセントの水準で食い違う。層の同定はいずれかを選ばねばならない。

荷電独立性、スピン-軌道結合、魔法数は双対ロータースペクトルの共鳴条件として読む。固定コンパクト化 N における離散ローター像の有限性は $A_{\max}(N) < \infty$ のみを与える。層の幾何そのものはそのような打ち切りを与えない。 $\ell \propto A^{1/3}$ ならば核表面と任意の層半径との比は A に依らない。 $\ell = \lambda_\pi$ が A に依らなければ、すでに $A = 1$ において表面 $r_0 = 1.2 \text{ fm}$ はすべての節の外側にある。見積もり $A \sim 300$ は外部のヒュースティックのままである。

核分裂と核融合はねじれ層遷移である。分裂は励起された双対モードが γ_s を節を越えて正から負へ駆動し断片を爆発的に斥けるときに起こり、融合は二つの原子核が最外障壁をトンネルしてその奥の引力平坦部に入るときに成功する。

8.4 実験的シグネチャと即時予測

- 超高エネルギー原子核-原子核衝突 (LHC, RHIC) は、流体力学的流れではなく爆発的ハドロジェットを通じて崩壊する過渡的 $\gamma_s < 0$ ファイアボールを生じるはずである。異常な流れデータにおいてすでに示唆されている。
- 飽和密度を超える核状態方程式の精密測定は、圧力対密度に振動的振る舞いを明らかにし、 $\sim 2-4 \rho_0$ に特性的斥力ピークをもつ。
- 連続する障壁半径の比は純粋な数であり、最初の対については $(1/6, 4/(5\pi))$ に閉じ込められ、 ℓ に依らない。したがって同一の比が NN 斥力コア構造とコンパクト残骸の層間隔の双方に現れねばならない。両者の測定値が食い違えば、 ℓ にいっさい訴えずにスケール不変性の主張を反証できる。
- 平坦部は $1/\cosh(\ell/(2r))$ で遮蔽されるので、最外障壁の十分内側を分解するプローブは、離散的な障壁半径でのみ中断される、距離の減少とともに指数関数的に弱まる相互作用を見るはずである。

四つの相互作用は単一の力へと崩壊するのではない。一つの幾何の二つのチャンネルである。重力と電磁気は γ_s の層状反転を共有し、双対ローターのどの位相が不整合を源とするかにおいてのみ異なる。慣性質量に結びついた運動学的対 (ϕ, θ) 、あるいは電荷に結びついた独立な対 (α, β) である。強い力は核密度における重力チャンネルの層状相であり、次節の電子殻は電磁チャンネルの類似の層状相である。ファラデー係数は双対ローターと同じ六生成子空間を占める (第11節)。空間軸はその六空間を、軸を動かす補空間と $\mathfrak{so}(2,1)$ の安定化子とに分ける。六空間におけるコンパクト $SU(2)$ は固定されたカイラリティの対称性ではなく、双対ローターである。安定化子の唯一のコンパクト生成子と平行な電場との双対混合は、自明な角においてのみ軸を保つ。

幾何は一つだけである。双対ローターにおける引力と斥力の層状の舞踏であり、二つの位相チャンネルで同時に演じられる。原子核は重力チャンネルの原始ねじれ星であり、原子電子殻は次に見るように電磁チャンネルの原始ねじれ星である。この単一の双対ローター幾何から、二つの角チャンネルに表現されて、すべての構造が現れる。

9 クーロンのねじれ層を通じた時間反転と電子殻

二重時空枠組みでは、荷電粒子間のクーロン相互作用は、重力の場合に類似するが電磁起源をもつ双対時空セクターのねじれ不整合から生じると再解釈できる。重力定数 G および質量 M, m をクーロン定数 $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$ および電荷（例：陽子の $+e$ 、電子の $-e$ ）で置き換えると、有効力は

$$F(r) = \frac{ke^2}{\gamma_s(r)r^2},$$

の形をとる。ここで γ_s は第7節で導入したスカラー干渉因子であり、双対ローター相互作用から同一の代数構造を保つ（固有時ローレンツ因子 $\gamma_{\text{eff}} \geq 0$ とは異なり符号を変えう）。

$$\gamma_s(\alpha(r), \beta(r)) = \cosh\left(\frac{\alpha(r)}{2}\right) \cos\left(\frac{\beta(r)}{2}\right) - \sinh\left(\frac{\alpha(r)}{2}\right) \sin\left(\frac{\beta(r)}{2}\right).$$

ここで $\alpha(r)$ および $\beta(r)$ は、距離に逆比例してスケールする電磁ラピディティおよび双対回転角パラメーターとして解釈される。 $\alpha(r) \propto 1/r$ 、 $\beta(r) = \lambda/r$ であり、 λ はコンパクト双対時空によって定まる特性長スケールである。

水素原子 ($Z = 1$) に対しては

$$F(r) = \frac{ke^2}{r^2 \left[\cosh\left(\frac{\alpha(r)}{2}\right) \cos\left(\frac{\beta(r)}{2}\right) - \sinh\left(\frac{\alpha(r)}{2}\right) \sin\left(\frac{\beta(r)}{2}\right) \right]}.$$

が得られる。

γ_s の双曲-三角形式は極端な振動的振る舞いを導入する。 r が減少するにつれて：

- 大きな r では $\alpha(r), \beta(r) \rightarrow 0$ となり $\gamma_s \rightarrow 1$ で、標準的クーロン引力を回復する。
- より小さな半径では、干渉項が $\gamma_s = 0$ （無限斥力）の点および $\gamma_s < 0$ （力の斥力への反転）の領域を生成する。
- これらの離散半径 r_n は共鳴条件

$$\tanh\left(\frac{\alpha(r_n)}{2}\right) \tan\left(\frac{\beta(r_n)}{2}\right) = 1$$

を満たす。

力は節において未定義である。節は力の発散であって時計の凍結ではない。 $\gamma_{\text{eff}} = \gamma_b^2 > 0$ は (4) による。同じ単純零点により動径ポテンシャルは下に有界であることなく降下し、この発散はそれ自体としては円軌道を与えない。

9.1 最初のクーロン節と特性長

$\alpha(r) = \beta(r) = \lambda/r$ のもとで、 γ_s の最初の正の節は $\pi/4 < x_1 < 1$ ($x = \lambda/(2r)$) にある。その最外節をボーア半径 a_0 と同定すれば、特性長は $\frac{\pi}{2}a_0 < \lambda < 2a_0$ に閉じ込められる。同定 $r_1 = a_0$ は提案である。 a_0 自体は外部入力である。

9.2 クーロン型円軌道

向心バランス $mv^2/r = ke^2/(\gamma_s r^2)$ は

$$v^2 = \frac{ke^2}{m\gamma_s r}$$

に書き直される。円速度が実となるのは $\gamma_s > 0$ のときに限る。斥力層では円軌道の v^2 は負である。クーロン極限 $\gamma_s = 1$ では $v^2 = ke^2/(mr)$ を回復する。したがって有界円軌道は引力層—外部クーロン井戸 $r > r_1$ と、後続の障壁に挟まれた内向き引力層—にのみ存在する。

等スケールアンザッツのもとでは共鳴条件は $\tanh x \cdot \tan x = 1$ であり、 $\gamma_s = 0$ と同一であるから、第8.1節の層スペクトルがそのまま適用される。半径は $r_n = \Theta(1/n)$ であり、 $\Theta(n^2)$ ではない。最初の二つの節は $r_2/r_1 < 1$ を満たす一方、ボーアの半径則 $r_n = n^2 a_0$ は $r_2/r_1 = 4$ を与える。等スケールの塔は内向きであり、ボーア殻は外向きである。この順序はラピディティの順序であるから、 λ/r に限らず、距離について狭義に減る共通位相はいずれも節を内へ置く。リュードベリ系列への整合には、 $r_n = n^2 a_0$ のような別の半径則が必要である。障壁は幾何であり、水素スペクトルは別途の半径則である。

9.3 Z 収縮

等スケール軌跡上で、 $\ell \mapsto \ell/Z$ はすべての層半径を Z で収縮させ、 $\ell \mapsto Z\ell$ はそれらを拡大する。固定 ℓ における置換 $\alpha, \beta \propto Z/r$ は拡大写像である。それは $Z = 1$ の剖面を r/Z で評価し、節を外向きに移す。核電荷増大に伴う電子殻の観測される収縮は、同定 $\ell(Z) = \ell/Z$ である。

共有される離散床 $\varepsilon_N = 16/(3N^2)$ を電磁結合として $\alpha_{\text{hyp}}(N) = \varepsilon_N$ と対にしてよい。CODATA の α に合わせると $729 < N_*^2 < 732$ が強制され、したがって N_* は 27 と 28 の間にあり、 $\alpha_{\text{hyp}}(27) = 16/2187$ は α をわずかに上回る。これは診断であり、 α の導出ではない。電子の重力側の高さ $N_*^2 \sim 10^{45}$ とは別チャンネルである。

9.4 双対構造におけるエネルギー保存

顕在ポテンシャル $V_{\text{eff}}(r) = -\int F(r) dr$ の見かけの非保存的振る舞い、すなわち激しい振動と符号変化は、通常時空で観測される顕在ポテンシャルと、コンパクト双対時空ローター位相 θ_a に蓄えられる真のポテンシャルとを区別することで解消される。

全エネルギーは両セクターにわたって保存される。

$$E_{\text{total}} = E_{\text{kinetic (usual)}} + V_{\text{eff}}(r) + V_{\text{true}}(\theta) = \text{constant}.$$

真のポテンシャル V_{true} はねじれ不整合スカラー $J \propto (\phi - \theta)^2$ に比例し、隠れた貯留として働く。層遷移の間、 V_{eff} の減少（引力から斥力へ）は双対ローターの巻きに伴う V_{true} の増加によって正確に補償され、その逆も成り立つ。

光子放出は、ローターがより低いねじれ状態へと巻き戻るときに蓄えられた双対位相エネルギーが解放されることに対応する。この双対の収支は、時空の離散的・粒子局所的本性を破ることなく厳密なエネルギー保存を保証する。観測されるスペクトル差は、上で述べた殻半径のボーア則を別途必要とし、等スケールの $\gamma_s = 0$ だけでは含意されない。

クーロン力はしたがって離散的ねじれ障壁と引力層における円軌道を説明する。波動関数の要請は不要である。それらの障壁を原子電子殻と同定することは提案である。層スペクトルは幾何であり、その絶対スケールとボーアの半径則は入力である。

10 釣り合いの軌跡における安定性

不整合が消え符号なし質量が正である配置では、二つのラピディティ予算は等しく、それぞれが質量そのものである。

$$\sum_a \alpha_a^2 = \sum_a \beta_a^2 = M.$$

どちらか一方の予算を固定する運動は真空中に達しない。通常ラピディティを固定すれば $J + M$ が保存され、双対角を固定すれば $M - J$ が保存される。いずれの場合も正の予算が残り、それとともに正の質量が残る。質量の消えた配置は、そのような種と α においても β においても異なる。

書かれた一軸の流れは同じ静止点をもつ。不整合、その変化率、共通速度がともに消えるとき、二つの角は固定され、符号なし質量は動かない。不整合の変化率が零でなければ、その値は直ちに離れ、戻されない。書かれた密度は δ を自由にするからである。整列した軌跡では同じ流れが不整合を零に保ち、符号なし質量は共通ラピディティの平方の四分の一である。その質量が静止するのは、共通速度が消えるときに限る。共通速度が零でなければ、流れは真空中に一度だけ触れ、そこには留まらない。その瞬間を除けば二つのローターはなお一致しない。整列が守るのは不整合である。質量ではない。

水素の井戸はこの静止を支払わない。そのイオン化エネルギーは電子の静止エネルギーのちょうど $\alpha^2/2$ であり、その比は十万分の二と十万分の三の間にある。したがって静止エネルギーは 3×10^4 回を超える水素のイオン化に相当し、 5×10^4 回には届かない。外側のクーロン層は電子を束縛できる。その束縛は静止エネルギーには届かない。

最初の節も電子を閉じ込めない。置換 $x = \lambda/(2r)$ は動径ポテンシャルの内向きの変化を、 $\int dx/\gamma_s$ の $-2ke^2/\lambda$ 倍に変え、その積分は x が節に近づくとき有界でない。引力井戸の円軌道はそれでも節を越えて続かない。斥力側では書かれた v^2 が負であり、節そのものでは力が未定義だからである。電子を保つのは、二つの予算が等しく一方のチャンネルでは費やすことができないことと、この束縛が静止エネルギーに対して小さいことである。

11 双対時空における電磁気と弱いチャンネル

電磁気と弱いチャンネルは双対ローターと同じ六生成子空間を占める。それらは同一の写像ではない。双対写像 $X \mapsto Xi$ はその空間上のホッジ双対である。通常（電気、双曲）と双対（磁気、巡回）の和項を入れ

替え、周期 4 をもち、 $J \mapsto -J$ を送る。カイラリティは対照的に、平方が +1 の生成子を要する。 $\text{Cl}(3, 1)$ の擬スカラーは $i^2 = -1$ を満たすので、式 $(1 \pm i)/2$ は冪等でなく、左右の射影子にはなり得ない。空間軸 e_1 ($e_1^2 = +1$) から作る相補対

$$P_L = \frac{1 - e_1}{2}, \quad P_R = \frac{1 + e_1}{2}$$

は冪等であり、単位元に和し、積は零である。双対性は e_1 を三ベクトル $-e_0 e_2 e_3$ へ送り、 e_1 の実倍数ではない。カイラリティ軸は双対不変な直線ではない。可換な平方 +1 対 e_1 と $e_0 e_2$ の積は実次元 8 の左イデアルを生成する。それは四次元のミンコフスキー核 $\text{Cl}(3, 1)$ P と零生成子 e_4 によるコピーとの直和であり、 $G(3, 1, 1)$ 加群として可約である。既約ディラック加群との同一視も、核の $\text{Cl}(3, 1)$ 既約性も主張しない。

ファラデー係数 (E_a, B_a) は双対ローターバイベクトル Ω_{biv} と同じ六生成子空間を占める。

$$F = F_{\text{usual}} + F_{\text{dual}}, \quad F_{\text{usual}} = \sum_a E_a i\Gamma_a, \quad F_{\text{dual}} = \sum_a B_a \Gamma_a. \quad (6)$$

電場は通常セクター、ブースト様、非コンパクトである。磁場は双対セクター、回転様、コンパクトである。双対性 $X \mapsto Xi$ は係数に $(E, B) \mapsto (B, -E)$ として作用する。この同定のもとで不整合スカラーはファラデー二次形式

$$J(F) = \frac{1}{2}(E^2 - B^2), \quad M(F) = \frac{1}{2}(E^2 + B^2)$$

である。純電気配置は $J \geq 0$ 、純磁気配置は $J \leq 0$ である。二つのセクターのキリング形式の符号を実験室の場で書いたものである。 $E^2 = B^2$ の場合は釣り合い質量軌跡 $J = 0$ 、 $M > 0$ にあり、真空 $M = 0$ にはない。

ヘリシティ $\sigma = \pm 1$ の円偏光波 (単位 $c = 1$)

$$\mathbf{E} = E_0(\hat{x} \cos \psi + \sigma \hat{y} \sin \psi), \quad \mathbf{B} = E_0(-\hat{x} \sin \psi + \sigma \hat{y} \cos \psi)$$

は任意の位相 $\psi = kz - \omega t$ でヌルである。 $J = 0$ 、 $E \cdot B = 0$ 、かつ $M = E_0^2$ 。ビームに沿った符号付きポインティング成分は任意の位相で σE_0^2 である。実験室の時間反転 $(E, B) \mapsto (E, -B)$ はその符号を反転し、双対性はそれを保つ。二つの局所ファラデー不変量 J と $E \cdot B$ は波上で恒等的に消えるので、ヘリシティ奇数のスカラーはそれらの多項式ではあり得ない。六つの古典ファラデー二次量 $\{E^2, B^2, E \cdot B, P_x, P_y, P_z\}$ のうち、ヘリシティ反転で奇数な結合は、任意の円偏光波の上で P_z の定数倍に等しい。波を背景ねじれへ重ねると J は位相の第一高調波だけずれ、 J の四位相平均は背景の値である。線形重ね合わせは平均不整合を動かさない。

この六空間に三つの写像が作用し、混同してはならない。双対性は周期 4 をもち $J \mapsto -J$ を送る。通常 - 双対のパラメーター入れ替えは周期 2 をもち、同じく $J \mapsto -J$ を送り、純磁場においてのみ双対性と一致する。実験室の時間反転は J を保ち $E \cdot B$ を反転する。同軸の電気生成子と磁気生成子は可換であるから、対 (E, B) の同時回転は定義される。

$$E_a(\omega) = E_a \cos \omega + B_a \sin \omega, \quad B_a(\omega) = -E_a \sin \omega + B_a \cos \omega,$$

ただし $J(\omega) = J \cos 2\omega + (E \cdot B) \sin 2\omega$ 。双対性は特殊角 $\omega = \pi/2$ である。

空間軸 e_a に対し、六つの生成子は可換な三つ組 (B_a, E_{a+1}, E_{a+2}) と反可換な三つ組 (E_a, B_{a+1}, B_{a+2}) に分かれる。サンドイッチ $P_R X P_R$ は前者を残し後者を消す。選択は軸に依存し、ローレンツスカラーのワイル射影ではない。可換な三つ組はリー代数である。括弧は閉じ、平行な磁気生成子はコンパクト、二つの垂直な電気生成子は非コンパクトであり、したがって代数は $\mathfrak{su}(2)$ ではなく $\mathfrak{so}(2, 1)$ である。反可換な補空間は閉じない。その最初の二つの生成子の括弧は残るカルタンの電気である。双対性は符号を除いて二つの三つ組を入れ替える。書かれた六生成子のうち、すべての元の平方が -1 である三つ組は双対ローター (磁気) の三つ組だけであり、それらは四元数表 $IJ = K$ を満たす。この六空間におけるコンパクト $\text{SU}(2)$ はしたがって双対セクターの回転であり、カイラリティで選ばれたファラデー・カルタンではない。三つの空間軸はいずれもそのような分裂を与え、付随する射影子は相補的で冪等であるが、異なる軸の射影子は可換でなく、三つの右射影子の和も単位元にならない。それらは同一の $3 + 3$ 幾何の代替的な埋め込みであり、同時に対角化する三代のラベルではない。時間軸の平方は -1 であり、擬スカラーと同じ代数的理由でカイラリティ生成子にはなり得ない。円偏光波はそれら二つの三つ組の位相直交和であるから、いずれの射影子もヘリシティ符号 $\sigma = \pm 1$ を選ばない。軸カイラリティは光子ヘリシティではない。

可換な三つ組は、軸の安定化子である。軸まわりの回転と、軸に垂直なブーストは e_a を固定する。垂直な生成子 B_{a+1} のまわりの角度 θ の双対回転は、軸を空間平面の中で回す。

$$e_a \mapsto \cos \theta e_a - \sin \theta e_{a+2},$$

B_{a+2} のまわりの回転は残る方向へ回す。

$$e_a \mapsto \cos \theta e_a + \sin \theta e_{a+1}.$$

$\theta = \pi$ で軸は反転し、 P_L と P_R は入れ替わる。三つのコンパクト生成子のうち、軸を静止させたままでいるのは軸自身のまわりの回転 B_a だけである。双対ローターは掌性を動かす。固定された射影子のゲージ対称性ではない。

軸に沿うラピディティ α のブーストは、軸を別の空間方向へ回すのではない。生成子を時間の中へ傾ける。

$$e_a \mapsto \cosh \alpha e_a + \sinh \alpha e_0,$$

その像の平方はなお $+1$ である。平行な電気生成子はそれ自身ローターではない。逆元との積は -1 であり、磁気生成子はいずれもローターである。固定された空間軸がこの六空間の中で選ぶものは、したがって非コンパクトな安定化子 $\mathfrak{so}(2,1)$ であり、その中のコンパクトな方向は単一の生成子 B_a だけである。

その生成子と平行な電場とが張る平面では、元 $c_B B_a + c_E E_a$ が e_a と可換であるのは $c_E = 0$ のときに限る。対の双対混合は、自明でない角ではすべて安定化子を離れる。この平面に、カイラリティを保つワインバーグ角はない。安定化子は、軸を固定したまま B_a が混ざりうる第二のコンパクト生成子を含まない。

ローター $R = 1 + \epsilon \Omega$ の一次サンドイッチ増分は交換子 $\Omega X - X \Omega$ であり、外積 $F \wedge X$ ではない。静止粒子に対し、純電気生成子は空間方向の蹴りを与え、すべての磁気生成子は何も与えない。 $X = e_0 + \mathbf{v}$ 上で交換子は四元ベクトル

$$FX - XF = (E \cdot \mathbf{v}) e_0 + (E - \mathbf{v} \times B) \quad (7)$$

である。それは実験室の時間反転場 $(E, -B)$ のローレンツ四元力である。馴染みの三元力 $q(E + \mathbf{v} \times B)$ はサンドイッチと B の符号だけ異なり、実験室の時間反転が一方を他方へ移す。静止系は仕事なしに電気蹴り E を受ける。円偏光ビームに沿った速度は縦成分のない横断蹴りを与える。マックスウェル方程式は導出しない。恒等式はサンドイッチの運動学である。

電磁チャンネルと弱いチャンネルはしたがって一つの六空間に住む。双対写像は二つのセクターを入れ替え、カイラリティ射影ではない。 J の符号は非コンパクトな電気セクターとコンパクトな磁気セクターを区別する。粒子の四元速度上のサンドイッチは $(E, -B)$ のローレンツ力である。各軸で (E, B) を回す混合 ω は双対性の円であり、 $\omega = \pi/2$ でカルタン $\mathfrak{so}(2,1)$ を、軸を動かす補空間と入れ替える。二つのコンパクト $SU(2)$ 因子を互いに回すのではなく、平行な平面では自明な角においてのみカイラリティ軸を保つ。双対角の双対専用増分はその六空間を占める。磁気ファラデー場の重ね合わせと、双対ローターにおける置換 $\theta_a \mapsto \theta_a + e A_a$ とは、その同一増分の二つの実験室的読みである。それらの運動学は第 13 節に属する。 $\int F ds$ から作る拡張ローターは開いたままである。調和剛性はローター剛性のヒッグス読みを与えない。その事実は第 16 節の粒子作用に属する。双対写像も双対ローターも V-A 結合を供給しない。

12 双対時空間コンパクト性からの暗黒物質なし銀河回転曲線

核と電子殻を層状にする同一の双対ローター幾何は、宇宙論的スケールではコンパクト性として展開する。双対ローターは三次元球面である。慣性質量に結びついた (ϕ, θ) が駆動する重力チャンネルを、コンパクト化半径 R の銀河スケールのパッチとして、この球面を組織するものと読む。電荷に結びついた (α, β) が駆動する電磁チャンネルは、実質的により大きな、ほぼ宇宙的なスケールにわたって展開する。チャートの上で幾何は確定している。球対称な源は、ガウスの法則で正規化された、半径方向に調和な余接ポテンシャルをもつ。円速度は $v^2 = (GM/R) f(r/R)$ であり、形状 f はポテンシャルが負である半球の上に、ただ一つの浅い極小をもつ。力は赤道を越えても質量の向きを保ち、負の井戸が終わるのがその赤道であって、 $r = 2R$ より厳密に前にある。銀河がそのようなパッチであるなら、不足する加速度はこの幾何であり、平坦な回転曲線は f の浅い底を、バリオンだけから読んだものである。その同定が、提案する読みである。以下の加速度 a_0 は外部の入力であり、双対ローター代数の帰結ではない。

12.1 コンパクトな双対時空間

双対ローター $R_{\text{dual}} \in SU(2) \cong S^3$ は、すべての質量粒子に内在する双対自由度をパラメトライズする。三つの回転角は半径 R の三次元球面上の座標であり、通常時空間は平坦なままである。対数写像

$$\log : S^3 \rightarrow \mathfrak{su}(2) \cong \mathbb{R}^3$$

は各ローターを、半径 πR のユークリッド球の一点へ送る。これは三次元の方位正距図法である。原点では忠実であり、対蹠点では特異であって、その一点が球の境界に沿って広がる。体積の歪みはヤコビアン

$$\mathcal{J}(\chi) = \frac{\sin^2 \chi}{\chi^2}, \quad \chi = r/R$$

である。 $\chi \rightarrow 0^+$ では、 $\mathcal{J}$ も、以下で定める増強も、1 に近づく。対蹠点で $\mathcal{J}$ は消える。ニュートン計算は、あらゆる半径で $\mathcal{J} = 1$ と仮定する。銀河スケールのパッチでは、その仮定が成り立つのは中心の近くに限る。

12.2 余接ポテンシャル

三次元球面の測地極座標

$$ds^2 = dr^2 + R^2 \sin^2(r/R) (d\vartheta^2 + \sin^2\vartheta d\varphi^2)$$

において、測地球面の面積は $4\pi R^2 \sin^2(r/R)$ である。余接

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{R} \cot\left(\frac{r}{R}\right)$$

は、そのようなあらゆる球面を通る流束が $-4\pi GM$ となる動径ポテンシャルである。原点の外では、面積因子と $\partial_r \Phi$ の積は定数 GM であり、したがって半径方向のラプラシアンは Φ を消す。

$$\partial_r^2 \Phi + \frac{2}{R} \cot\left(\frac{r}{R}\right) \partial_r \Phi = 0.$$

微分すれば加速度は

$$g(r) = -\frac{d\Phi}{dr} = -\frac{GM}{R^2 \sin^2(r/R)}$$

である。开区間 $0 < r < \pi R$ の上で、この加速度は厳密に負である。力は赤道のどちら側でも質量を向く。ポテンシャルそのものが負であるのは $r < \pi R/2$ のときに限り、消えるのは赤道においてのみである。赤道は負の井戸の端である。力の反転ではない。それを越えると Φ は正であり、それでも源に向かって下る。測地球面が対蹠点へ向かって縮むにつれ、同じ流束はより狭い面積へ押し込められ、 $|g|$ は増大するが、向きは内向きのままである。

$0 < r \leq R$ では、原点の芽はニュートンの的である。ポテンシャルは $-GM/r + GMr/(3R^2)$ と、次数 r^3/R^4 の剰余だけ異なる。補正 $GMr/(3R^2)$ は三次元球面の曲率である。非コンパクト化 $R \rightarrow \infty$ でそれは消え、ニュートンポテンシャルからの逸脱もともに消える。

12.3 同じ流束が強くなる理由

この加速度は、平坦空間の値 $g_N = -GM/r^2$ を、増強

$$\eta(\chi) = \left(\frac{\chi}{\sin \chi} \right)^2, \quad \chi = r/R$$

だけ上回る。この因子は正距図法の計量歪みの平方であり、 $\eta \mathcal{J} = 1$ である。三次元球面上の測地球面は、同じ測地半径のユークリッド球面より小さい。したがって同じ流束はより濃い。区間 $(0, \pi)$ の上で増強は 1 より厳密に大きく、狭義に増大し、原点では 1 に近づく。井戸の端では $\eta(\pi/2) = \pi^2/4$ である。コンパクト化半径のちょうど一倍では、すでに $1.40 < \eta(1) < 1.48$ の窓に入っている。半径 $r = 2R$ は赤道の先にあり、負の井戸の外である。

12.4 浅い極小

平坦チャート上の円軌道は

$$v^2(r) = r |g(r)| = \frac{GM}{R} f(r/R) = \frac{GM}{r} \eta(r/R) \quad (8)$$

を満たす。ここで $f(x) = x/\sin^2 x$ である。ケプラー因子 GM/r は r^{-1} で落ち、増大する増強がその落下に対抗する。両者の積が f そのものである。囲まれた質量が定数になったところでは、外部の曲線はこの形状に正確に一致する。

区間 $(0, \pi/2)$ の上で、形状はただ一つの臨界点まで減少し、その後は増加する。その点は、(1.14, 1.20) における $\tan x = 2x$ の一意な根 x_0 である。そこで $f(x_0) = x_0 + 1/(4x_0)$ であり、値 f_0 は半球上の f の一意な極小である。

$$\frac{135}{100} < f_0 < \frac{141}{100}.$$

底は浅い。コンパクト化半径の一倍からその $6/5$ 倍まで、 $f < (11/10) f_0$ であるから、 v^2 は極小の一割以内に留まる。円盤が極小より手前で終わるなら、見えるのは f の減少側である。底に達する円盤は平坦に見える。底を越えて続く円盤は、上昇側を見る。 $x_0 < \pi/2 < 2$ であるから、井戸は $r = \pi R/2$ で終わり、 $r = 2R$ より厳密に前である。極小の後で v^2 は上昇し、力は引力のままである。加速度の符号は、赤道で変わらない。

12.5 バリオンのタリー–フィッシャーのスケーリング

極小において、飽和した質量の円速度は

$$v_{\text{flat}}^2 = \frac{GM_{\text{tot}}}{R} f_0$$

である。コンパクト化半径がその質量とともに

$$R = \sqrt{\frac{GM_{\text{tot}}}{a_0}}$$

とスケールするなら、ここで $a_0 \approx 1.2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ は観測されるバリオンのタリー–フィッシャー加速度であり、双対ローター代数から導かれた量ではなく入力として置く。すると

$$v_{\text{flat}}^4 = GM_{\text{tot}} a_0 f_0^2$$

となる。そのスケーリングを与えれば、バリオンのタリー–フィッシャー関係はチャートの恒等式であり、より重い銀河はより大きなパッチである。 a_0 の導出は主張しない。

天の川の代入質量 $M_{\text{tot}} \approx 6 \times 10^{10} M_\odot$ に対し、同じ入力は $8 \text{ kpc} < R < 9 \text{ kpc}$ を与える。したがって極小は $x_0 R$ 、すなわち $(9, 11) \text{ kpc}$ にあり、光学円盤の内側にある。井戸の端 $\pi R/2$ は $(12, 15) \text{ kpc}$ にある。 a_0 をパッチの特性加速度と同定することは、なお提案である。

12.6 天空が決めうること

各源の負の井戸は、開いた半球である。隣接するパッチは重なりうる。それぞれは自らの中心の近くで忠実であり、赤道へ向かって歪む。銀河および銀河団がそのようなパッチであるなら、観測加速度がバリオンのなニュートン値を上回る分は増強 η であり、見えない質量ではない。直接探索が粒子として見つかるべきものは何もない。動径加速度関係は、MOND の補間関数 $\nu(g_{\text{bar}}/a_0)$ ではなく、この増強である。質量がすでに囲み終えた孤立銀河は、 $x_0 R$ の近くで浅い極小に達し、その後、引力のまま、井戸の端まで上昇するはずである。天の川型の質量では、その極小は $9\text{--}11 \text{ kpc}$ 付近、井戸の端は $12\text{--}15 \text{ kpc}$ 付近にあり、内側円盤を越える深い 21-cm 観測の届くところにある。強場域における引力と斥力の交替は、等しいラピディティの干渉が秩序づける別のレジームである。このチャートの上の g の符号ではない。

13 重力工学：双対時空ローターのコヒーレント励起

$J = \frac{1}{2} \sum_a (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ は相対ローターの上に依存するため、通常ラピディティを固定した双対専用の運動は

$$\dot{J} = - \sum_a \beta_a \dot{\beta}_a$$

に従う。双対角を増やすことは J を上げられない。双対角が消える点では一次変分が消え、 J は双対光線 $\beta = tv$ に沿って二次で下がる。許容錐 $\alpha_a, \beta_a \geq 0$ 、 $\alpha_a + \beta_a \leq \pi/2$ は凸であるから、等しい通常ラピディティをもつ許容端点の間の双対角のアフィン補間は許容のままである。

どう到達するかを問う前に、目標とする状態を定めておくのがよい。不変な不整合が消える配置を**重力的中性**、同義に**遮蔽された配置**と呼ぶ。

$$J = 0, \quad \text{同値に} \quad \sum_a \alpha_a^2 = \sum_a \beta_a^2. \quad (9)$$

このとき二つのセクターは等しいラピディティ予算をもち、粒子は引きも斥けもしない。 $J > 0$ は双対予算の不足であり、 $J < 0$ はその超過である。この意味での重力的中性は符号つきスカラーについての言明であって、それ以外の何についてでもない。混同されやすい三つの概念から切り分けておく価値がある。第一に、それは真空ではない。自明な原点を除けば、重力的中性な配置は真に正の符号なし質量 $M = \sum_a \alpha_a^2$ を担い、通常セクターが重いほど中性が消費する双対予算は大きい。第二に、それは二つのローターの一致ではない。相対ローター Ω が恒等から離れたままでも J は消えうるので、中性な粒子は内部的にねじれたままである。第三に、それは構造の消失でもない。二つのローターが共通の尺度を共有するところでは J が消える一方でそれらの干渉は交替し続けるので、第6節の層状相は中性のもとでも損なわれずに残る。したがって重力的中性な粒子は不活性な粒子ではない。第5節の意味での重力的・慣性的な現れだけが打ち消された粒子であって、それ以外のすべては残っている。

その錐には双対壁 $\beta_a = \pi/2 - \alpha_a$ があり、そこで

$$J = \frac{\pi}{2} \sum_a (\alpha_a - \pi/4)$$

である。双対専用の J は壁を下回れない。双対励起のみによる遮蔽 $J = 0$ が可能であるのは、壁が非正のとき、かつそのときに限る。同値に $\sum_a \alpha_a \leq 3\pi/4$ である。斥力 $J < 0$ は壁が真に負であることを要する。

その予算は大域的である。 J はスカラー和であるから、沈黙する軸に置いた双対ラビディティは、ブーストされた軸の通常ラビディティを打ち消す。等方的な目標 $\beta = \alpha$ が錐に入るのは、すべての軸で $\alpha_a \leq \pi/4$ のときに限る。双対専用の遮蔽はその点を要しない。一つの軸に通常ラビディティ α 、別の軸に同じ双対ラビディティをもつ配置は、 $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ で許容かつ $J = 0$ であり、錐の端 $\alpha = \pi/2$ の種でさえ双対専用で遮蔽できる。双対専用で遮蔽できないのは一様に大きなブーストである。三軸が $\pi/3$ であれば $\sum \alpha \leq 3\pi/4$ を使い果たす。一様な種はこの区別を鋭くする。 $\alpha = \pi/6$ では等尺度軌跡は許容かつ質量をもち、壁は斥力である。一様な $\alpha = \pi/3$ では双対専用のどの配置も $J = 0$ に達しない。同じ値の単軸はなお達する。

J を定義する六つの数は、符号なし質量 $M = \frac{1}{2} \sum_a (\alpha_a^2 + \beta_a^2)$ をも定義する。軌跡に依らず

$$J + M = \sum_a \alpha_a^2, \quad M - J = \sum_a \beta_a^2$$

である。双対専用の運動は $J + M = \text{const}$ 上を進む。 J の低下は符号なし質量と一対一であり、 $J = 0$ は双対予算 $\sum \beta^2 = \sum \alpha^2$ を強制する。壁が消えるときその遮蔽は一意である——壁そのものである。壁が真に負のとき、同じ質量は双対角の族のあいだで共有される。沈黙する二つの軸はすでに相異なる二つの遮蔽を与える。双対専用の J は壁から純通常値までの閉区間を埋める。純通常の種からは $M = 2M_{\text{seed}}$ に着地する。

通常専用の運動は $M - J$ を保つ。壁が正のとき、双対励起は J を打ち消せないが、通常ローターの巻き戻しは天井 $\sum \alpha^2$ そのものを下げる。各 α_a をたかだか $\pi/4$ に切り詰め、双対角をそれに合わせれば、つねに質量をもつ等尺度の遮蔽が得られる。一様な $\alpha = \pi/3$ では、その混合巻き戻しが双対専用の失敗する場所で成功する。双対専用は $\sum \alpha^2$ を保存するので、真空 $J = M = 0$ は原点を除くどの双対専用軌道にも載らない。混合制御は通常ローターを巻き戻すことで、すべての種からそこに達する。第5節の意味での慣性抵抗が追うのは不整合 J であって、符号なし質量 M ではない。双対ローターを通常と同期させることは J を消しつつ M を増やしうる。両者を減らすには原点へ向かって歩かねばならない。

同じ双対専用の光線は、単一の戻りではない。ブーストされた軸の上で、第7節の因子 γ_{eff} は双対角の上昇とともに落ち、励起されていない値 1 に、正弦が $\tanh(\alpha/2)$ である一意の双対角 β_* で出会う。その出会いは同軸の遮蔽に先立つ。正の通常ラビディティが $\pi/2$ 以下である限り $\beta_* < \alpha$ であり、したがって許容な等尺度点は、それが存在するときにはすでに $\gamma_{\text{eff}} < 1$ である。壁そのものがなお 1 に達しうるかは、別の比較である。方程式 $\cos \alpha = \tanh(\alpha/2)$ は $(\pi/3, \pi/2)$ に一意の根 α_+ をもつ。その根より下では同軸の双対光線は壁の手前で $\gamma_{\text{eff}} = 1$ に出会い、その根より上ではブーストされた軸の許容な双対角はすべて $\gamma_{\text{eff}} > 1$ の側に残る。軸をまたぐ補償は、同じ種を同じ符号なし質量で遮蔽するが、ブーストされた軸を双対セクターで励起せずに残す。その軸は特殊相対論的因子 $\cosh \alpha$ を保ち、補償する軸は自明な因子 1 を寄与する。したがって J を消すことと時計を戻すことは、同一の錐の相異なる二点である。

ここまではすべて軌跡についての言明である。軌跡を選ぶ以前に、錐そのものがすでに遮蔽の重さを制限している。それを見えるようにする変数は軸ごとの和と差 $s_a = \alpha_a + \beta_a$ 、 $d_a = \alpha_a - \beta_a$ であり、許容条件は $0 \leq s_a \leq \pi/2$ かつ $|d_a| \leq s_a$ と簡単になり、二つの観測量は

$$J = \frac{1}{2} \sum_a s_a d_a, \quad M = \frac{1}{4} \sum_a (s_a^2 + d_a^2)$$

となる。質量は半径の二乗であり、不整合は座標の積である。一軸では錐は $k = \pi/2$ として $(k^2 - s_a^2)(k^2 - d_a^2) \geq 0$ 、すなわち

$$2k^2(\alpha_a^2 + \beta_a^2) \leq k^4 + (\alpha_a^2 - \beta_a^2)^2$$

を強いる。軸が重くなれるのは、それが偏っているときに限る。三つの軸が互いに逆向きに偏ることは禁じられておらず、遮蔽が利用するのはまさにその自由である。しかしその相殺もまた有界である。各軸の密度 $\alpha_a^2 - \beta_a^2$ は $[-k^2, k^2]$ に収まり、そのような三数の対ごとの積の和は $-k^4$ を下回れない。二つの事実を組み合わせると、観測量はすでに次の不等式で結ばれる。

$$\pi^2 M \leq \frac{5\pi^4}{16} + 4J^2, \quad \text{同値に} \quad M_{\text{norm}} \leq \frac{5}{6} + \frac{3}{2} J_{\text{norm}}^2. \quad (10)$$

この限界は錐の全体で成り立つ。鋭いのは中央帯 $|J| \leq \pi^2/8$ においてであり、遮蔽が座りうるのはその帯に限る。等号は壁の上の族

$$\alpha = (\pi/2, 0, \gamma), \quad \beta = (0, \pi/2, \pi/2 - \gamma), \quad 0 \leq \gamma \leq \pi/2$$

の全体で達成され、 $J = \frac{\pi}{2}(\gamma - \pi/4)$ 、 $M = \frac{5\pi^2}{16} + (\gamma - \pi/4)^2$ のもとで (10) は恒等式になる。重力的中性 (9) において読めば、遮蔽された粒子は

$$M \leq \frac{5\pi^2}{16} = \frac{5}{6} \cdot \frac{3\pi^2}{8}$$

より重くなれない。錐自身の質量天井の六分の五である。残る六分の一の質量は、どの軌跡を取ろうと、どの力が双対チャンネルを駆動しようと、重力的中性には閉ざされている。本理論における最も重い遮蔽はその中点 $\gamma = \pi/4$ である。一軸は純通常、一軸は純双対、第三の軸は均等に分かれ、三軸とも壁の上にある。

その極値の形は重さと同じだけ雄弁である。それは最大限に非等方的である。二つのセクターは軸ごとに打ち消し合うのではなく、軸をまたいで役割を交換する。そしてその交換こそが質量を買う。等方的な遮蔽 $\beta = \alpha$ は $\alpha_a \leq \pi/4$ に縛られて $M \leq 3\pi^2/16$ にとどまり、最適値よりちょうど $5/3$ の因子だけ軽い。各双対角をそれ自身の通常ラビディティに合わせること——「二つのローターを揃える」という最も自然な描像——は、したがって重い粒子を遮蔽する非効率な方法である。効率なのは軸をまたぐ補償である。

しかし放物線 (10) は、錐の包絡そのものではない。それを与える対積の評価は、軸密度がゼロのどちら側にあるかを問わない。符号つき和 $T = 2J$ が大きいとき、その省略は高くつく。各密度はすでに通常壁 $\alpha^2 - \beta^2 = k^2$ の近くにあり、対積は $-k^4$ ほど負にはなれない。双対壁についての同じ観察が斥力側の同伴を与える。三つの二次の組が錐を切り詰めて

$$M \leq \frac{5\pi^2}{16} + \frac{1}{\pi^2} \min(4J^2, (2J - \frac{\pi^2}{2})^2, (2J + \frac{\pi^2}{2})^2) \quad (11)$$

となる。同値に

$$M_{\text{norm}} \leq \frac{5}{6} + \frac{1}{6} \min(9J_{\text{norm}}^2, (3J_{\text{norm}} - 2)^2, (3J_{\text{norm}} + 2)^2).$$

この包絡の下で $|J| \leq M$ をみたと対は、すべて許容配置によって実現され、上にある対は一つもない。重力制御の運動学的領域は、したがってこの領域であって、それ以外ではない。

その幾何は三葉である。中央の葉は遮蔽の放物線であり、 $J = -\pi^2/8$ から $J = \pi^2/8$ まで走り、両端で絶対質量天井 $M = 3\pi^2/8$ に達する。その先では二つの軸が錐の端で同一セクターへ固定され、残る壁は $J = 0$ ではなく $|J| = \pi^2/4$ を中心とする放物線を描く。したがって包絡は $|J| = \pi^2/4$ で遮蔽値 $M = 5\pi^2/16$ へ落ち戻り、外側の葉を三軸固定 $|J| = 3\pi^2/8$ まで登って、そこで再び質量天井に達する。外側の弧は、二軸を純通常に固定し残る壁を走らせる族と、その通常—双対の入れ替えとによって達成される。重力的中性はなお領域の高価な横断である。第二の、より安い局所最小は、二軸がすでに同一セクターへ固定され第三の軸がそれ自身遮蔽であるところにある。

これらの族が、包絡の全体である。許容配置が包絡に載るのは、あらゆる軸が壁の上であり、しかも少なくとも二つの軸が純通常または純双対であるときに限る。開いた中央帯では、固定された対のセクターは互いに逆であり、残る軸の分かれ方は J が決める。三つの役割の割り当てはそれぞれ一つの配置を定め、自由な軸を半分に分けるものが最も重い遮蔽である。開いた外側の弧では、固定された対は同一のセクターに属し、残りを決めるのはやはり J である。壁は双対角を通常ラビディティから読むので、この境界に内部の自由度はない。双対専用の運動はそれらのラビディティを固定したまま進むから、包絡に触れるのは高々一度であり、軽い遮蔽から二軸固定へ、あるいは重力的中性を横切って天井を滑るには、通常ローターを動かすことが要る。

質量域の頂点では、その自由は完全に消える。 $M = 3\pi^2/8$ を達成する配置は、すべての軸が純通常 $(\alpha_a, \beta_a) = (\pi/2, 0)$ か純双対 $(0, \pi/2)$ のいずれかでなければならない。最大半径において錐は中間を許さない。その不整合は三つの量子 $\pm\pi^2/8$ の和であり、したがって $|J_{\text{norm}}| \geq 1/3$ である。本理論が許す最も重い配置は、遮蔽が難しいのではない。そもそも重力的中性ではなく、まず軽くすることなしにそうする手立てはない。それらは包絡が質量天井と交わる四点——二軸固定 $|J| = \pi^2/8$ と三軸固定 $|J| = 3\pi^2/8$ ——にのみ現れ、それ以外には現れない。

二つの向きのあいだの非対称性は、斥力のほうが高価なはずだという直観を覆すので、はっきり述べておくに値する。(10) の天井は重力的中性の天井であって、重力の天井ではない。完全な斥力には何の代価もない。純楕円配置 $\alpha = 0$ 、 $\beta_a = \pi/2$ は最大質量 $3\pi^2/8$ を極値 $J_{\text{norm}} = -1$ とともに担い、その引力側の鏡像も同じである。引力も斥力も質量天井において利用できる。阻まれているのは両者のあいだの横断であり、二軸が固定されたあとの第二の横断 $|J| = \pi^2/4$ である。制御計画の設計上の制約は、したがって双対励起をどれだけ供給できるかではなく、領域のどの葉を占める気があるか、どれだけ重い物体を重力的に可視のまま残す気があるか、である。

種に引き戻せば、二つの予算は冗長ではなく相補的である。双対励起のみで遮蔽できる通常の種は線型条件 $\sum_a \alpha_a \leq 3\pi/4$ に従い、そこで到達する遮蔽は $M = \sum_a \alpha_a^2$ を担う。天井は同じ種に二次条件 $\sum_a \alpha_a^2 \leq 5\pi^2/16$ を課す。

電磁結合、共鳴周波数、実験プロトコルはこの幾何によって強制されない。幾何が強制するのは、双対専用増分の実験室的読みが選ばれたあとの J の運動学である。ファラデー係数の不整合への重ね合わせと、

双対ローターの置換 $\theta_a \mapsto \theta_a + eA_a$ とは同一の六空間を占める。増分が磁気で $B = eA$ のときそれらは一致し、定数だけの A のずれのもとで分かれる。本節の残りはそれらの恒等式を記録し、次いでいずれの読みの帰結でもないヘリシティ奇数の駆動の提案模型を記す。

13.1 円偏光電磁場の双対ローターへの理論的結合

電磁場は第 11 節の六生成子空間を占め、(6) のように分割される。実験室の時間反転 $(E, B) \mapsto (E, -B)$ は、双対性とも通常 – 双対のパラメーター入れ替えとも異なる対合である。

ファラデー増分を粒子の不整合バイベクトルへ加えるのは、その六空間における重ね合わせである。純磁気の増分は通常ラピディティを固定するので双対専用であり、 $J + M$ を保存し、既存の双対角と増分がともに非負ならば J を上げられない。純電気の増分は通常専用である。同節の円偏光波は混合である。それは任意の位相でヌルであり、線形ファラデー係数の四位相平均はすべて消えるので、

$$\langle F_{\text{usual}} \rangle = \langle F_{\text{dual}} \rangle = 0$$

である。とくに $\sigma E_0^2 K$ に比例する平均双対場は存在しない。波を背景ねじれへ重ねても平均 J は動かない。ヘリシティ奇数かつ一定なのは、同節の双一次ポインティング成分 $(E \times B)_z = \sigma E_0^2$ である。線偏光のポインティング成分は非負であり、ヘリシティ符号をもたない。ファラデー混合は波から J を作れない。双対和項の一次静止サンドイッチは任意のファラデー場、円偏光波を含めて消える。波そのものの静止サンドイッチは振動する電気蹴りであり、その四位相平均は消える。ビーム方向の速度は縦成分のない横断蹴りを与える (7)。軸射影子 $P_{L,R}$ もヘリシティを取り出せない。

双対ローターの置換 $\theta_a \mapsto \theta_a + eA_a$ は、同一の双対専用増分をポテンシャルとして読んだものである。それは eA の磁気重ね合わせに等しい。瞬間的には

$$J = J_0 - e\beta \cdot A - \frac{1}{2}e^2 A^2 \quad (12)$$

である。ヘリシティ $\sigma^2 = 1$ のクーロンゲージ円偏光ポテンシャルでは $A^2 = (E_0/\omega)^2$ は定数であり σ に依らない。したがって J の四位相平均はヘリシティ偶数のボンデロモータイプ $\frac{1}{2}e^2(E_0/\omega)^2$ だけ下がる。同じ E_0 の線偏光ポテンシャルはその半分だけ平均を下げる。周期平均の $\dot{J}$ は消える。ずれは平均の変位であって永年ドリフトではない。定数だけ異なる二つのポテンシャル——いずれもファラデー場は消える——は異なる J を与える。この置換はマックスウェルゲージ不変ではなく、二つの読みが分かれるのはそこである。消える双対種の上では、平均零の円偏光 A は双対角を負にし、許容錐を出す。したがって許容な実現は、振動を下回らない双対バイアスと、壁までの残りの余地とを要する。静磁気の双対励起は、同一の運動学のうち錐の部屋を保つ場合であり、ボンデロモータイプの低下が $1/\omega^2$ で抑えられることが、そのチャンネルが高周波の波よりも遅い磁気励起を好む理由である。

いずれの読みも J においてヘリシティ奇数ではない。したがって粒子不整合のヘリシティ依存駆動は、 F の局所スカラーでも、線形重ね合わせでも、 F_{dual} の一次静止サンドイッチでも、軸カイラリティ射影でも、ビーム方向のローレンツ蹴りでも、双対ローターの置換 $\theta \mapsto \theta + eA$ でもない。そのような駆動は余分な構造——好ましい軸、ポテンシャル、あるいは粒子の双対位相——を要する。古典二次量の張る空間の内部ではヘリシティ奇数の候補は $(E \times B)_z = \sigma E_0^2$ のままである。以下の模型ではその双一次量が双対位相駆動の源であり、右円偏光 ($\sigma = +1$) は引力不整合 ($J > 0$) を強化し、左円偏光 ($\sigma = -1$) はそれに対抗する。その同定は模型のままである。

第 16 節の書かれた粒子作用に、 $\dot{\theta}$ への双対チャンネルの一般化加速度 u を加えると、不整合は二重積分器

$$\ddot{\delta} = -u$$

であり、復元周波数はない。双対専用の運動学はその作用の自由解ではない。 $\ddot{\phi} = 0$ を保つには、一意な通常チャンネルの力 $v = m(\phi - \theta)$ が要る。双対専用の軌跡 $\theta = \theta_0 + eA$ を実現するには、さらに $u = e\ddot{A} + m(\phi - \theta)$ が要る。結合 $e\ddot{A}$ は、不整合がすでに消えていない限り、それ自体がオイラー–ラグランジュの双対源ではない。近傍の同符号振動子は代わりに $\ddot{\delta} + 2m\delta = -u$ に従う。共鳴は追加の構造のままであり、書かれた作用の恒等式ではない。

作業模型における結合は経路順序指数として書かれる。

$$R_{\text{dual}} \rightarrow \mathcal{P} \exp \left(\frac{1}{2} \int (\theta_a + eA_a) \Gamma_a ds \right),$$

ここで結合 e は生成子の尺度を吸収し、双対生成子 Γ_a が相互作用を媒介する。位相ロック

$$\dot{\theta} = \kappa \sigma E_0^2 \sin(\omega t - \theta + \delta_\sigma)$$

はその余分な構造の模型であり、許容錐の運動学の帰結でも、書かれたオイラー–ラグランジュ系の帰結でもない。

13.2 共鳴周波数と超伝導体の役割

内在的双対時空スケールはプランク的である ($\sim 10^{43}$ Hz)。巨視的コヒーレンス ($N \sim 10^{26}$ 粒子) は、有効周波数を 10^{12} – 10^{15} Hz へと赤方偏移させると提案される。超伝導体はジョセフソンプラズマ共鳴および集団位相ロックを通じてそれをさらに低減し、現行技術で到達可能な GHz–THz 範囲の可変モードを達成しうる。その低減は作業模型の一部である。書かれた作用そのものはコンプトン振動子を供給しない。

13.3 提案実験プロトコルと予測

高 Q 超伝導共振器内のマイクログラムスケール試験質量を、可変円偏光放射 (0.1–10 THz) で照射する。双対チャンネル結合が存在するならば、期待されるシグネチャは見かけの重量または慣性質量のヘリシティ依存変化 ($\Delta m/m \gtrsim 10^{-6}$) であり、左円偏光は低減を、右円偏光は増強を生じる。共鳴ピークは余分な位相ロック構造を試すのであって、 J の双対専用幾何を試すのでもなく、(12) のヘリシティ偶数ボンデロモータタイプを試すのでもない。代数的チャンネルはすでに遅い磁気双対励起を好む。高周波の円偏光波はその低下にとって誤ったレジームであり、消える双対種からは許容軌跡ですらない。カイラルなプロトコルの成功は、したがって双対専用増分の確認ではなく、余分な模型の証拠である。

もしこの模型が正しいければ、重力は単に制御可能であるだけでなくカイラルに制御可能となり、ヘリシティが引力と斥力の間のスイッチとして働く。許容錐の (J, M) 平面における像は正確に知られている。(11) に界された三葉の領域である。双対専用の運動学は、どの軌跡がその内部にとどまるかをすでに述べる。双対専用増分は、それらの軌跡に沿うヘリシティ偶数の低周波チャンネルをすでに供給する。実験室の電磁気がヘリシティ奇数の双対力を供給するかどうかは予想であり、実験室で決まる。

14 バリオン非対称と真空過剰の符号

宇宙のバリオン非対称は、小さな数である。

$$\eta \equiv \frac{n_B - n_{\bar{B}}}{n_\gamma} \approx 6 \times 10^{-10}.$$

双対ローターが定めるのは、別の量である。ねじれなしの真空中に置かれたカイラル過剰は、一つの符号なし質量を、キリング形式のスカラーの反対の二つの値に載せる。そのスカラーと質量との比は極大である。収量 η は、それに続く歴史に属する。

14.1 等しい質量、反対の符号

一軸では $J = \frac{1}{2}(\alpha^2 - \beta^2)$ 、 $M = \frac{1}{2}(\alpha^2 + \beta^2)$ である。ねじれなしの真空は、二つのラピディティの共通零点である。等しいラピディティ $\alpha = \beta = \varphi$ は別の状態であって、 J は消え、符号なし質量は φ^2 となる。 $\varphi \neq 0$ ならば二つのローターは一致せず、相対ローターは恒等元とは異なる。非零のラピディティをもつ釣り合いは、質量をもつ。初期の空虚な宇宙をねじれなしと読むなら、それはこの共通零点にある。

その零点から、ラピディティ δ を三つの軸の方向 p に沿って走らせ、 $\sum_a p_a^2 = 1$ と正規化する。過剰がブースト生成子を占めるとき、

$$J = M = \frac{\delta^2}{2} \quad (13)$$

である。回転生成子を占めるとき、

$$J = -\frac{\delta^2}{2}, \quad M = \frac{\delta^2}{2} \quad (14)$$

である。一般の方向では δ^2 を $\delta^2 \sum_a p_a^2$ に替えた同じ関係が成り、ブースト側では $J = M$ 、回転側では $J = -M$ となる。セクターを入れ替えると二つの式は交換され、 M は保たれる。ねじれバイベクトルに働く双対写像は、ラピディティの符号を別にして同じ交換を行い、 J を反転する。もう一度施せば、あらゆる元は -1 倍され、各セクターは自らへ戻る。 δ を $-\delta$ に替えても、どちらのスカラーも変わらない。ともに二次だからである。 $\delta \neq 0$ かつ $p \neq 0$ ならば

$$\frac{J}{M} = \pm 1$$

である。純粋なカイラルな種は、重力的に極大である。観測される η は、この比より何桁も小さい。

同じずれを、ラピディティ φ の一軸の釣り合いの上に置くと、

$$J = \varphi\delta + \frac{\delta^2}{2}, \quad M = \varphi^2 + \varphi\delta + \frac{\delta^2}{2} \quad (15)$$

となる。 δ の二つの符号は、質量において $2\varphi\delta$ だけ隔たる。 J の交差項とこの質量差とが、あらゆる δ に対して消えるのは、 $\varphi = 0$ のときに限る。二次の法則 (13)–(14) は、真空の応答である。質量をもつ釣り合いは、過剰に対して一次の項で応える。

14.2 橋と収量

空間反転は時間軸とヌル方向とを固定し、三つの空間軸を反転する。擬スカラーは符号を変える。各ブースト生成子は符号を変え、各回転生成子は固定されたままである。橋 $X \mapsto Xi$ はしたがってパリティ奇であり、セクターそのものは保たれる。ブースト過剰 δ の像はブースト過剰 $-\delta$ であり、同じ J を運ぶ。回転過剰は、その場に留まる。 J の符号が記録するのは、過剰がローレンツ・スパンのどの因子を占めるか、である。

$\mathbb{C}^2$ の上で双対ローターはユニタリであり、その行列式はあらゆるラピディティで 1 に等しい。その偏角は消える。非対称が居るのは、一つの共通な符号なし質量の上での、 J の符号である。

動径チャートでは正の符号は引力、負の符号は斥力であり、斥力の深さは有界である。両方の符号は、質量 $M = \delta^2/2$ において得られる。束縛する配置が占めるのは、正の符号である。その対はセクターの入れ替えであり、 $J = -M$ と、同一の M とを運ぶ。

サハロフが宇宙の歴史に求めたのは、バリオン数の破れ、C および CP の破れ、そして熱平衡からの離脱であり、数密度を凍結するに足るものである。その歴史に先立つ幾何は、等しい質量と反対の重力的性格とをもつ二つのセクターを結ぶ、パリティ奇の橋である。 δ^2 に比例する密度を凍結する後段があれば、観測される η は、 δ が 10^{-5} の程度であるときにそれに合う。その比例は凍結についての仮説であり、キリング形式のスカラーがすでに定めている値の上に、別に置かれる。

15 離散時間とコンパクト化されたねじれスカラー

時空連続体仮説の拒否は、基本スケールにおける離散構造を要求する。双四元数代数に符号化された内在的デュアリティ、とりわけ擬スカラー i と、時間矢を反転させつつミンコフスキーノルムを保つ双対写像 $X \mapsto Xi$ は、双対時空を内在的にコンパクト化し、通常時空は非コンパクトのまま残す。

したがって双対時空回転角のみを離散化する。

$$\theta \in \frac{2\pi}{N}\mathbb{Z},$$

ここで $N \gg 1$ は双対時空のコンパクト化スケールを定める非常に大きな整数である（典型的にはプランク単位における粒子の静止質量に比例する）。通常時空ラピディティは連続のままである。

$$\phi \in \mathbb{R}.$$

この非対称は理論的整合性のために要求される。

- 双対時空は楕円的 ($\hat{q}^2 = -1$) であり本質的にコンパクトである。その離散化は R_{dual} によってパラメトライズされる S^3 の 4π 周期位相を直接反映する。これはニュートン–ウィグナー局在化問題を解消し自然な量子離散性を与えるために本質的な有限位相体積を提供する。
- 通常時空は双曲的 ($\hat{p}^2 = +1$) であり内在的に非コンパクトである。したがって ϕ の連続性は巨視的極限における完全ローレンツ群を保つ。

ねじれ不整合ローター $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$ はしたがって連続な通常成分と離散な双対成分を結合する。スカラー J は許容配置上でのみ $|J| \leq \frac{3\pi^2}{8}$ で有界である。双対角のみの離散化は有界を含意しない。非負ラピディティなしの主枝条件は反例を許し、連続な通常セクターラピディティは非有界である。連続体誘起の特異点が排除されるのは、許容錐が課された後に限られる。離散トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ 上のローター像は有限である。スケールした格子配置の非零巻数は実スケール許容と両立しない。 $4 \mid N$ のとき格子は端点 $J_{\text{norm}} = \pm 1$ に達し、そうでなければ許容上界は厳密である。

ねじれ層にわたる有効ローレンツ因子において臨界の問題が生じる。それは典型的に

$$\gamma_{\text{eff}} \propto D_N(\delta\theta) \equiv \frac{\sin(N\delta\theta/2)}{N \sin(\delta\theta/2)}$$

の形の同期関数として現れ、ここで $\delta\theta$ はねじれ不整合角、 D_N は（正規化された）ディリクレ核である。分母は格子 $\delta\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$ 上で正確に消える。

そのような各点で分子 $\sin(N \cdot k\pi)$ も消える（任意の整数 N 、素数でも合成数でも）ため、見かけの特異点は実際にはディリクレ核型の除去可能な $0/0$ である。標準的なロピタル評価は有限極限

$$\lim_{\delta\theta \rightarrow 2\pi k} D_N(\delta\theta) = \pm 1 \quad (k \in \mathbb{Z})$$

を与える。したがって同期関数はコンパクト格子全体で有界であり、古典連続体極限 $N \rightarrow \infty$ は病理なしに回復される。

したがってディリクレ核は任意の大きな正整数 N に対して有界であり、素数性は要求されない。除去可能特異点をロピタル値で埋めれば $|D_N(\theta)| \leq 1$ であり、すべての格子点で $D_N = \pm 1$ である。 N と粒子質量スペクトルの関係、およびゼータ正則化積 $\prod_p p \rightarrow 4\pi^2$ は開いたままである。 $4\pi^2$ を双対ローター周期 2π の平方と読むことは整合性の注記であり、質量スペクトルの導出ではない。

16 双対ローター動力学とド・ブroy位相の幾何的起源

不整合スカラー J は古典場理論における重力作用密度として提案される。粒子の作用が使うのは別の量である。以下のド・ブroy同定は提案のままである。

その作用のポテンシャルは、遅れの剛性 $V = \frac{m}{2} \sum_a (\phi_a - \theta_a)^2$ である。静止質量 m をその係数とすることはモデリング上の選択であり、代数からの m の導出ではない。一軸では、 σ をラピディティの和、 δ をその差として、

$$V = 2m \left(M - \frac{\sigma^2}{4} \right) \quad (16)$$

であり、一方 $J = \frac{1}{2}\delta\sigma$ である。 m が零でなければ、両者がその因子を除いて一致するのは、遅れが消えるか双対角が消えるときに限る。ともに零でないのは純通常の射線の上だけである。そこでは双対角が消え、 $J = \frac{1}{2} \sum_a \phi_a^2$ である。その射線は J の定義ではない。

単一粒子の内在的ローター角に対して書かれた有効作用を考える。

$$S_{\text{particle}} = \int \left[\frac{1}{2} \sum_{a=1}^3 \dot{\phi}_a^2 - \frac{1}{2} \sum_{a=1}^3 \dot{\theta}_a^2 - \frac{m}{2} \sum_{a=1}^3 (\phi_a - \theta_a)^2 \right] dt.$$

運動項の反対符号は書かれた模型の一部であり、ローターのユニタリ性から演繹されたものではない。

このラグランジアンのおイラー-ラグランジュ方程式は

$$\ddot{\phi} = -m(\phi - \theta), \quad \ddot{\theta} = -m(\phi - \theta).$$

である。したがって不整合 $\delta = \phi - \theta$ は自由である： $\ddot{\delta} = 0$ 。一軸での積分はアフィン遅れ $\delta(t) = \delta_0 + \nu t$ と三次の共通ラピディティ

$$\sigma(t) = \sigma_0 + \dot{\sigma}_0 t - m\delta_0 t^2 - \frac{m\nu}{3} t^3$$

であり、その運動に沿うヤコビ積分は初期値 $\frac{1}{2}\nu\dot{\sigma}_0 + \frac{m}{2}\delta_0^2$ に等しい。書かれた作用は振動子 $\ddot{\delta} + m\delta = 0$ を与えない。並べて書かれることのある近傍の系

$$\ddot{\phi} = m(\phi - \theta), \quad -\ddot{\theta} = m(\phi - \theta),$$

は不整合を暴走させ $\ddot{\delta} = 2m\delta$ となる。 $m > 0$ ならばその暴走は双曲線運動 $A \cosh(\sqrt{2m}t) + B \sinh(\sqrt{2m}t)$ であり、非零の種に対して非有界で、同様に振動子ではない。

振動子が現れるのは、両方の運動項の符号を正にとったときである。修正密度 $L = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}\dot{\theta}^2 - \frac{m}{2}(\phi - \theta)^2$ のおイラー-ラグランジュ方程式は $\ddot{\phi} = -m(\phi - \theta)$ および $\ddot{\theta} = m(\phi - \theta)$ であり、したがって

$$\ddot{\delta} + 2m\delta = 0.$$

これは別の作業模型であり、書かれた作用ではない。その周波数は $\sqrt{2m}$ である ($\hbar = c = 1$ の自然単位)。その曲線とコンプトン周波数 m が一致するのは孤立した値 $m = 0$ と $m = 2$ に限る。一樣運動する自由粒子に対し、通常ラピディティは一定率 $\dot{\phi}_a = \gamma v_a/c$ で発展するとモデル化される。一般解は

$$\delta(t) = A \cos(\sqrt{2m}t) + B \sin(\sqrt{2m}t)$$

であり、 $\delta(t)^2 \leq A^2 + B^2$ 、ヤコビ積分は $\frac{1}{4}\dot{\sigma}_0^2 + \frac{m}{2}(A^2 + B^2)$ である。低エネルギー非相対論的レジームでは、急速なコンプトン周波数振動は平均してゼロになると仮定され、固有時に比例する位相の遅い線形蓄積を残す。 $\hbar$ および c を復元すると、蓄積位相は

$$\int \delta\phi_a dt \propto \frac{Et - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}{\hbar}$$

と予想され、これは物質波のド・ブロイ位相である。この粒子内在的作用の多数粒子にわたる集団平均は、不整合の巨視的な読みとして提案する。その平均は、剛性ポテンシャルと J とを同一視せず、 J とワイツェンベック密度 T とも同一視しない。書かれた作用は量子理論への調和的橋渡しを与えない。同符号模型が、ここで比較した三系のうち唯一の振動子である。不整合のポテンシャルを任意関数に替えても、反対符号の結論は変わらない。遅れは自由なままであり、定数の遅れが慣性的であるのは傾きが消えるところに限るので、調和剛性は零でない遅れを加速する。整列から外れた四次の井戸が零でない遅れを凍らせるのは運動符号が一致するときに限り、そのとき平坦な速さは初期データであって、 W や Z の質量ではない。

θ に加えた双対チャンネルの一般化加速度 u は、書かれた作用に周波数を復元しない。 $\dot{\delta} = -u, \ddot{\sigma} = -2m\dot{\delta} + u$ 。それらの恒等式は両チャンネルが自由であることを仮定する。 $\dot{\phi} = 0$ は拘束である。通常チャンネルの力 v を u とともに認めると、書かれたヤコビ積分は $v\dot{\phi} - u\dot{\theta}$ で変化し、 $\dot{\phi} = 0$ は $v = m(\dot{\phi} - \dot{\theta})$ を一意に固定する。したがって双対専用の運動学は自由解ではない。残留する不整合と非零の静止質量は通常セクターを引きずり、双対専用スライスの実現にはその一意な拘束力が要る。通常ラビディティが瞬間的に静止していれば、 $\dot{\phi} = 0$ 、拘束は仕事をせず、双対の対 $-u\dot{\theta}$ のみが残る。近傍の振動子は代わりに $\dot{\delta} + 2m\dot{\delta} = -u$ に従う。実験室の場がそのような u を供給するかどうかは、第 13 節の模型の問いであり、これらの恒等式の帰結ではない。

17 量子重力と完全統一に向けて

これまでに提示した古典定式化は、重力を $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H} \cong \text{Cl}(3, 1)$ に符号化された粒子内在的な通常・双対時空のねじれ不整合として扱う。提案する作用はパラメータ空間スカラー J を用いる。アインシュタイン–ヒルベルト積分とは同定しない。

双対ローター $R_{\text{dual}} = \exp(\theta/2 \hat{q})$ は $\text{SU}(2)$ のスピン $1/2$ 回転演算子である。したがって双対セクター位相 θ は量子状態をパラメトライズする。 $\mathbb{C}^2$ 上で $\exp(\sum_a (\theta_a/2)(-i\sigma_a))$ として表現され、ユニタリかつ行列式 1 であり、したがって $\text{SU}(2)$ の元である。双対時空のコンパクト性 ($\theta \bmod 4\pi$) により、これらの位相はコンパクト多様体上に住む。各粒子の状態 $|\psi\rangle$ は R_{dual} のユニタリ位相部分に対応する。 $\text{Cl}(3, 1)$ 極小左イデアルのヒルベルト空間完備化はここでは構成しない。

位置および運動量演算子、ならびにそれらの間の不確定性関係は導出しない。特異点は第 4 節の上界により許容錐上で排除される。第 6.2 節の準地平は、飽和シュヴァルツシルトチャート上でのその上界の読みである。 $\text{Cl}(3, 1)$ スピノルの明示的ヒルベルト空間、および不整合力学の完全な量子化は開いたままである。

したがって量子重力は別理論ではない。同一の 16 次元代数の双対ローター運動学であり、ヒルベルト空間構成としてはなお不完全である。

18 結論

アインシュタインとともに始まった一世紀は、重力を連続体の曲率として語ることを教えてきた。その語りは巨視的な記述として正確であり、いまでも正確である。しかし連続体がなぜ曲がるのか、なぜ同一の現象が加速度のもとで慣性として現れるのかは、そこでは問われない。本稿は連続体を原始の対象とすることを拒んだ。自律的な舞台は存在しない。各質量粒子は、 $\text{Cl}(3, 1)$ と同型な十六実次元の双四元数代数の内部に、通常と双対というミンコフスキーセクターの対を運ぶ。両者を結ぶ写像は時間の矢を反転し、ミンコフスキーノルムは保たれる。重力とはその対のねじれであり、粒子自身に属する二つのローターの不整合である。

相対ローターが恒等元であるのは、二つのローターが一致するときに限る。不整合を測るローレンツ不変スカラー J は許容錐上で有界であり、 J の消滅はローターの一致を強制しない。任意の静的動径ブースト・チャートにおいて J は遠平行重力のワイツェンベックねじれ T と閉じた関係で結ばれ、外域シュヴァルツシルト幾何はその一意な真空の場合である。その関係はこのゲージの内部にある。一つの固定平面における慣性系のブーストは、任意のラビディティのプロファイルに対して、ミンコフスキー計量と遠平行スカラーの双方を動かさない。ねじれが消えないところでも J は自由なまま残る。両者が一致するのは平坦極限に限る。実動径ブーストは斥力を生まず、斥力層は楕円セクタに属し、その深さは有界である。二つのローターが同一の尺度を共有するとき J は消えるが、干渉はなお交替する。ゆえに強場重力の層の秩序は J ではなくその干渉である。同一の代数が電磁気を收容し、ファラデー係数は双対ローターの六生成子空間にあり、サンドイッチ増分はローレンツ四元力である。空間的カイラリティ軸はその六空間を $\mathfrak{so}(2, 1)$ の安定化子と、軸を動かす補空間とに分ける。垂直な双対回転は角度 π で二つの射影子を入れ替え、安定化子の唯一のコンパクト方向は平行な電気生成子との自明でない混合を許さない。コンパクト $\text{SU}(2)$ はカイラルなゲージ対称性ではなく、双対ローターである。三次元球面チャート上では円速度は $v^2 = (GM/R)f(r/R)$ である。形状 f は $(0, \pi/2)$ で一意の極小をもち、コンパクト化半径の一倍からその $6/5$ 倍まで v^2 は極

小の一割以内に留まる。動径の力は赤道を越えても中心を向き、負の井戸が終わるのがその赤道であって、 $r = 2R$ より前である。いずれも背景多様体を必要としない。

層状相を強い力と同定すること、銀河が双対セクターの三次元球面パッチであること、したがってこのコンパクト性が平坦な回転曲線を説明すること、双対セクターのコヒーレント励起が重力を工学しうること、真空のカイラル過剰が J の両符号に同一の符号なし質量を割り当て、束縛は正符号にあり、収量 η はその割り当てから外れること、同一の六空間からマックスウェル方程式はなお回復されず、調和剛性は整列から外れたローター剛性を選ばないこと、不整合振動子をド・ブロイ位相と読むこと、そして双対ローターのヒルベルト空間量子化が理論を完結させること——これらを提案してきた。それらは幾何の読みである。許容錐上の双対専用運動は J を上げられない。それは $J + M$ を保存するので、純通常の種からの双対専用遮蔽は符号なし質量を倍にし、双対壁が非正のときに限り $J = 0$ に達する。ブーストされた軸の上では、同軸の双対専用光線は J を消すより厳密に手前で時計因子 γ_{eff} を 1 に戻し、同じ質量の軸をまたぐ遮蔽はその時計を $\cosh \alpha$ に残す。軌跡に依らず、錐の (J, M) 平面における像は三葉の包絡 (11) である。遮蔽の放物線が鋭いのは $|J| \leq \pi^2/8$ に限る。重力的中性は最大質量の六分の五で頭打ちになり、最大限に非等方的な壁の配置によってのみ到達され、最大質量では——そこではすべての軸が純通常か純双対である——そもそも成り立たない。一方、完全な斥力はそうした代価を払わない。包絡に載る配置は、あらゆる軸が壁の上にあり、そのうち少なくとも二つが純通常または純双対であるものに限られる。双対専用の運動はそこに高々一度しか触れず、その上を進むことはできない。書かれたポテンシャルに抗して通常ローターを固定するには拘束が要る。双対角の双対専用増分——磁気ファラデーの重ね合わせ、あるいは置換 $\theta \mapsto \theta + eA$ ——は、非負の種に対して J を上げられない。円偏光波に沿ってファラデー読みは平均 J を動かさず、ポテンシャル読みはヘリシティ偶数のボンデロモータでそれを下げ、マックスウェルゲージ不変ではなく、消える双対種からは錐を出す。実験室の電磁気がヘリシティ奇数の双対力を供給するか——したがって重力がカイラルに制御可能か——は予想のままである。

釣り合った質量をもつ種は、どちらか一方のラピディティ予算だけでは空にならない。整列した流れの上で質量が静止するのは、共通速度が消えるときに限る。水素のイオン化は電子の静止エネルギーを賄わず、最初のクーロン節は壁ではない。

すでに天空に問いかけうることは、控えめで鋭い。真の地平の代わりに、有限な赤方偏移の床が期待される。球対称なねじれ星の中心では、重力時間膨張は消えるはずである。銀河が三次元球面パッチであるなら、回転曲線は見えない質量によってではなく $r \sim x_0 R$ ($x_0 \in (1.14, 1.20)$) 付近で浅い極小に達し、その後上昇する。力は引力のまま、負の井戸の端 $\pi R/2$ まで続く。天の川の代入質量では極小は 9–11 kpc 付近、井戸の端は 12–15 kpc 付近である。相次ぐ障壁半径の比は純粋な数であり、特性長が相殺されるため、核スケールでも恒星スケールでも同一である。

この存在論が正しければ、世界の幾何は物質に先立たない。それはスピンや電荷と同様、粒子の属性であり、天空に見える曲率は双対ローターの集合的なねじれである。連続体は大きな尺度における有用なフィクションのままである。残る仕事は、空虚な舞台をより巧みに曲げることではない。すでに手中にある代数から、物質の対をなすローターが、われわれの見る世界をいかに組成するかを学ぶことである。

A 乗算表

Table 1: 双四元数乗算表

	j	kI	kJ	kK	iI	iJ	iK	I	J	K	k	jI	jJ	jK	i
j	-1	$+iI$	$+iJ$	$+iK$	$-kI$	$-kJ$	$-kK$	$+jI$	$+jJ$	$+jK$	$+i$	$-I$	$-J$	$-K$	$-k$
kI	$-iI$	$+1$	$-K$	$+J$	$-j$	$+jK$	$-jJ$	$-k$	$+kK$	$-kJ$	$-I$	$+i$	$-iK$	$+iJ$	$+jI$
kJ	$-iJ$	$+K$	$+1$	$-I$	$-jK$	$-j$	$+jI$	$-kK$	$-k$	$+kI$	$-J$	$+iK$	$+i$	$-iI$	$+jJ$
kK	$-iK$	$-J$	$+I$	$+1$	$+jJ$	$-jI$	$-j$	$+kJ$	$-kI$	$-k$	$-K$	$-iJ$	$+iI$	$+i$	$+jK$
iI	$+kI$	$+j$	$-jK$	$+jJ$	$+1$	$-K$	$+J$	$-i$	$+iK$	$-iJ$	$-jI$	$-k$	$+kK$	$-kJ$	$-I$
iJ	$+kJ$	$+jK$	$+j$	$-jI$	$+K$	$+1$	$-I$	$-iK$	$-i$	$+iI$	$-jJ$	$-kK$	$-k$	$+kI$	$-J$
iK	$+kK$	$-jJ$	$+jI$	$+j$	$-J$	$+I$	$+1$	$+iJ$	$-iI$	$-i$	$-jK$	$+kJ$	$-kI$	$-k$	$-K$
I	$+jI$	$-k$	$+kK$	$-kJ$	$-i$	$+iK$	$-iJ$	-1	$+K$	$-J$	$+kI$	$-j$	$+jK$	$-jJ$	$+iI$
J	$+jJ$	$-kK$	$-k$	$+kI$	$-iK$	$-i$	$+iI$	$-K$	-1	$+I$	$+kJ$	$-jK$	$-j$	$+jI$	$+iJ$
K	$+jK$	$+kJ$	$-kI$	$-k$	$+iJ$	$-iI$	$-i$	$+J$	$-I$	-1	$+kK$	$+jJ$	$-jI$	$-j$	$+iK$
k	$-i$	$-I$	$-J$	$-K$	$+jI$	$+jJ$	$+jK$	$+kI$	$+kJ$	$+kK$	-1	$-iI$	$-iJ$	$-iK$	$+j$
jI	$-I$	$-i$	$+iK$	$-iJ$	$+k$	$-kK$	$+kJ$	$-j$	$+jK$	$-jJ$	$+iI$	$+1$	$-K$	$+J$	$-kI$
jJ	$-J$	$-iK$	$-i$	$+iI$	$+kK$	$+k$	$-kI$	$-jK$	$-j$	$+jI$	$+iJ$	$+K$	$+1$	$-I$	$-kJ$
jK	$-K$	$+iJ$	$-iI$	$-i$	$-kJ$	$+kI$	$+k$	$+jJ$	$-jI$	$-j$	$+iK$	$-J$	$+I$	$+1$	$-kK$
i	$+k$	$-jI$	$-jJ$	$-jK$	$-I$	$-J$	$-K$	$+iI$	$+iJ$	$+iK$	$-j$	$+kI$	$+kJ$	$+kK$	-1

Table 2: $Cl(3,1)$ 変種乗算表 ($e_0, e_1, e_2, e_3 \mapsto 0, 1, 2, 3$)

	0	1	2	3	01	02	03	32	13	21	123	032	013	021	0123
0	$-$	$+01$	$+02$	$+03$	-1	-2	-3	$+032$	$+013$	$+021$	$+0123$	-32	-13	-21	-123
1	-01	$+$	-21	$+13$	-0	$+021$	-013	-123	$+3$	-2	-32	$+0123$	-03	$+02$	$+032$
2	-02	$+21$	$+$	-32	-021	-0	$+032$	-3	-123	$+1$	-13	$+03$	$+0123$	-01	$+013$
3	-03	-13	$+32$	$+$	$+013$	-032	-0	$+2$	-1	-123	-21	-02	$+01$	$+0123$	$+021$
01	$+1$	$+0$	-021	$+013$	$+$	-21	$+13$	-0123	$+03$	-02	-032	-123	$+3$	-2	-32
02	$+2$	$+021$	$+0$	-032	$+21$	$+$	-32	-03	-0123	$+01$	-013	-3	-123	$+1$	-13
03	$+3$	-013	$+032$	$+0$	-13	$+32$	$+$	$+02$	-01	-0123	-021	$+2$	-1	-123	-21
32	$+032$	-123	$+3$	-2	-0123	$+03$	-02	$-$	$+21$	-13	$+1$	-0	$+021$	-013	$+01$
13	$+013$	-3	-123	$+1$	-03	-0123	$+01$	-21	$-$	$+32$	$+2$	-021	-0	$+032$	$+02$
21	$+021$	$+2$	-1	-123	$+02$	-01	-0123	$+13$	-32	$-$	$+3$	$+013$	-032	-0	$+03$
123	-0123	-32	-13	-21	$+032$	$+013$	$+021$	$+1$	$+2$	$+3$	$-$	-01	-02	-03	$+0$
032	-32	-0123	$+03$	-02	$+123$	-3	$+2$	-0	$+021$	-013	$+01$	$+$	-21	$+13$	-1
013	-13	-03	-0123	$+01$	$+3$	$+123$	-1	-021	-0	$+032$	$+02$	$+21$	$+$	-32	-2
021	-21	$+02$	-01	-0123	-2	$+1$	$+123$	$+013$	-032	-0	$+03$	-13	$+32$	$+$	-3
0123	$+123$	-032	-013	-021	-32	-13	-21	$+01$	$+02$	$+03$	-0	$+1$	$+2$	$+3$	$-$

これらは実際に同一の結果であり同型である。