

ねじれ星による重力レンズ： シュヴァルツシルト偏向の先にある層状焦点

<https://github.com/hypernumbernet>

October 2, 2026

Abstract

二重時空理論は、球対称質量の外縁をシュヴァルツシルト・チャートとして回復し、準地平 r_* で赤方偏移を凍結する。三軸の上界では $1 < r_*/r_s < 1.005$ であり、一軸の飽和でも、光子球は r_* の外にある。したがって臨界インパクトパラメータは $b_c = 3\sqrt{3}GM/c^2$ のままである。 $b > b_c$ の光線は節に出会わない。等スケール・アンザッツでは π の各区間に節が一つあり、 $1/6 < r_2/r_1 < 4/(5\pi)$ で、平坦部は指数関数的に静かである。 $|J| < 3\pi^2/8$ が $1/\gamma_s$ の極を切ったのち、各節を符号付きの薄い殻と読むと、弱偏向の写像が得られる。点質量は接線臨界曲線をもつ。薄い殻では接線比はリムで有限にとどまり、動径の傾きはとどまらない。引力の殻は、その質量のアインシュタイン半径を b_m 、面積半径を R とするとき、 $R > b_m/\sqrt{2}$ で内部に動径臨界曲線をもち、内部の接線曲線は $b_m/\sqrt{2} < R < b_m$ のときに限って現れ、その接線曲線は動径曲線の外側にある。斥力の殻は、その円盤上にどちらの曲線もたない。節の比は節の比であって、これらの曲線の比ではない。殻の質量は未定であり、光子の剛性は消え、 $F = k/(\gamma_s r^2)$ はヌル測地線ではないから、倍率は予測しない。太陽の遅延、銀河のアインシュタイン環、M87* と Sgr A* の放射環は外縁チャートと会う。それらの光線は r_* に入らないからである。チャートが加える間隔は、動径ヌル光線が光子球から r_* へ往復する時間である。三軸の上界では $20.96 GM/c^3$ 、一軸の飽和では $11.44 GM/c^3$ であり、光子の半周期 $16.32 GM/c^3$ の両側に落ちる。遅いエコー列はその帰還ではない。

1 はじめに

二重時空理論は共有連続体を拒む。各質量粒子は通常のミンコフスキー枠と双対枠を運び、重力はその対のねじれ不整合である [1]。球対称質量の外縁では、不整合は動径ブーストとして読まれ、そのブーストはシュヴァルツシルト・コフレームを再現する。十分な密度の内部では、同じ不整合が半径とともに符号を変える。親理論は、その結果として得られる対象をねじれ星と呼ぶ。事象地平もなく中心特異点もない、層状の凝縮体である。層はシュヴァルツシルト内部へ貼り足した仮定ではない。等スケール・アンザッツのもとでは、層は単一の干渉因子の零点であり、 π の各区間に節が一つある。

光が問うのは、質量粒子の落下とは別の問いである。書かれた粒子作用は光子に消える剛性を与えるので、作用は光子のラピディティを加速しない。外縁で光を偏向するのは、コフレームのヌル幾何である。本稿が問うのは、その幾何が節の障壁とともに、光源の方向を像の方向へどう写すかである。通常のシュヴァルツシルト・レンズは、弱場では臨界曲線をもつ、すなわち全質量のアインシュタイン環をもち、強場では臨界インパクトパラメータをもつ、すなわち光子球をもつ。薄い殻は、その一つの環以上のことをしうる。ただし追加の曲線はリムそのものではない。リムにおける発散は動径の傾きに座す。曲線がどこに座するかは、殻の面積半径を、その殻が運ぶ質量のアインシュタイン半径と比べることで決まる。

二つの陳述は最初から分けておかねばならない。外縁の偏向、準地平に対する光子球の位置、隣り合う節半径の窓は、親理論ですでに得られている結果の読みである。節を符号付きの薄い殻と同一視すること、およびその殻の射影質量から組むレンズ写像は、模型である。模型は障壁の弱偏向の読みである。強場の内部を貫くヌル積分の完成ではなく、各障壁へ質量を割り当てるものでもない。

本稿はその分割に従う。第2節はチャート、準地平、節の窓を記録する。第3節はシュヴァルツシルト・レンズを想起する。第4節は r_* の外で転向する光線と、そこへ入る光線とを分ける。第5節は層状写像を構成する。第6節は臨界曲線の位置を定める。第7節は二つの読みを、シャピロ遅延、銀河の環、M87* と Sgr A* の放射環と比較する。第8節は、凍結チャートと一般相対論とを実際に分けうる間隔を切り出す。

2 親理論から引き継ぐチャート

外域シュヴァルツシルト領域では、動径ブーストのラピディティと赤方偏移因子は

$$\varphi(r) = -\frac{1}{2} \log(1 - r_s/r), \quad A(r) = 1 - \frac{r_s}{r}, \quad r_s = \frac{2GM}{c^2}, \quad (1)$$

であり、 $r > r_s$ である。コフレーム $(\sqrt{A}, A^{-1/2}, r, r \sin \theta)$ はシュヴァルツシルト計量を誘導する。このチャートには三つの二次量が住み、それらは同一の対象ではない。有限角の不整合 $J = \frac{1}{2}\varphi^2$ 、場の種 $J_{\text{field}} = \frac{1}{2}(\varphi')^2$ 、そしてテレパラレル・スカラー T である。弱場の主要次数では一致し、それ以外では一致しない。アインシュタイン方程式は、テトラッド変分ののち T に属する。 J の恒等式ではない。

古典シュヴァルツシルトは $r \rightarrow r_s^+$ で $\varphi \rightarrow \infty$ 、 $A \rightarrow 0$ とする。許容錐がその発散を切る。三軸の上界 $|J| = 3\pi^2/8$ を動径の純粹ブーストと同一視すると、

$$\varphi_{\max} = \frac{\pi\sqrt{3}}{2}, \quad A_{\min} = e^{-\pi\sqrt{3}}, \quad \frac{r_*}{r_s} = \frac{1}{1 - A_{\min}} \quad (2)$$

へ反転する。親理論は窓 $0 < A_{\min} < 10^{-2}$ および $1 < r_*/r_s < 1.005$ を記録する。 $r \leq r_*$ ではチャートは $\varphi = \varphi_{\max}$ と $A = A_{\min}$ を凍結する。凍結した因子は狭義に正である。ヌル面 $A = 0$ は形成されない。親理論の同じ箇所は、この同一視が三軸上界を一つのブースト軸へ読んだものであると標す。一軸の許容ブーストは $\varphi = \pi/2$ で飽和し、そこでは $A = e^{-\pi}$ 、 $r_*/r_s = 1/(1 - e^{-\pi})$ である。その比もなお $3/2$ より小さい。

層状の内部を組織するのは別のスカラーである。等スケール・アンザッツのもと、 $x = \ell/(2r)$ で書いた干渉因子は

$$\gamma_s(x) = \cosh x \cos x - \sinh x \sin x \quad (3)$$

であり、その導関数は

$$\gamma'_s(x) = -2 \cosh x \sin x \quad (4)$$

へ潰れる。したがって各区間 $[n\pi, (n+1)\pi]$ はちょうど一つの節を含み、 γ_s の符号は平坦部から平坦部へと交替する。第 n 節は

$$n\pi + \frac{\pi}{4} < x_n < n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (5)$$

にあり、最初の二つの面積半径は

$$\frac{1}{6} < \frac{r_2}{r_1} < \frac{4}{5\pi} \approx 0.255 \quad (6)$$

を満たす。比は無次元の根だけに依る。特性長 ℓ は絶対尺度を定め、あらゆる比から相殺される。平坦部は $1/\cosh(\ell/(2r))$ によって遮蔽される。中心へ向かって成長するのは節の障壁である。そこでは γ_s が単純零点をもち、等スケールの理想化では $1/\gamma_s$ が発散する。

その発散は物理的な柱密度ではない。許容錐上では $|J| \leq 3\pi^2/8$ であり、親理論の辞書は無次元テレパラレル密度を $-8 < r^2 T < 27$ に閉じ込める。有効源のスパイクは有限である。錐はその窓を一意的な面密度へ変換しない。第5節は各有限スパイクを、ある質量 m_n の薄い殻で置き、 m_n を未定のまま残す。

レンズ写像が誤読されないために、もう一つの区別がここにある。書かれた粒子作用において、光子は剛性が消える粒子である。剛性が消えると、共通ラピディティの加速が除かれる。光子を真空へ強制することはなく、 $F = k/(\gamma_s r^2)$ を光線への力にすることもない。記号 F は、質量をもつ層の読みにおける有効力である。外縁のヌル偏向はコフレーム (1) の測地線である。障壁を通るヌル偏向は、第5節の模型である。

3 シュヴァルツシルト・レンズ

静的で球対称な線素

$$ds^2 = -A(r) c^2 dt^2 + A(r)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

はエネルギー E と角運動量 L を保存する。その比が漸近インパクトパラメータ $b = L/E$ である。ヌル光線の動径転向点は

$$b^2 = \frac{r_0^2}{A(r_0)} \quad (7)$$

に従う。円光子軌道は A/r^2 の臨界点である。外縁因子 (1) については

$$\frac{d}{dr} \left(\frac{A}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} + \frac{3r_s}{r^4}$$

であるから、唯一の正の根は光子球

$$r_{\text{ph}} = \frac{3}{2} r_s = \frac{3GM}{c^2} \quad (8)$$

である。対応するインパクトパラメータは

$$b_c = \frac{r_{\text{ph}}}{\sqrt{A(r_{\text{ph}})}} = 3\sqrt{3} \frac{GM}{c^2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} r_s \quad (9)$$

である。その根において A/r^2 は最大値をもつので、円軌道は不安定である。無限遠から来る $b > b_c$ の光線は、ある $r_0 > r_{\text{ph}}$ で転向する。 $b < b_c$ の光線は r_{ph} を通過する。

転向点 $r_0 > r_{\text{ph}}$ から無限遠へ出て戻る方位角の進みは

$$\Delta\varphi(b) = 2 \int_{r_0}^{\infty} \frac{dr}{r^2 \sqrt{b^{-2} - A(r)/r^2}}, \quad \alpha_{\text{ext}}(b) = \Delta\varphi(b) - \pi \quad (10)$$

であり、 b と r_0 は (7) で結ばれる。弱場 $b \gg r_s$ では、積分は

$$\alpha_{\text{ext}}(b) = \frac{4GM}{c^2 b} + O\left(\left(\frac{r_s}{b}\right)^2\right) \quad (11)$$

へ還元される。主要項は、太陽の縁における光の曲がり角が試す量である。同じシュヴァルツシルト因子がシャピロ遅延を定める。パラメトライズ後ニュートン記法では、曲がり角も遅延も $(1 + \gamma)/2$ に比例し、チャート (1) は $\gamma = 1$ の場合である。

観測者から角径距離 D_L にある薄いレンズ、光源までの距離 D_S 、レンズと光源の距離 D_{LS} に対し、レンズ方程式は角で測った光源位置 β と像位置 θ を

$$\beta = \theta - \bar{\alpha}(\theta), \quad \bar{\alpha}(\theta) = \frac{D_{LS}}{D_S} \alpha(D_L \theta) \quad (12)$$

で結ぶ。点質量 M のアインシュタイン角は

$$\theta_E^2 = \frac{4GM}{c^2} \frac{D_{LS}}{D_L D_S} \quad (13)$$

で定義され、弱い点質量偏向は $\bar{\alpha}(\theta) = \theta_E^2/\theta$ となる。レンズ写像の二つの固有値は、異なる集合の上で消える [2]。接線固有値が消えるのは

$$\bar{\alpha}(\theta) = \theta \quad (14)$$

においてであり、動径固有値が消えるのは

$$\frac{d\bar{\alpha}}{d\theta} = 1 \quad (15)$$

においてである。点質量では (14) は正の根を一つもち、 $\theta = \theta_E$ 、すなわち光軸上の光源のアインシュタイン環である。動径導関数は $-\theta_E^2/\theta^2$ であり、いかなる実数 θ に対しても 1 に等しくない。したがって点質量は接線臨界曲線の一つもち、動径臨界曲線をもたない。層がさらなる焦点を描くなら、ねじれ星が超えねばならないレンズはこれである。

4 光線の二類

$r > r_*$ では外縁因子 (1) を、 $r \leq r_*$ では凍結値 $A = A_{\min}$ を、つなぐ。接合は連続である。 r_* は $A(r_*) = A_{\min}$ によって定義されたからである。凍結区間では

$$\frac{d}{dr} \left(\frac{A}{r^2} \right) = -\frac{2A_{\min}}{r^3} < 0$$

である。凍結した赤方偏移は臨界点を寄与しない。接合した関数 A/r^2 の $r > 0$ における唯一の臨界点は、 $r_{\text{ph}} > r_*$ である限り、 r_{ph} のままである。

第2節は、すでに両方の上界を光子球の下に置いている。三軸の窓では $r_*/r_s < 1.005$ 、一軸の飽和では $r_*/r_s = 1/(1 - e^{-\pi}) < 3/2$ である。いずれの読みでも

$$r_{\text{ph}} > r_* \quad (16)$$

である。無限遠から来る光線の臨界曲線は外縁チャートの中に、インパクトパラメータ (9) において固定される。 r_* の内側の層はそれを動かさない。

同じ比較が光線を二類に分ける。

外縁類の光線は $b > b_c$ をもつ。その転向点は $r_0 > r_{\text{ph}} > r_*$ にある。偏向される経路の全体がシュヴァルツシルト領域にあり、偏向は (10) である。節には出会わない。インパクトパラメータが r_s に比べて大きいあらゆる弱場の試験、およびこの臨界曲線の角直径 $2b_c/D_A$ を観測量とするあらゆる強場の試験は、この類に属する。

貫入類の光線は $b < b_c$ をもつ。光子球を通過し、 $r < r_*$ へ入り、凍結チャートの上だけでは、(7) が与える近点

$$r_{\text{peri}} = b\sqrt{A_{\text{min}}} \quad (17)$$

に達する。近点は有限なあらゆる b に対して正である。光線は戻る。それを捕獲する地平はない。有効ポテンシャルの最大が、 $b < b_c$ なる任意の光線のエネルギーより下になお位置するので、戻る光線は r_{ph} を再び横切り、無限遠へ達しうる。 b_c の近くでは、不安定軌道の傍らを過ぎる通過が何度も巻きうる。その巻きは外縁幾何の光子環列である。一つの臨界曲線を繰り返し訪れる。節のリムの列ではない。

式 (17) はチャートの幾何である。 γ_s を知らない。凍結域の内部にある面積半径 r の球面は、近点がその球面上にある光線によってかすめられ、その光線の漸近インパクトパラメータは $r/\sqrt{A_{\text{min}}}$ である。写像は一次斉次であるから、隣り合う節球面は、面積半径の比をもつインパクトパラメータにおいてかすめられる。かすめが無限遠からの光線に到達可能であるのは、そのインパクトパラメータが b_c より下にあるとき、すなわち $r < b_c\sqrt{A_{\text{min}}}$ のときに限る。 r_* 付近の外縁の節は、あらゆる貫入光線によって横切られ、天空上の近点リムではない。次節の殻模型は、同じ節の第二の、弱偏向の読みである。同一の光線に対する (10) の上へ足す補正ではない。

5 層状レンズ写像

γ_s の平坦部は指数関数的に静かであるから、それらが寄与する滑らかな柱は無視する。各節は障壁である。 γ_s の等スケール零点は、節を横切る $1/\gamma_s$ を非可積分にする。第2節の許容窓は、その極を有限なスパイクで置き換える。本節の模型はスパイクをさらに潰し、面積半径 R 、質量 m の薄い球殻にする。質量 m は負でありうる。正の殻は引力障壁の理想化であり、負の殻は斥力障壁の理想化である。錐は、 m の値も、全質量のうちいずれかの節に座る割合も、固定しない。

$\sigma = m/(4\pi R^2)$ を面密度とする。インパクトパラメータ $b < R$ の視線は殻に二度出会う。視線と動径法線のなす角の余弦は $\sqrt{R^2 - b^2}/R$ であるから、射影柱は

$$\Sigma(b) = \frac{2\sigma R}{\sqrt{R^2 - b^2}} \quad (b < R) \quad (18)$$

であり、 $b > R$ では $\Sigma(b) = 0$ である。柱はリム $b = R$ で発散する。その発散は理想的な薄い極限である。錐が要求する有限幅のスパイクは、 Σ を有限に保ち、リムでピークさせる。

半径 b の円筒の内部に射影される質量は

$$M_{\text{cyl}}(b) = \int_0^{\min(b, R)} 2\pi b' \Sigma(b') db'$$

である。 $b \leq R$ では積分は初等的であり、

$$M_{\text{cyl}}(b) = 4\pi\sigma R \int_0^b \frac{b' db'}{\sqrt{R^2 - b'^2}} = \frac{m}{R} \left(R - \sqrt{R^2 - b^2} \right) \quad (19)$$

となり、 $b \geq R$ では $M_{\text{cyl}}(b) = m$ である。弱場の偏向は、ニュートン因子 $2G/c^2$ ではなく一般相対論の因子 $4G/c^2$ をつけて、

$$\alpha(b) = \frac{4G M_{\text{cyl}}(b)}{c^2 b} \quad (20)$$

である。殻の外ではこれは点質量の法則である。軸上では $R - \sqrt{R^2 - b^2} \sim b^2/(2R)$ であるから、球対称が要求するとおり $b \rightarrow 0$ で $\alpha \rightarrow 0$ となる。傾きはリムで有界にとどまらない。 $dM_{\text{cyl}}/db = (m/R) b/\sqrt{R^2 - b^2}$ は $b \rightarrow R^-$ で発散する。有限の厚みは、発散を急峻だが有限なピークで置き換える。

この読みにおけるねじれ星は、そのような殻の積層である。節半径 $R_n = r_n$ ごとに一つ、符号つき質量 m_n をもつ。円筒質量は加わる。弱場の規格化では

$$\sum_n m_n = M \quad (21)$$

を要求する。あらゆる節より大きい b をもつ光線が、全質量の点質量偏向を見るためである。この規格化は (11) と合う。模型の選択である。障壁が全質量を運ぶという定理ではなく、外縁類の光線の偏向法則でもない。外縁類の光線はすでに (10) によって計上されている。それは r_s を通じて全質量を知り、殻を通過しない。

m_n の符号は交替する。 γ_s の符号が平坦部から平坦部へと交替し、各障壁はそのあいだの遷移であるからである。したがって $\alpha(b)$ は b について単調とは限らない。点質量の形 θ_E^2/θ をもつ単調な偏向は、軸を外れた光源の像を二つ生む。単調でない偏向は、それより多くを生みうる。それらの追加の像が、層状レンズの複雑な焦点である。それらがこの模型に存在するのは、対応する臨界曲線が存在するときであり、それが次節の問いである。

6 臨界曲線

(20) をレンズ方程式 (12) へ代入する。全質量のアインシュタイン角 (13) と $b = D_L \theta$ のもとで、

$$\bar{\alpha}(\theta) = \frac{\theta_E^2}{\theta} \frac{M_{\text{cyl}}(D_L \theta)}{M} \quad (22)$$

となる。ここで M_{cyl} は殻の寄与の和を表す。あらゆる節の外では、(21) により $M_{\text{cyl}} = M$ であり、 $\bar{\alpha}$ は点質量偏向へ潰れる。接線条件 (14) はなお根 $\theta = \theta_E$ をもち、動径条件 (15) はなお根をもたない。全質量のアインシュタイン環は層構造を生き延びる。あらゆる殻の外にとどまる光線の臨界曲線である。

一つの殻の内部で、二つの条件は袂を分かち。ただし袂の分かれ方は、臨界曲線をリムへ釘付けにすることではない。

理想柱 (18) は $b = R$ で発散する。円筒が囲む質量は発散しない。殻の上に座る質量のアインシュタイン半径を b_m とし、 $c = (b_m/R)^2$ と置く。その質量が負ならば c も負である。殻の内部で、換算偏向は $\xi = b/R$ を通じて

$$\frac{\bar{\alpha}}{\theta} = \frac{c}{1 + \sqrt{1 - \xi^2}}, \quad \frac{d\bar{\alpha}}{d\theta} = \frac{c}{\sqrt{1 - \xi^2} (1 + \sqrt{1 - \xi^2})} \quad (23)$$

に従う。軸上ではせん断が消え、二つの式はともに $c/2$ に等しい。外へ向かうにつれ、接線比は二倍になるだけであり、リムで有限値 c に達する。動径の傾きは有限にとどまらない。殻が引力ならば $+\infty$ へ、斥力ならば $-\infty$ へ走る。リムで発散するのは動径固有値である。接線固有値は、有限な比を 1 と比べることにとどまる。

引力の殻では、二つの比較は b_m で測られる窓に落ちる。動径の傾きが殻の内部のちょうど一つの半径で 1 に等しくなるのは、 $R > b_m/\sqrt{2}$ のときである。接線比が殻の内部で 1 に等しくなるのは

$$\frac{b_m}{\sqrt{2}} < R < b_m \quad (24)$$

のときであり、その窓では接線曲線は動径曲線の外側に横たわる。殻の外では、写像はその殻自身の質量の点質量である。 $R < b_m$ ならばアインシュタイン環があり、動径臨界曲線は決してない。したがって窓の中の殻は、内部の二曲線と外縁の環とを併せもつ。殻が $b_m/\sqrt{2}$ より小さければ、残るのは環だけである。殻が b_m より大きければ、残るのは内部の動径曲線だけである。接線曲線が節に会うのは $R = b_m$ のときだけである。窓の外縁であり、曲線がリムまで移り出た場所である。

斥力の殻は、 $\bar{\alpha}/\theta$ も内部の傾きも負に保つので、その円盤はどちらの臨界曲線も含まない。外では負の点質量である。アインシュタイン環はなおなく、半径 b_m の動径曲線があるのは、殻自身がその半径の内側に横たわるときに限る。

錐は理想的なリムを、有限の幅をもつスパイクで置き換える。無限の動径傾きは急峻なピークになり、狭い引力スパイクはなお動径固有値を零のそば、リムの近くで通過させる。平滑化は接線曲線をリムの上へ移さない。その曲線は、囲まれた質量の比が 1 に等しい場所にとどまる。

殻の上の質量は未定であるから、窓は像の個数ではなく、判定条件である。節の比 (6) は節の比のままである。隣り合う臨界曲線がそれに立つ義務はない。積層では、すでに囲まれた質量が、その内部の点質量偏向を次のリムにおいて有限な量だけ加える。動径発散の符号は、横切られている殻の符号のままである。一方、リムにおける接線比は、局所の殻だけではなく、そこまでに囲まれたすべての質量のアインシュタイン比である。したがって、より重い内部を包む斥力の殻も、なお $\bar{\alpha} = \theta$ を満たしうる。 γ_s の交替は、節から節へと臨界曲線の種類を交替させはしない。

凍結チャートは、節の比を別の族、すなわち近点のかすめへ割り当てる。第 4 節は、 $b_n < b_c$ のとき、節球面にかすめのインパクトパラメータ $b_n = r_n/\sqrt{A_{\min}}$ を与える。赤方偏移の因子は b_{n+1}/b_n で相殺されるので、かすめの角の比は再び (6) である。かすめは弱偏向の臨界曲線ではない。臨界曲線が節の上に座すのは、境界 $R = b_m$ においてのみであり、そこにおいてさえ二つの写像は $1/\sqrt{A_{\min}}$ だけ尺度を異にする。いずれの読みも m_n を固定しない。どのかすめが無遠慮から到達できるかは、第 8 節で決着する。

光子環の列は節の比ではない。 b_c にある単一の不安定曲線の相次ぐ半周は、シュヴァルツシルト幾何では半周ごとに $e^{-\pi}$ の因子で減光され、像平面上の半径はその一つの曲線へ収束する [8]。節の対は、相異なる面積半径の対である。 b_c への指数的な集積と、比が (6) に入る対と、(24) によって固定される薄い殻の臨界曲線の対とは、天空上の光の三つの配置である。本稿は、 r_{ph} で巻き、かつ障壁を横切る光線を積分しない。配置を分け、合成された偏向は未計算のまま残す。

7 観測との比較

7.1 外縁類

太陽の試験は外縁類に座す。光球をかすめる光線のインパクトパラメータは太陽半径の程度であり、 r_s より 10^5 の程度の因子だけ大きく、原子核へ入らない。核の節は、そのフェムトメートル尺度が何であれ、経路上にない。偏向は太陽の縁で評価した (11) であり、遅延は同じ因子 A のシャピロ遅延である。太陽の傍らを過ぎる電波リンクのカッシーニ追跡は

$$\gamma = 1 + (2.1 \pm 2.3) \times 10^{-5} \quad (25)$$

を与える [3]。チャートは $\gamma = 1$ の場合である。測定は、外縁の曲がりと遅延を一緒に縮尺し直すような補正を制限する。その光線が出会わない内部の殻を制限はしない。

銀河の強いレンズは、より弱い場における同じ類である。アインシュタイン角 (13) と準地平の角サイズ r_*/D_L は、 $\theta_E^2 \sim (r_s/D_L)(D_{LS}/D_S)$ によって関係する。二つの角の比は、ラジアンで測った角の平方根であり、いかなる銀河レンズについてもその平方根は 1 より何桁も小さい。 r_* にある構造は、それらの観測の精度において、アインシュタイン環も、像の位置も、時間遅延も動かさない。二つの赤方偏移にある二つの光源が形成する二重アインシュタイン環は、外縁類の環が二つである。節のリムの対ではない。単一クェーサーの像のあいだのフラックス比の異常も同様に外縁類の問いであり、文献ではレンズ内の下部構造として読まれている。本稿はそれをねじれ節へ割り当てない。

7.2 M87* と Sgr A* の臨界曲線

M87* の放射環は直径 $42 \pm 3 \mu\text{as}$ をもち、フラックス比 $\gtrsim 10:1$ の中心減光を囲む。その環とともに採用される角重力半径は $\theta_g = GM/(c^2 D) = 3.8 \pm 0.4 \mu\text{as}$ 、距離は $16.8 \pm 0.8 \text{ Mpc}$ 、対応する質量は $(6.5 \pm 0.7) \times 10^9 M_\odot$ である [4]。臨界曲線 (9) の角直径は

$$\frac{2b_c}{D_A} = 6\sqrt{3}\theta_g \quad (26)$$

である。 $6\sqrt{3} \approx 10.392$ であるから、

$$6\sqrt{3} \times (3.8 \pm 0.4) \mu\text{as}$$

は約 $39.5 \pm 4.2 \mu\text{as}$ である。その区間は $42 \pm 3 \mu\text{as}$ と重なる。重なりが、外縁チャートの支持する比較である。公表された環は臨界曲線そのものではなく、臨界曲線のまわりのレンズされた放射であり、質量の推論はすでにその程度の影の縮尺を用いている。この精度での一致は、光子球が (16) の置く場所にあることの確認である。地平の検出ではない。地平は準地平が置き換えるものであり、臨界曲線はその置き換えを参照しない。

Sgr A* は、第二の質量における同じ比較である。放射環の直径は $51.8 \pm 2.3 \mu\text{as}$ である [5]。一般相対論的シミュレーションへ較正された角重力半径は $4.8_{-0.7}^{+1.4} \mu\text{as}$ である [6]。(26) の中心値は約 $49.9 \mu\text{as}$ である。 θ_g の不確かさは 4.1 から $6.2 \mu\text{as}$ へ走り、その区間の $6\sqrt{3}$ 倍は約 43 から $64 \mu\text{as}$ へ走る。測定された環はその区間の内部にある。ここでも外縁の臨界曲線は、公表された重力半径の精度において、像と両立する。どちらの像も単一の環である。その一致が未決のまま残すものは、第 8 節である。

8 予測が分かれる場所

第 7 節の一致は、接合したチャートをシュヴァルツシルト・レンズから分けない。それらを作る光線は r_* の外にとどまる。式 (16) は光子球を外縁に置くので、 $2b_c/D_A$ はシュヴァルツシルトの直径である。カッシーニの遅延と銀河の環は、インパクトパラメータが r_s のはるか外にある。比 (6) は節の比であり、第 4 節の近点かすめの比である。第 6 節の薄い殻の臨界曲線は、それを繰り返す義務を負わない。地球基線上で次世代の配列が分離できると期待するのは、単一の曲線 b_c の $n = 0$ と $n = 1$ の部分環までであり、その分離自体がすでに超分解を要する [9]。それは $4/(5\pi)$ で抑えられた比を測らない。

影の内部の明るさも、両者を分けない。貫入光線は (17) によって戻るので、内部は空である必要がなく、光学的に厚いプラズマはそれを暗く保ちうる。M87* のコントラスト $\gtrsim 10:1$ は和を制限する。入射パワーを熱化する面、あるいは完全に反射する面は、さらなる対象であり、Sgr A* のスペクトルと像はその二つを不利にする [7]。凍結 $A = A_{\min}$ はそのいずれでもないもので、限界は r_* へ移らない。

接合したチャートが固定するのは、キリング時間である。外縁では動径ヌル光線は $c dt = dr/A$ を満たす。したがって光子球から準地平へ降りて戻る往復は

$$\Delta t = \frac{2}{c} \int_{r_*}^{r_{\text{ph}}} \frac{dr}{A(r)} = \frac{2}{c} \left[r + r_s \ln |r - r_s| \right]_{r_*}^{r_{\text{ph}}} \quad (27)$$

である。一般相対論には、このような帰還がない。 $b = 0$ で r_{ph} を通過する動径光線は、無限のキリング時間をかけて r_s に達し、戻らない。 $r_* > r_s$ ならば積分は有限である。

値は、どの上界が r_* を固定するかに依る。三軸因子 $A_{\min} = e^{-\pi\sqrt{3}}$ では

$$\Delta t = 20.96 \frac{GM}{c^3} \quad (28)$$

となる。一軸の飽和 $A = e^{-\pi}$ では準地平は r_s のより上に座り、対数はより短く、

$$\Delta t = 11.44 \frac{GM}{c^3} \quad (29)$$

である。親理論は、三軸の読みを一軸へ移植した上界だと標す。その同一視が決着するまでは、チャートが予測するのは $\{11.44, 20.96\} GM/c^3$ の中の間隔であり、単一の数ではない。

外縁にすでに存在する自然な時計は、不安定光子軌道の半周期である。 $c = 1$ 、 $M = GM/c^2$ とすれば、 $r = 3M$ 上の角速度は $d\varphi/dt = 1/(3\sqrt{3}M)$ であるから、

$$T_{1/2} = 3\pi\sqrt{3} \frac{GM}{c^3} \approx 16.32 \frac{GM}{c^3} \quad (30)$$

である。二つの帰還はこの半周期の両側に、 $4.6 GM/c^3$ と $4.9 GM/c^3$ だけ落ちる。単一の閃光の相次ぐ光子環像は、シュヴァルツシルト幾何では $T_{1/2}$ だけ隔たる [8]。 r_* からの帰還は別の間隔であるが、別の桁ではない。質量 $4 \times 10^6 M_\odot$ では $GM/c^3 \approx 20 \text{ s}$ であり、三つの間隔は約 4、5、7 分である。第 7 節に引用した M87* の質量では、数日である。数 GM/c^3 の遅れを分解するフレア観測は、原理上、帰還を光子の半周から見分けうる。そのような分離は手元がない。

同じ間隔は、遅い重力波エコーが予測ではない理由を示す。エコー探索は、地平までの固有距離が微小な反射面を制限し、リングダウンのずっと後のパルス列を探す。往復 (27) はリングダウンの一周期であり、その列ではない。遅い列の非検出は、 $r_* - r_s$ ほどの幅の空洞が期待させるものである。空洞を確認はしない。確認するには、反射率が既知の反射体によってリングダウン自体がずれねばならない。接合したチャートは計量係数 A を供給する。重力波の境界条件は供給せず、殻の質量 m_n は未定のままである。エコーがデータにすでに示唆されているという親理論の言及は、この計算の結果ではない。

近点リムは、第二の、より弱い標的のままである。それらが無限遠から到達可能であるのは、面積半径 $r < b_c \sqrt{A_{\min}}$ のときに限る。三軸の上界では、その切断は $0.171 r_s$ である。その外の節はあらゆる貫入光線に横切られ、別々のかすめとしては現れない。その内の節は面積比のインパクトパラメータでかすめられる。それは再び (6) であるが、上界が選ばれた後に限り、かつリムが目に見えるほど明るいときに限る。それは、同じ未分解の比に対する、より深い切断であり、新しい観測量ではない。

9 結論

ねじれ星の外縁は、シュヴァルツシルト・チャートが光をレンズするのと同じ仕方で光をレンズする。光子球は親理論が記録する両方の上界について準地平の外にあり、臨界インパクトパラメータは $b_c = 3\sqrt{3} GM/c^2$ のままであり、全質量のアインシュタイン環は弱場で生き延びる。太陽の遅延、銀河の環、M87* と Sgr A* の放射環が、それらの測定が実際にもつ精度において理論と合うのは、そのためである。

さらなる焦点は障壁を要する。本稿の層状写像は、許容錐によってすでに有界である各節スパイクを符号つきの薄い殻へ潰し、射影質量からレンズを読む。孤立した引力の殻は、半径が $b_m/\sqrt{2}$ を超えると内部に動径臨界曲線を加え、その動径曲線の外側にある内部の接線曲線は $b_m/\sqrt{2} < R < b_m$ のときに限って加える。斥力の殻は、自身の円盤の上にとどちらの曲線も加えない。節の比 $1/6 < r_2/r_1 < 4/(5\pi)$ は、節の比であり、到達可能な近点かすめの比である。これらの臨界曲線の比ではない。各殻の質量は定まらないので、模型はどの窓が占有されるかも、倍率も、光子球で巻きかつ障壁を横切る光線の偏向も、予測しない。

チャート自身が加える間隔は、往復 (27) である。一般相対論はその光線に戻さない。三軸と一軸の上界は、それを $20.96 GM/c^3$ と $11.44 GM/c^3$ で戻す。光子の半周の両側である。それが、数 GM/c^3 まで時刻を決めたフレアが行いうる比較である。遅いエコー列は別の比較であり、この面が予測するものではない。

References

- [1] Anonymous, 「双対時空の間のねじれとしての重力：一般相対性理論の双四元数的再定式化」 (2025).
<https://github.com/hypernumbernet/dual-spacetime-doc/blob/main/double-spacetime-theory.pdf>.

- [2] R. Narayan and M. Bartelmann, “Lectures on Gravitational Lensing,” arXiv:astro-ph/9606001 (1996).
- [3] B. Bertotti, L. Iess, and P. Tortora, “A test of general relativity using radio links with the Cassini spacecraft,” *Nature* **425**, 374–376 (2003).
- [4] Event Horizon Telescope Collaboration, “First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole,” *Astrophys. J. Lett.* **875**, L1 (2019).
- [5] Event Horizon Telescope Collaboration, “First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way,” *Astrophys. J. Lett.* **930**, L12 (2022).
- [6] Event Horizon Telescope Collaboration, “First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass,” *Astrophys. J. Lett.* **930**, L15 (2022).
- [7] Event Horizon Telescope Collaboration, “First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. VI. Testing the Black Hole Metric,” *Astrophys. J. Lett.* **930**, L17 (2022).
- [8] M. D. Johnson et al., “Universal interferometric signatures of a black hole’s photon ring,” *Sci. Adv.* **6**, eaaz1310 (2020).
- [9] M. D. Johnson et al., “Key Science Goals for the Next-Generation Event Horizon Telescope,” *Galaxies* **11**, 61 (2023).