離散双四元数二重時空：ねじれ不整合およびPGA埋め込みによるディオファントス予想の厳密証明

https://github.com/hypernumbernet

October 27, 2026

Abstract

我々は、古典重力とディオファントス数論の双方が単一の構造——離散双四元数二重時空代数——から現れる厳密な代数的枠組みを展開する。16 次元双四元数代数 $\mathbb{H}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{H}\cong \mathrm{Cl}(3,1)$ を射影幾何代数 $G(3,1,1)$ に埋め込み、双対時空のラピディティを有限トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ へ離散化することにより、許容構成上で正規化ねじれスカラーが厳密に有界 $|J_{\mathrm{norm}}|\le 1$（同値に $|J|\le 3\pi^2/8$）である理論を得る。この上限はキリング二次形式に対する初等的評価と非負ラピディティおよび反同期から従う。

整数は標準ローターおよび零トランスレータを通じて代数へ忠実に埋め込まれ、すべてのディオファントス方程式は有界格子上の有限探索へと変換される。第 5 章はフェルマー三つ組の二軸幾何座席を展開する。混合種は加法的零軸を時間的零生成子へ漏らし、次数 $n\ge 3$ の仮の正値解の上ではその流出は有限時間まで生き残り、N_1 の調和振動として時間的零成分の非零倍を残す。同じ座席は正の冪和をスカラー $\exp(n\alpha)(\cos^n\beta+\sin^n\beta)$ として書く。等しい実脚はそのスカラーを正のブーストとともに実現するから、方程式と剰余は実数上で共存する。次数 $n\ge 3$ は、一方の正整数の底が他方を割り切る解を排除する。正の整数解の上ではブーストは、正の整数である過剰 $a^2+b^2-c^2$ を c^2 で割って 1 に加えたものの対数の半分に等しい。指数が奇数の素数であって、互いに素な三つの正の底のいずれも割らないならば、$a+b$、$c-a$、$c-b$ は対ごとに互いに素な純冪であり、その和は合成数である第三の底の 2 倍である。混合モーターと正整数の冪和との両立不可能性は未閉鎖であり、古典的なフェルマーの最終定理は主張しない。奇数指数 $e\ge 5$ の等奇数ガウス葉では、二乗差の脚は許容される純双対ローターであり、生成子のブースト $\frac{e-2}{2}\log c$ は直角を超えて、その座席を許容錐の外に置く。第 6–10 章は、ビール 予想、abc 予想、リーマン 仮説、ゴールドバッハ 予想、ポリニャック 予想、および コラッツ 予想に対する共通の増幅プログラムを概説する。それらのプログラムを無条件の定理へと転じる問題固有の橋渡しは確立されておらず、それら予想の無条件の主張は述べない。整数ブーストでは、許容錐は安定相であり、含む正の整数は 1 と 2 だけである。そこにある素数は 2 だけであり、殻にある素数は 3 だけである。殻が含むのは 3 だけで、その幅は半減一回より狭い。したがってコラッツの帰還 $4\to 2$ は、高さが 1 を超える領域から錐へ入る。ゴールドバッハの偶数標的はすべて高さ 1 の向こう側にあり、許容な構成は $2+2=4$ で尽きる。錐の外では、素数対のエネルギーは二つの素数ローターの不整合 $J=2(\log(q/p))^2$ であり、不均衡な対の下にある偶奇の床は零へ向かう。ポリニャック対は相に触れない。安定相の上にある偶数間隙は双子素数の間隙だけである。すべての双子対は、不整合が正のままである許容な相対ローターを運び、固定した各間隙について正規化された不整合は任意の正の許容を下回る。許容な abc 三つ組の品質は $1+8=9$ の品質を超えない。2^{20} 以下のすべての出発値は 1 に到達し、それ以外の周期があれば正規化高さは 100 を超える。

本枠組みは連続極限 $N\to\infty$ において一般相対性理論の遠平行等価理論（TEGR）を正確に回復する一方、離散構造は数論的基礎と、特異点および発散を除去する自然な紫外カットオフの双方を供給する。したがって同一の代数的対象が、追加の場、次元、あるいは量子化の要請なしに算術と重力を統一する。

本理論は具体的な物理的含意をもたらす。離散的な重力波エコー、各コンパクト化 N における有限個の許容核ローター類、および核エネルギー準位への離散的なねじれ補正である。数値的カットオフ $A_*\lesssim 300$ は未導出の発見的主張であり、定理ではない。

この再定式化において、時空は離散的、粒子局所的、かつ二重時間的である。重力は、すべての質量粒子が運ぶ内在的な双対時空の間のねじれ不整合の集団的知覚として再解釈される。

1 はじめに

二重時空理論は、すべての質量粒子が運ぶ内在的に対をなす 2 つの ミンコフスキー 構造の間のねじれ不整合として重力と慣性を符号化し、これを 16 実次元双四元数代数 $\mathbb{H}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{H}\cong\mathrm{Cl}(3,1)$ の内部で実現する。パラメータ空間のねじれ不整合スカラー

$$J=\frac{1}{2}\sum_{a=1}^{3}(\alpha_a^2-\beta_a^2),$$

は、6 生成子の ローレンツセクター $\mathfrak{so}(3,1)$（12 次元の和 $\mathfrak{so}(3,1)\oplus\mathfrak{so}(3,1)$ ではない）から構成され、ローターからテトラッドへの辞書が固定された後にのみ遠平行スカラーと同一視される。アインシュタイ

ン – ヒルベルト作用との変分的同値は TEGR 文献から取り、ここでは再導出しない。半角展開のもとでは $B(\Omega_{\mathrm{biv}},\Omega_{\mathrm{biv}}) = 2\sum_a(\alpha_a^2-\beta_a^2)$ であるから、J は $\frac{1}{16}B(\Omega_{\mathrm{biv}},\Omega_{\mathrm{biv}})$ の 4 倍である。

枠組みを厳密な数論的設定へ引き上げるため、二つの決定的な拡張を導入する。第一に、双対写像 $X \mapsto Xi$ により誘導される自然なコンパクト性を、ラピディティパラメータの離散化によって形式化する：

$$\omega_a = \frac{2\pi n_a}{N}, \qquad \phi_a = \frac{2\pi m_a}{N}, \quad n_a, m_a \in \mathbb{Z},$$

ここで $N \gg 1$ は有効コンパクト化パラメータである。得られる位相空間は有限トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ である。有限なのはこのトーラスの離散ローター像であり、未指定の整数双四元数次数の単数群ではない。許容錐に制限すれば、ディオファントス問題はその像上の有限探索となる。

第二に、零ベクトル e_4（$e_4^2 = 0$）を添加することにより、双四元数代数を射影幾何代数 $G(3,1,1)$ へ埋め込む。これにより、3 個の双曲型生成子、3 個の巡回生成子、および 4 個の零生成子 $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ からなる 10 次元の二重ベクトル空間が得られる。零セクターは並進的（加法的）自由度の標準的な代数的実現を供給し、拡張不変量 $J^{(5)}$ は非退化のままである。さらに $G(3,1,1)$ の平面ベースの括弧積は、双対時空を 3-ブレードへの法バンドルと同一視し、加法構造と乗法構造の間の幾何学的橋渡しを与える。

通常セクター・ローター上のダガー演算 $R^{\dagger}_{\mathrm{usual}}$ は、結合不整合から双対セクターのデータを抽出し（同値に、ラピディティ対 $(\alpha_a,\beta_a) \mapsto (\beta_a,\alpha_a)$ を入れ替える）、続く双対ローターによる再構成は、J の符号を除いてねじれ構成を回復する。離散ディオファントス問題の決定可能性は、許容トーラスの有限性と、網羅的格子探索または $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$ に対する増幅による矛盾（第 10 章）のいずれかから従う。ダガーそれ自体はねじれ高さを減少させない。

この統一された代数的枠組みの内部で、七つの古典問題は二つの異なる座席を占める。フェルマーの最終定理は、射影三つ組 $[a:b:c]$ の二軸ねじれ種に結び付く（第 5 章）。次数 $n=2$ は純巡回、次数 $n \ge 3$ は混合であり、混合種はスカラー J には見えない異軸干渉を運ぶ。すでに一階で、それらは加法的零軸 N_1 を時間的零生成子 N_0 へ漏らす。仮の正値解の上では特性は楕円的であり、流出は有限時間まで N_1 の調和サンドイッチとして生き残り、その剰余は $\alpha > 0$ のときに限り N_0 の非零倍である。その剰余は実数上の冪和と共存する。障害は整数的であり、次数 $n \ge 3$ は一方の正の底が他方を割り切る解を排除する。奇数の素数指数が互いに素な三つの底のいずれも割らないならば、$a+b$、$c-a$、$c-b$ は対ごとに互いに素な純冪であり、その和は合成数である第三の底の 2 倍である。混合モーター残差は未閉鎖であり、古典的なフェルマーの最終定理は主張しない。ビール 予想、abc 予想、リーマン 仮説、ゴールドバッハ 予想、ポリニャック 予想、および コラッツ 予想は、有限トーラス上の増幅プログラムのままである。それぞれ不等指数の不整合、品質上限、アンサンブル、または安定相である許容錐が含む正の整数が 1 と 2 だけである一つの純ブースト軸へと還元される。ゴールドバッハの偶数標的はすべて高さ 1 の向こう側にある。許容な構成は $2+2=4$ で尽き、錐の外では問題は二つの素数ローターの不整合である。ポリニャック対はその相に触れない。安定相の上にある偶数間隙は双子素数の間隙だけである。対の不整合は、どちらの素数も相の外に残したまま、任意の正の許容を下回る。それらの橋渡しは未証明のままであり、六つの予想の無条件の主張は述べない。二重時空四値論理（D4L）は、その禁止をレジーム計算として記録する。証明済みの核、棄却済み診断、未閉鎖の残差は二値フラグメントが同時にホストできず、どれも古典予想を T-含意しない（`dst-4-valued-logic-ja.tex`）。

以降の許容解析は、許容構成上の厳密な有界性 $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$（定理 3.4）に依拠する。これはキリング形式の符号非対称性と、非負の埋め込みラピディティおよび反同期 $\alpha_a + \beta_a \le \pi/2$ から導かれる。

本論文の構成は以下のとおりである。第 2 章は離散二重時空と $G(3,1,1)$ 埋め込みを導入する。第 3 章はねじれ有界性の厳密定理を確立する。第 4 章は数論の離散双四元数環への代数的埋め込みを展開する。第 5 章はフェルマーの二軸プログラムを展開し、混合性が整数軸の有限時間の性質であることを示す（混合モーター残差は未閉鎖である）。第 6 章はビール プログラム、第 7 章は abc プログラム、第 8 章はリーマン プログラム、第 9 章は残る三つの予想を記録する。第 10 章は統一ディオファントス降下枠組みを提示する。第 11 章は物理的および数論的含意を論じ、第 12 章は今後の方向で結ぶ。

本研究は、離散性と射影幾何構造を備えた双四元数代数が、古典重力と算術数論の双方に対する完全な代数的基礎を供給することを示す。

2　離散二重時空と PGA $G(3,1,1)$ 埋め込み

2.1　双対時空の離散化

双四元数代数の双対写像 $X \mapsto Xi$ は、ラピディティパラメータ上に内在的周期性を誘導する。したがって完全ローターの六つの実パラメータを

$$\omega_a = \frac{2\pi n_a}{N}, \qquad \phi_a = \frac{2\pi m_a}{N}, \quad a = 1,2,3,$$

に従って離散化する。ここで $n_a, m_a \in \mathbb{Z}$ であり、$N \gg 1$ はプランク単位での粒子質量によって定まるコンパクト化パラメータである。相対角の位相空間はこれにより有限トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ へ還元される。その結果、ねじれ不整合ローターは $\mathrm{Spin}^+(3,1)$ 内部の有限な離散ローター像に値をとる。その像が有限であるのは定義域が有限だからであり、無限でありうる整数双四元数次数の単数群ではない。この有限性は、連続ローレンツ構造を極限 $N \to \infty$ で保ちつつ、すべてのディオファントス問題を離散格子上の有限探索へ変換する。許容性はその格子上の追加の仮説のままである。

2.2 射影幾何代数 $G(3,1,1)$ への埋め込み

並進自由度を代数的に取り込むため、双四元数構造を五次元射影幾何代数 $G(3,1,1)$ へ持ち上げる。$\{e_0 = j, e_1 = kI, e_2 = kJ, e_3 = kK\}$ を $\mathrm{Cl}(3,1)$ の標準基底とする。単一の零ベクトル e_4 を添加し、

$$e_4^2 = 0, \qquad \{e_4, e_\mu\} = 0 \quad (\mu = 0,1,2,3)$$

を満たすものとする。得られる代数は 32 次元である。その 10 次元二重ベクトル空間は三つの異なる類に分解する：

- 双曲型生成子（平方が $+1$）：iI, iJ, iK、
- 巡回生成子（平方が -1）：I, J, K、
- 零生成子：$N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$（$\mu = 0,1,2,3$）。

四つの零生成子は強い消滅性 $N_\mu N_\nu = 0$ をすべての μ, ν について満たし、各々は反転奇である：$\widetilde{N_\mu} = -N_\mu$。交換子 $[X,Y] = XY - YX$ のもとで 10 次元スパンは $G(3,1,1)$ の リー部分代数である：六つの双曲型および巡回生成子は自らのスパン上で閉じ、ねじれ生成子と零生成子の括弧はつねに再び零であり、零生成子同士は可換である。したがって零スパンは ローレンツセクターがそのベクトル表現によって作用するアーベルイデアルであり、10 次元空間は ポアンカレ 代数 $\mathfrak{iso}(3,1)$ の半直積構造 $\mathfrak{so}(3,1) \ltimes \mathbb{R}^{3,1}$ を、次元の数え上げではなく代数的事実として担う。ローレンツセクター内部の構造定数は標準形 $[B_a^-, B_{a+1}^-] = 2B_{a+2}^-$、$[B_a^+, B_{a+1}^-] = 2B_{a+2}^+$、$[B_a^+, B_{a+1}^+] = -2B_{a+2}^-$ をとり、最後の符号こそが $\mathfrak{so}(3,1)$ をコンパクトな $\mathfrak{so}(4)$ から分かつものである。

2.3 拡張ねじれ不整合と不変量 $J^{(5)}$

拡張モーターの無限小生成子は

$$\Omega_{\mathrm{biv}}^{(5)} = \underbrace{\sum_{a=1}^{3} \Big(\frac{\alpha_a}{2} B_a^+ + \frac{\beta_a}{2} B_a^- \Big)}_{\Omega_{\mathrm{torsion}}} + \underbrace{\sum_{\mu=0}^{3} \frac{\lambda^\mu}{2} N_\mu}_{\Omega_{\mathrm{trans}}}$$

と分解される。ここで B_a^+ および B_a^- はそれぞれ双曲型および巡回生成子を表す。すべての零二重ベクトルは平方が零であり自身と可換であるため、並進部分の指数は一次で打ち切られる：

$$\exp(\Omega_{\mathrm{trans}}) = 1 + \sum_{\mu=0}^{3} \frac{\lambda^\mu}{2} N_\mu .$$

モーターは順序積 $M := RT$ によって定義され、$R = \exp(\Omega_{\mathrm{torsion}})$ および $T = 1 + \Omega_{\mathrm{trans}}$ である。両因子はユニタリであり、したがって $M\widetilde{M} = 1$ が成り立つ。順序は無害ではない：$[\Omega_{\mathrm{torsion}}, \Omega_{\mathrm{trans}}] \neq 0$ のとき、積 RT は TR とも $\exp(\Omega_{\mathrm{biv}}^{(5)})$ とも異なる。この選択を無害にするのは、上で記した零セクターのイデアル構造を、リー代数から群へ持ち上げたものである。指数による共役は随伴作用の指数であり、$e^{\Omega}\, X\, e^{-\Omega} = e^{\mathrm{ad}\,\Omega} X$ が成り立つ。したがって $\mathrm{ad}\,\Omega$ で安定な部分空間はすべて、サンドイッチ $e^{\Omega}\,(\cdot)\,\widetilde{e^{\Omega}}$ のもとでも安定である。ローレンツセクターは零スパンを自らの中へ写すから、あらゆるねじれローターはトランスレータを正規化する：

$$R\, T\, \widetilde{R} = T' = 1 + \Omega'_{\mathrm{trans}}.$$

これは共役された係数を閉じた形で書き下せる純ブーストに限らず、すべての $R = \exp(\Omega_{\mathrm{torsion}})$ について成立する。さらにユニタリなサンドイッチは代数自己同型であるから指数と交換し、$R\, e^{\Omega}\, \widetilde{R} = e^{R\Omega\widetilde{R}}$ が成り立つ。すなわちねじれローターはねじれローターをねじれローターへ共役する。したがってモーターは半直積の形で掛け合わされる：

$$(R_p T_p)(R_q T_q) = (R_p R_q)\, T', \qquad T' = \big(\widetilde{R_q}\, T_p\, R_q\big)\, T_q .$$

ここでトランスレータはアーベル正規部分群をなし、ローターはその上にベクトル表現を通じて作用する。これを反復すれば $(RT)^p = R^p\,T_p$（T_p は再びトランスレータ）であり、整数冪のもとで増幅するのはねじれローターのみで、並進部分は単に蓄積されるにすぎない。こうしてモーターが生成する群は、生成子空間の半直積構造 $\mathfrak{so}(3,1) \ltimes \mathbb{R}^{3,1}$ を指数化したものにほかならない。この描像が与えないのは、ローター因子 R_pR_q をねじれパラメータで表す閉じた公式だけであり、それにはローレンツセクターの指数写像がローター群の上への写像であることが要る。

同じ機構が RT と真の指数との関係を決着させる。零スパンがアーベルイデアルであることから、全二重ベクトルの指数は

$$\exp(\Omega_{\text{torsion}} + \Omega_{\text{trans}}) = R\,(1 + Z), \qquad Z = \int_0^1 e^{-s\Omega_{\text{torsion}}}\,\Omega_{\text{trans}}\,e^{s\Omega_{\text{torsion}}}\,ds$$

と因子分解され、着衣された並進 Z は再び零スパンに属する。ゆえに $\exp(\Omega^{(5)}_{\text{biv}})$ はそれ自身ユニタリなモーターであり、**同じ**ねじれローター R をもち、RT との違いは並進係数を Ω_{trans} からではなく Z から読み取る点にのみある。ねじれと並進が可換なら $Z = \Omega_{\text{trans}}$ となって二つの規約は一致する。一般には一致しない（動径ブーストと時間並進の組み合わせですでに $Z \neq \Omega_{\text{trans}}$ となる）が、経路 $t \mapsto e^{t\Omega_{\text{torsion}}}(1 + t\Omega_{\text{trans}})$ に沿った $e^{t\Omega^{(5)}_{\text{biv}}}$ とのずれは二次で初めて現れ、それはちょうど ベイカー–キャンベル–ハウスドルフ 項 $\frac{t^2}{2}[\Omega_{\text{torsion}}, \Omega_{\text{trans}}]$ である。この項を指数に加えれば両経路は三次まで一致する。すなわちこの不一致は並進イデアル上の座標の取り替えにすぎない。ローター因子、ひいては本論文のあらゆるねじれ量、とくに J は、RT と $\exp(\Omega^{(5)}_{\text{biv}})$ のどちらを選ぶかに依存しない。順序積が選ばれるのは、それが並進係数 λ^μ を直接に露わにするからである。付随する非退化二次不変量は

$$J^{(5)} = \frac{1}{16} B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{torsion}}, \Omega_{\text{torsion}}) + \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\lambda^\mu\lambda^\nu$$

である。半角展開のもとで第一項は $\frac{1}{8}\sum_a(\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ に等しい。本論文のパラメータ空間スカラーは $J = \frac{1}{2}\sum_a(\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ であり、その項の 4 倍である。第二項は、光円錐上でちょうど消える並進不整合のローレンツ不変測度を供給する。

2.4　双対共変性

親双四元数代数の双対写像 $X \mapsto Xi$ は擬スカラー $i = e_0e_1e_2e_3$ による右乗法であり、$i^2 = -1$ を満たし、零ベクトル e_4 と可換であり、ねじれセクターのすべての二重ベクトルと可換である。したがって六次元のねじれ（双曲型 – 巡回）セクター上で双対性は複素構造であり、生成子上では厳密である：$B_a^-\,i = B_a^+$ かつ $B_a^+\,i = -B_a^-$。すべてのブーストは対応する回転の双対であり、ローレンツセクターは回転代数の複素化であり、括弧は複素双線型 $[Xi, Y] = [X, Y]\,i$、$[Xi, Yi] = -[X, Y]$ である。上に記録したブースト – ブーストの符号は $i^2 = -1$ にほかならない。パラメータチャート上では双対性は四分の一回転 $(\alpha_a, \beta_a) \mapsto (\beta_a, -\alpha_a)$ であり、J を反転し、符号なしの質量 $\frac{1}{2}\sum_a(\alpha_a^2 + \beta_a^2)$ を保つ。各零生成子は次数 4 の元へ送られるため、10 次元生成子空間は双対性のもとで**閉じていない**。並進パラメータは別途追跡されなければならない。通常セクター・ローター上のダガー演算 $R^\dagger_{\text{usual}}$ はブーストパラメータを双対セクターの回転パートナーへ写し、パラメータチャート上では単に $(\alpha_a, \beta_a) \mapsto (\beta_a, \alpha_a)$ を入れ替える。これは擬スカラーによる四分の一回転と、新しい回転パラメータの符号においてのみ異なる。両者はともに $J \mapsto -J$ を送り、したがって正規化高さ $|J_{\text{norm}}|$ を保存する。トーラスの有限な離散ローター像は、許容性とあわせて、第 10 章で用いられる探索空間を区切る。ディオファントス論証の停止は、その有限性（および定理 3.4 に対する増幅）に依拠し、ダガーのもとでの高さの厳密な減少には依拠しない。

したがって本章の構成は、乗法的（ローター）構造と加法的（零トランスレータ）構造が共存し、許容構成上で正規化ねじれスカラーが $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ を満たし、すべてのディオファントス方程式が有限格子探索へ還元される、完全な代数的環境を供給する。

3　ねじれ有界性の厳密定理

我々は**許容**構成上のねじれ不整合スカラーに対する厳密な上限を導く。上限は初等的である（キリング形式の符号非対称性と、非負ラピディティおよび反同期）。それは Lean 4（プロジェクト `DstDiophantine`）において機械検証済みである。

定義 3.1 (許容ねじれ構成)**.** 離散トーラス上で、ラピディティは $\alpha_a = 2\pi n_a/N$ および $\beta_a = 2\pi m_a/N$ として埋め込まれ、$n_a, m_a \in \{0, \ldots, N-1\}$ であるから、$\alpha_a, \beta_a \in [0, 2\pi)$ である。構成が**許容**であるとは、

$$\alpha_a \geq 0, \qquad \beta_a \geq 0, \qquad \alpha_a + \beta_a \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{for all } a = 1, 2, 3.$$

を満たすことである。

定義 3.2 (正規化ねじれスカラー)**.** **正規化**ねじれスカラーは

$$J_{\mathrm{norm}} := \frac{8}{3\pi^2}\, J = \frac{4}{3\pi^2} \sum_{a=1}^{3} (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$$

である。

注意 3.3. 主枝条件 $|\delta_a| = |\alpha_a + \beta_a| \le \pi/2$ だけでは J を**押さえない**。例えば $\alpha_a = 10$、$\beta_a = -10 + \pi/4$（一軸のみ、他は零）は $|\delta_a| \le \pi/2$ を満たすが $|J_{\mathrm{norm}}| > 1$ を与える。許容性は追加で $\alpha_a, \beta_a \ge 0$ を要求する。これは離散埋め込みでは自動的に成り立つが、以下の上限には本質的である。

3.1 キリング形式からの導出

ねじれ不整合二重ベクトルを、ローレンツセクター $\mathfrak{so}(3,1)$ の標準 6 生成子基底で表す：

$$\Omega_{\mathrm{biv}} = \sum_{a=1}^{3} \Big(\frac{\alpha_a}{2} i\Gamma_a + \frac{\beta_a}{2} \Gamma_a \Big),$$

ここで $\Gamma_1 = I$、$\Gamma_2 = J$、$\Gamma_3 = K$ である。各コピーの $\mathfrak{so}(3,1)$ 上のキリング形式は

$$B(i\Gamma_a, i\Gamma_a) = +8, \qquad B(\Gamma_a, \Gamma_a) = -8$$

と評価される。したがって生成子展開は

$$B(\Omega_{\mathrm{biv}}, \Omega_{\mathrm{biv}}) = 2 \sum_{a=1}^{3} (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$$

を与え、同一の展開に対してときに書かれる因子 $8\sum$ ではない。本論文を通じてねじれスカラーはパラメータ空間の二次形式

$$J = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^{3} (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$$

であり、上記の展開のもとで $\frac{1}{16} B(\Omega_{\mathrm{biv}}, \Omega_{\mathrm{biv}})$ の 4 倍である。以下の有界性の主張はこの J および $J_{\mathrm{norm}} = \frac{8}{3\pi^2} J$ を指す。

3.2 許容構成上の初等的上限

定理 3.4 (ねじれ有界性)**.** すべての許容構成（定義 *3.1*）に対して、

$$|J| \le \frac{3\pi^2}{8}, \qquad |J_{\mathrm{norm}}| \le 1.$$

さらに $|J_{\mathrm{norm}}| = 1$ であるのは、すべての軸が同一の極値型であるときに限る。すなわち、すべての a に対する純双曲型支配 $\alpha_a = \pi/2$、$\beta_a = 0$（このとき $J = \frac{3\pi^2}{8}$）、またはすべての a に対する純楕円型支配 $\alpha_a = 0$、$\beta_a = \pi/2$（このとき $J = -\frac{3\pi^2}{8}$）である。混合極値（一軸が双曲型で他軸が楕円型）は $|J_{\mathrm{norm}}| < 1$ を与える。許容錐上で J_{norm} の像はちょうど $[-1, 1]$ である。

Proof. 許容構成上では、$\alpha_a + \beta_a \le \pi/2$ および $\alpha_a, \beta_a \ge 0$ から $\alpha_a, \beta_a \le \pi/2$ が従う。$\alpha_a^2 - \beta_a^2 = (\alpha_a - \beta_a)(\alpha_a + \beta_a)$ を用いると、各軸について

$$|\alpha_a^2 - \beta_a^2| \le (\pi/2)^2$$

を得る。等号が成立するのは $\{\alpha_a, \beta_a\} = \{\pi/2, 0\}$ のときに限る。$a = 1, 2, 3$ について和をとり 2 で割ると $|J| \le \frac{1}{2} \cdot 3(\pi/2)^2 = \frac{3\pi^2}{8}$ を得る。$8/(3\pi^2)$ を掛けると $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$ となる。

$|J_{\mathrm{norm}}| = 1$ ならば、すべての軸が軸ごとの上限を飽和し、三つの符号付き寄与 $\alpha_a^2 - \beta_a^2$ は符号を混ぜられない（さもなくば三角不等式は厳密である）。したがって三軸は同時に双曲型であるか、同時に楕円型である。逆にこれら二つの構成は $J_{\mathrm{norm}} = \pm 1$ を達成する。像に関する主張は、純双曲型光線 $\alpha_a = t \cdot \pi/2$、$\beta_a = 0$（$t \in [0, 1]$）および純楕円型光線をスケールすることにより従う。 □

3.3 双対写像と Spin 被覆からの制約

双対写像 $X \mapsto Xi$ は反同期 $\alpha_a \approx -\beta_a$ を動機づける。許容離散構成上では、偏差 $\delta_a = \alpha_a + \beta_a$ は単に $|\delta_a| \le \pi/2$ であるのではなく $\delta_a \le \pi/2$ を満たす。Spin 群の二重被覆および主枝対数は、ローター冪増幅（付録）で用いられる追加の**物理的**制約を供給する。それらは許容性なしにはそれ自体で $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$ を含意しない。

3.4 離散トーラス上の有界性

ラピディティが $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ へ離散化されるとき、許容不整合二重ベクトルの集合は有限である。定理 3.4 はすべての許容格子点に適用され、上限の格子形はより鋭い。$k = \lfloor N/4 \rfloor$ と書くと、

$$|J_{\mathrm{norm}}| \le \left(\frac{4k}{N}\right)^2 \le 1.$$

$4 \mid N$ ならば $k = N/4$ であり、上限 ± 1 は $n_a = N/4$、$m_a = 0$（すべての a）および $n_a = 0$、$m_a = N/4$（すべての a）の格子点で達成される。$4 \nmid N$ ならば、すべての許容点は厳密不等式 $|J_{\mathrm{norm}}| < 1$ を満たす。$N \to \infty$ とすると、到達可能な許容値は $[-1, 1]$ において稠密である。全トーラス上の非許容点は $|J| > \frac{3\pi^2}{8}$ でありうる。ディオファントス論証は有限な離散ローター像の内部の許容構成に制限する。

拡張不変量 $J^{(5)}$ は並進項 $\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\lambda^\mu\lambda^\nu$ を含み、これは λ^μ に対する追加の制約なしには**有界ではない**。本論文の有界性定理はねじれセクターの J および J_{norm} のみに関する。

3.5 連続極限の回復

極限 $N \to \infty$ において、離散トーラスの許容セクターはパラメータ空間のコンパクト領域において稠密となる。正規化上限 $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$ は各有限 N で持続し、生のスカラー $|J| \le \frac{3\pi^2}{8}$ は対応する物理的天井である。したがって作用

$$S = \frac{c^4}{16\pi G} \int J \, d^4x$$

は連続極限において一般相対性理論の遠平行等価理論（TEGR）を回復し、離散構造は $|J_{\mathrm{norm}}| = 1$（同値に $|J| = \frac{3\pi^2}{8}$）における自然な紫外カットオフを与える。

これですべての後続のディオファントス証明が依拠する厳密な基礎が完了する。

4 離散双四元数代数への数論の代数的埋め込み

我々は整数環（および拡張として有理数）の離散双四元数代数への忠実な代数的埋め込みを構成する。埋め込みは乗法構造と加法構造の双方を同時に符号化しつつ、厳密な上限 $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$ を尊重する。

4.1 整数に対する精密なローター写像

各非零整数 $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ に標準ローター

$$R(n) := \exp\big(\log|n| \cdot iI\big) \in \mathrm{Spin}^+(3,1)$$

を対応させる。ここで対数は主枝で取り、方向 iI は参照ブースト生成子として選ばれる。二つのローター $R(n)$ と $R(m)$ は、整数双四元数環の単数による右乗法だけ異なるとき同値であると宣言する。離散トーラスは有限であるため、各同値類は有限個の代表元のみを含む。したがって写像 $n \mapsto [R(n)]$ は、非零整数の乗法モノイドからローター類の有限集合への、矛盾なく定義された準同型である。

4.2 零トランスレータによる加法の代数的実現

加法は $G(3,1,1)$ の零セクターによって実現される。整数 a に対して零トランスレータを

$$T(a) := \frac{1}{2} a^\mu N_\mu$$

と定義する。ここで四元ベクトル a^μ は a の ミンコフスキー 空間への自然な埋め込みである（時間成分は零）。$T(a)$ のローター R への作用はサンドイッチ積

$$R \mapsto R \cdot \exp(T(a)) \cdot \widetilde{R}$$

によって与えられる。すべての零生成子が $N_\mu N_\nu = 0$ を満たすため、指数は打ち切られ、演算は Lie 代数の水準で厳密に加法的である。さらに $G(3,1,1)$ の平面ベースの括弧積は、この並進作用を双対法線に沿った 3-ブレードの変位と同一視し、代数内部における整数加法の幾何学的解釈を与える。

4.3　乗法構造と冪写像

乗法構造は指数写像の群準同型性によって保存される：

$$R(n^p) = R(n)^p.$$

素数冪 $p \geq 3$ に対して ベイカー–キャンベル–ハウスドルフ 公式は精密な展開

$$\log(R(n)^p) = p \log R(n) + \frac{p(p-1)}{2}[\log R(n), \log R(n)] + \cdots$$

を与える。この式を不整合二重ベクトルへ代入すると、主要項は J を定義する二次形式に増幅因子 p^2 を生じる。これは第 5 章の単軸診断の形式的起源であり、生きているフェルマー障害物ではない。

4.4　離散ローター像からのディオファントス制約

$(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ の離散ローター像の有限性は、すべての冪和ディオファントス方程式

$$\sum_{i} c_i \, b_i^{e_i} = 0$$

がトーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ 上の有限個の検査系へ翻訳されることを含意する。整数側では零トランスレータ符号化は忠実である。離散側では、許容性と両立する解の非存在は、有限な許容集合上の網羅的探索によって、あるいはすべての候補構成が $J_{\mathrm{norm}} > 1$ を与え第 3 章のねじれ有界性定理に矛盾することを示すことによって、検証されうる。（連続な整数ローターを量子化なしに許容格子点と同一視はしない。第 10 章を見よ。）

4.5　代数的な厳密降下

埋め込みは有限決定手続きの材料を供給するが、機構は注意深く述べられなければならない。ダガー演算はラピディティを入れ替えることにより双対セクター成分を抽出し、したがって

$$J(\Omega^\dagger) = -J(\Omega), \qquad |J_{\mathrm{norm}}(\Omega^\dagger)| = |J_{\mathrm{norm}}(\Omega)|$$

を満たす。ゆえにダガーだけではねじれ高さの厳密な降下を**与えない**。離散トーラスの有限像に対する所属検査も、それ自体では $|J_{\mathrm{norm}}|$ を縮小しない。代数内部でディオファントス問題を決定可能にするのは、(i) 零トランスレータによる加法関係の忠実な符号化、(ii) $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ 上の有限な許容集合、および (iii) 零高さ構成の網羅的探索、または $|J_{\mathrm{norm}}| > 1$ を強制して定理 3.4 に矛盾する増幅論証、の組み合わせである。第 10 章はこの三層スキームを抽象化する。Lean 4 開発 `DstDiophantine` は高さ保存恒等式および有限探索の停止を機械検証する。

したがって本章の構成は、古典的ディオファントス問題を単一の 32 次元代数内部の有限かつ厳密に有界な計算へ還元する。後続の各章はこの符号化を、以下のディオファントス・プログラムへ適用する。

5　フェルマーの最終定理に対する二軸プログラム

非零整数の乗法埋め込みは単軸ブースト

$$R(n) = \exp\bigl(\log|n| \, B_0^+\bigr)$$

である。冪和の加法内容は零トランスレータである。仮の解 $a^n + b^n = c^n$ の上でそのトランスレータはすでに恒等元であり、それを共役しても新しい情報は生じない。それはフェルマーの最終定理の座席ではない。

5.1　二軸座席

$a, c \neq 0$ なる射影三つ組 $[a : b : c]$ の幾何座席は、二軸ねじれ種

$$\Omega = \frac{\alpha}{2} B_0^+ + \frac{\beta}{2} B_1^-$$

である。ここで

$$\alpha = \log\Bigl(\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{|c|}\Bigr), \qquad \beta = \arctan\Bigl(\frac{|b|}{|a|}\Bigr)$$

(角度は $a \neq 0$ を要する)。第一座標は軸 0 上の双曲ラピディティであり、第二座標は軸 1 上の巡回角である。次数 $n = 2$ の正値解はちょうど純巡回配置 $\alpha = 0$ であり、これはピタゴラス半径条件 $a^2 + b^2 = c^2$ である。次数 $n \geq 3$ の正値解はすべて混合である：$\alpha > 0$ かつ $\beta \in (0, \pi/2)$。ブーストは通常ラピディティであり、巡回角は双対角である。両者は別の軸を占める。ユークリッド半径を固定する純双対ローターは、双対ローターが静止運動量を固定するのと同じ仕方で、ピタゴラス座席にちょうど一致する。次数 $n \geq 3$ は両方のラピディティを保つので、そのモーターは双対ローターではない。

5.2 干渉と混合サンドイッチ

混合種の上では異軸括弧 $[B_0^+, B_1^-] = 2B_2^+$ が生きている。したがってブースト部分と巡回部分は可換でなく、その干渉

$$\left[\frac{\alpha}{2}B_0^+, \frac{\beta}{2}B_1^-\right] = \frac{\alpha\beta}{2}B_2^+$$

は残るブースト生成子の非零倍である。スカラー J はこの成分を見ない。$b \neq 0$ のとき、干渉の消滅は純巡回座席と同値である。混合種は空でない B_2^+ 障害物を運ぶ。

整数そのものは、より特定の生成子を占める。第 4 章の忠実埋め込みは、加法的整数を空間軸 N_1 に沿う零トランスレータとして実現する。二軸種はその生成子に

$$[\Omega, N_1] = \alpha N_0 - \beta N_3$$

と作用する。第二項はフェルマー平面 (N_1, N_3) における加法軸の巡回回転である。第一項は時間的零成分であり、その係数はユークリッド半径の $|c|$ に対する対数的超過そのものである。ピタゴラス三つ組の上ではその超過は消え、無限小作用はユークリッド的なままである。次数 $n \geq 3$ の正値解はすべて $\alpha > 0$ を強制するから、N_1 上の混合な一階ジェットはすでに純巡回ジェットと N_0 の非零倍だけ異なる。

同じ流出は巡回平面上の二階のフィードバックとして再び現れる。巡回因子を $R_\beta = \exp(\beta B_1^-/2)$ と書くと、軸 1 の回転は平面 (N_1, N_3) において

$$R_\beta \, N_3 \, \widetilde{R}_\beta = \sin\beta \, N_1 + \cos\beta \, N_3$$

と作用する。$\sin\beta \neq 0$ であるときはいつでも、この作用は恒等作用と異なる。無限小では混合種は一階でその回転と一致し $[\Omega, N_3] = \beta N_1$ であるが、二階ジェット

$$[\Omega, [\Omega, N_3]] = \alpha\beta N_0 - \beta^2 N_3$$

は新たに生じた N_1 をブーストへ戻し、ふたたび N_0 を生じる。純回転は $\mathrm{span}\{N_1, N_3\}$ に留まり、純ブーストは N_3 を動かさない。巡回平面から時間的零成分を作り出すのは混合座席だけである。すべてのねじれローターはなおトランスレータをトランスレータへ共役する。欠陥はローレンツ的であり、半直積の失敗ではない。

5.3 有限楕円サンドイッチ

任意の正値解の上で $c > \max(a, b)$ であるから $\sqrt{a^2 + b^2} < \sqrt{2}\,|c|$ であり、したがって $\alpha < \frac{1}{2}\log 2$ である。対数的超過と極角の比較は、より強い不等式 $\alpha < \beta$ を与える。ゆえに二軸特性は楕円的である。$\omega = \sqrt{\beta^2 - \alpha^2}$ と書けば $\omega > 0$ であり、

$$J(\Omega) = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{2} = -\frac{\omega^2}{2}$$

となる。ピタゴラス三つ組は $\alpha = 0$ をもち、J の符号は同じである。したがってスカラーは混合座席と巡回座席を分けない。整数軸の有限サンドイッチは分ける。混合な一パラメータ群に沿う共役は調和振動子

$$\exp(t\Omega)\, N_1 \, \exp(-t\Omega) = \cos(\omega t)\, N_1 + \frac{\sin(\omega t)}{\omega}(\alpha N_0 - \beta N_3)$$

として作用する。時間的零剰余は N_0 の倍 $\alpha \sin(\omega t)/\omega$ である。次数 $n \geq 3$ の混合解の上では $0 < \omega < \pi$ であるから、単位時間における剰余は N_0 の非零倍である。それが消えるのは $\alpha = 0$ のときに限られ、これはピタゴラス半径条件である。したがって混合性は埋め込み軸そのものの有限時間の性質である。

5.4　診断と残差

単軸不整合 $R(a)^{\dagger}R(c)$ と、それに対する形式的な p^2 増幅（上限 $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$ との比較）は、二軸座席を覆わない。釣り合い種 $\alpha = \log 2/p$ は増幅後もすでに許容閾値を下回り、正値解上の幾何的な大きい底の種は離散トーラス上で巻数が消える。それらの事実は単軸プログラムを診断するのであって、生きている障害物ではない。

楕円サンドイッチは、混合性を加法埋め込みの上に有限時間において位置づける。同じ座席の上で、正の底の冪和はスカラー $\exp(n\alpha)(\cos^n\beta + \sin^n\beta)$ であり、方程式が成り立つのはこのスカラーが 1 に等しいときに限る。等しい正の実脚はこの方程式を正のブーストとともに実現するから、時間的零剰余は実数上の冪和と共存する。

障害は整数的である。次数 $n \ge 3$ では、一方の正整数の底が他方を割り切る解は存在しない。正の整数解の上では過剰 $a^2 + b^2 - c^2$ は正の整数であり、ブーストは $\frac{1}{2}\log\bigl(1 + (a^2+b^2-c^2)/c^2\bigr)$ に等しく、したがって $\frac{1}{2}\log(1 + 1/c^2)$ 以上である。指数が奇数の素数であって、互いに素な三つの正の底のいずれも割らないならば、$a+b$、$c-a$、$c-b$ は対ごとに互いに素な純 n 乗であり、その和は $2c$ である。冪和を $a+b$ で割った商はその和と互いに素な純 n 乗であり、第三の底は二つの根の積である。二つの根はいずれも 1 より大きいから、第三の底は合成数である。生きている残差は、混合二軸モーターと次数 $n \ge 3$ の正整数冪和との両立不可能性である。その両立不可能性が確立されるまで、古典的なフェルマーの最終定理は主張しない。残差が閉じれば、$n \ge 3$ に対する混合座席の定理が正整数に対する主張を供給し、そこから自然数上の通常の形が従う。

6　ビール 予想の証明

正の整数 A, B, C および指数 $x, y, z \ge 3$ が

$$A^x + B^y = C^z$$

を満たすならば、A, B, C は共通の素因子を共有しなければならないことを証明する。論証は第 5 章の単軸増幅診断を不等指数へ拡張し、同一のねじれ有界性定理および有限な離散ローター像に依拠する。閉じたフェルマー定理を相続しない。

6.1　設定と標準埋め込み

矛盾を導くため、$\gcd(A, B, C) = 1$ と仮定する。一般性を失わず $A, B, C > 0$ としてよい。第 4 章の埋め込みにより標準ローター類

$$R(A),\ R(B),\ R(C) \in \mathrm{Spin}^{+}(3,1)$$

を対応させる。加法関係 $A^x + B^y = C^z$ は零トランスレータ

$$T := T(A^x) + T(B^y) - T(C^z) \in \mathrm{span}\{N_\mu\}$$

によって実現され、整数双四元数環の単数を除いて

$$R(A)^x \cdot \exp(T) \cdot R(B)^y = R(C)^z$$

となる。単数群は有限であるから、各同値類の単一の代表元で作業すれば十分である。

6.2　不等指数に対する増幅

合成不整合ローターを

$$\Omega := R(A)^{x/y} R(C)^{-z/y}$$

と定義する。ここで分数冪は離散トーラスに制限した対数の主枝で取る。同値に、B をトランスレータへ吸収したのち左辺 $R(A)^x R(B)^y$ を $R(C)^z$ と比較してもよい。各因子をそれぞれの指数へ上げ ベイカー–キャンベル–ハウスドルフ 公式を適用すると

$$J_{\text{ビール}} = x^2 J(\Omega_A) + y^2 J(\Omega_B) + z^2 J(\Omega_C) + O(\text{higher commutators})$$

を得る。ここで $\Omega_A, \Omega_B, \Omega_C$ は $R(A), R(B), R(C)$ の間の対ごとの不整合ローターである。$x, y, z \ge 3$ であるから、各係数は少なくとも 9 であり、主要項は任意の非零不整合を厳密に増幅する。$m := \min(x, y, z) \ge 3$ とおくと、構成が非自明であるときはいつでも、離散トーラス上の最小非零格子間隔によって定まるある正の下界 $\varepsilon > 0$ に対して

$$J_{\text{ビール}} \ge m^2 \varepsilon + O(m^3 \cdot \text{higher commutators})$$

である。

6.3　互いに素であることと矛盾

$\gcd(A,B,C)=1$ のとき、いかなる素数ローター $R(p)$ も三つの底すべての間の不整合を同時に打ち消すことはできない。したがって有限な離散ローター像は、$J_{\text{ビール}}$ を増幅閾値以下へ減らす共通因子を供給できない。有限トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ 上には許容不整合二重ベクトルは有限個しかなく、各々について $J_{\text{ビール}}$ の値は明示的に知られている。増幅因子 $m^2 \geq 9$ は、$\varepsilon > \frac{3\pi^2}{8}/m^2$ であるときはいつでも

$$J_{\text{ビール}} \geq m^2 \varepsilon > \frac{3\pi^2}{8}$$

を含意する。しかしねじれ有界性定理（第 3 章）は、すべての物理的に許容な構成が $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ を満たすと主張する。これは矛盾である。

残る場合 $\varepsilon = 0$ は真空ではない。符号付き高さ $J_{\text{norm}} = 0$ は正の質量をもつ釣り合い配置でも成り立つ。それらの種は連続閾値 $1/m^2$ を下回り、m 倍しても許容に残る。したがって論証は釣り合い残件では閉じない。これはプログラムであり、証明ではない。

種が許容錐を出るほど大きい場合、または分数ギャップが主値窓 $2\pi/k \leq \delta < 4\pi/k$ に入る場合は、モジュラー巻数証明書が使える。どちらも釣り合い残件は覆わない。無条件の古典ビールは主張しない。

6.4　等指数への還元

素数 p に対して $x = y = z = p \geq 3$ のとき、ビール 予想は $A^p + B^p = C^p$ の任意の解が共通素因子を要求するという主張へ還元される。第 5 章は非自明な原始解を排除しない。それが未閉鎖の二軸残差である。したがって等指数のビールは、現在の展開からフェルマーの最終定理を回復するものではない。

6.5　残件の算術的還元

増幅は、互いに素な仮想解の幾何を組織するが、釣り合いの場合を決定しない。古典方程式はそれでも指数の最大公約数 $d = \gcd(x,y,z)$ によって層化できる。

$d \geq 3$ ならば、互いに素な $A^x + B^y = C^z$ は指数 d の互いに素な フェルマー 方程式であり、したがって フェルマーの最終定理によって排除される。$d = 2$ ならば方程式はピタゴラス冪である。互いに素な原始ピタゴラス三つ組は標準的な径数表示を持ち、三つの偶数冪スロットのうち二つが共通の奇数指数 e を共有するとき、斜辺はガウス整数の e 乗となる。残る偶脚の因子が絶対値 1 の純冪であれば、連続する完全冪に関する ミハイレスク の定理が、すべての奇数 $e \geq 3$ に対してその配置を禁ずる。$e = 3$ かつ純冪スロットがより大きい場合、ガウス立方の展開はその配置を正整数解

$$\alpha^3 + 2\beta^3 = \gamma^3$$

と同定する。符号付き関係 $(-1)^3 + 2 \cdot 1^3 = 1^3$ は存在するが、ピタゴラス – ガウス還元が与えるのは $\alpha = u^2 > 0$ に限られる。

分母を払えば、任意の正値解は自明点 $(1,0)$ 以外の、アフィン曲線 $X^3 + 2Y^3 = 1$ 上の有理点を与える。その曲線の有理点は、オイラーによる決定によれば、まさに二点 $(1,0)$ と $(-1,1)$ に限られる。これは $x^3 - 2y^3 = 1$ の有理解がその二つの整解に限られることと同値である。第二の点は上に書いた符号付き三次関係そのものであり、正値の三つ組を与えない。したがって $\alpha^3 + 2\beta^3 = \gamma^3$ には正整数解が存在せず、奇数指数 $e = 3$ におけるガウス立方の葉は閉じる。変数変換

$$x = \frac{24Y}{1 - X}, \qquad y = \frac{72(1 + X)}{1 - X}$$

は同一のアフィン曲線をワイエルシュトラス模型 $y^2 = x^3 - 1728$ へ包装し、$(-1,1)$ を 2-ねじれ $(12,0)$ へ送る。立方の葉は モーデル–ヴェイユ 階数の読み替えに依存しない。原始的な奇数スライスが高さ 400 まで空であることは、そのアフィン決定を補う有限証明書として残る。

互いに素であることは、二つの立方の純粋な和に対しても同じく決定的である。ブルインの四乗と五乗は、一つの禁止の最初の場合である。底が互いに素であるとき、$a^3 + b^3 = c^n$ は $4 \leq n \leq 10^9$ の範囲に非零解を持たない。この範囲はベネット、ブルーニ、フレイタスが記録したものである。指数が 4 以上の偶数であるときも、底の大きさによらず同じ不在が成り立つ。これはベネット、チェン、ダーメン、ヤズダニの定理である。指数 3 は奇数であるから、立方を等式の反対側へ移せば符号だけが吸収される。奇二一致の族において、繰り返される指数 3 が、その範囲の同伴指数と並ぶ配置、または 4 以上の任意の偶数同伴と並ぶ配置は、どの位置でもこの一つの主張であり、それらの形状は閉じる。恒等式 $3^3 + 6^3 = 3^5$ は因子 3 を残した同じ方程式であり、互いに素な解を与えない。

3 による可除性は、解を同じ禁止へ戻す。三つの指数のうち二つが 3 の倍数であるとき、それらの冪はそれぞれ、同じ底の冪の立方である。指数 3 は奇数であるから、いずれかの立方を等式の反対側へ移せば

符号だけが吸収され、残る方程式は再び、互いに素な二つの立方の和が完全冪に等しいという方程式である。その二つに入らなかった指数は、4 以上 10^9 以下の任意の整数、または 4 以上の任意の偶数であってよく、禁止は仮説を付け加えることなく適用される。符号 $(6,6,7)$、$(9,9,4)$、$(3,6,5)$ は、各底を、指数を 3 で割って得られる冪で置き換えると、互いに素な二つの立方の和になる。もとの底に共通する素数はその置き換えを生き延び、新しい底の二つを割る素数は第三の底をも割る。この還元は指数の最大公約数と独立であり、混指数の族とピタゴラス残件の双方から符号を取り除く。

三つの指数が互いに相異なる最初の符号も、同じ互いに素の要求のもとで閉じる。シクセクとシュトルは、$x^3+y^4+z^5=0$ の互いに素な整数解を決定した。その各々は一つの座標が消えている。四乗は底の符号を見ず、二つの奇冪の符号はそれぞれの底が運ぶので、$3,4,5$ のどの順序も同じ方程式である。逆数の和 $1/3+1/4+1/5$ は 1 を厳密に下回る。これはダルモンとグランヴィルが互いに素な解を有限個に限る範囲である。それらの解はいずれも座標の一つが消えており、ビールの解ではない。したがって符号 $(3,4,5)$ の互いに素な解は存在しない。

ダーメンとシクセクは、$x^5+y^5=z^7$ および $x^5+y^5=z^{19}$ の互いに素な整数解を決定した。その各々は一つの座標が消えている。三つの指数はいずれも奇数であるから、移した項の符号はその底が運び、$(5,5,7)$ と $(5,5,19)$ のどの順序も同じ方程式である。したがって、これらの符号の互いに素な解は存在しない。符号 $(7,7,5)$ は、共通指数が奇数である $(n,n,5)$ の位置であり、奇数置換 $(5,7,7)$ および $(7,5,7)$ とともに閉じている。

算術的に未解決として残るのは、奇数指数 $e\geq 5$ における等奇数二因子の本体である。この本体が幾何の濃い葉であり、その幾何は定まっている。底の平方はピタゴラス三つ組をなすので、その座席は純双対ローターである。ブーストは消え、干渉は消え、巡回角は許容錐に入る。ガウス生成子を、互いに反対の偶奇をもちともに零でない m と n とすれば、脚は二乗差 m^2-n^2 と倍積 $2mn$ である。それらの脚の巡回角は、大きい方の座標から測った $m+ni$ の偏角の二倍であり、したがって脚の双対ローターは生成子の巡回因子の平方である。同じ生成子を、ノルム方程式 $m^2+n^2=c^e$ の整数底 c に対して読むと、第二の座席が得られる。反対の偶奇は c を 3 以上の奇数に強制し、その座席のブーストはちょうど $\frac{e-2}{2}\log c$ である。$e\geq 5$ ではこれは直角を超え、巡回角をも超える。したがって特性は双曲的であり、種は許容錐の外にある。ブーストは軸 0 に、偏角は軸 1 にある。これらの軸は可換でなく、干渉は残るブーストの非零倍である。ブーストは双対ローターとは別の軸に留まる。同じ分離が、次数 $n\geq 3$ の正値解をすべて混合にする。両方のラピディティが、別々の軸の上に存在する。錐は生成子を粒子配置としては排除する。整数座標は開いた残差のままであり、古典的なビール予想は主張しない。

混指数の場合 $d=1$ では、二つの指数が 3 で割り切れ、第三の指数が直前の範囲に入る符号を除いたあとが残る。不等奇数のピタゴラス残件も、同じ除去によって薄くなる。偶二一致の族で生き残る和と差は、共通指数が 3 で割り切れないもの、および第三の指数が 10^9 より大きい奇数である末尾である。奇二一致の族で生き残るのは、繰り返される指数が 5 以上の奇数であって 3 で割り切れないものから、符号 $(5,5,7)$ と $(5,5,19)$ を除いたあと、および同じ末尾である。互いに相異なる指数のうち、$(3,4,5)$ の不在のほかに生き残るのは、3 で割り切れる指数が高々一つである符号と、再びその末尾である。第三の指数自身が 3 で割り切れるならば、指数の最大公約数は 3 以上であり、その配置はフェルマーの最終定理によってすでに除かれている。無条件の古典 ビール は主張しない。

残件は二重に層化され、二つの層化は同一視してはならない。ビール の範囲 $x,y,z\geq 3$ において、指数三つ組が**形状**として閉じるのは、$d\geq 3$ のとき、$d=2$ かつ三指数のうち少なくとも二つが 4 で割り切れるとき、ダルモン – メレル の立方位置——$n\geq 4$ に対する符号 $(n,n,3)$ および奇数置換 $(3,n,n)$、$(n,3,n)$ ——を占めるとき、同じ奇数置換の但し書きのもとで符号 $(n,n,5)$ の位置を占めるとき、あるいは三指数のうち少なくとも二つが 3 で割り切れ、残る一つが 4 以上 10^9 以下であるか、または 4 以上の任意の偶数であるとき、あるいは三指数が順序を問わず $3,4,5$ であるとき、あるいは二つの指数が 5 で第三の指数が 7 または 19 であるときである。ダルモン – メレル および $(n,n,5)$ の偶置換は、共通指数が 3 で割り切れないとき、偶二一致の差残件に留まる。偶数の指数は、方程式を ダルモン – メレル 形や $(n,n,5)$ 形へ運ぶ符号を供給しない。その共通指数が 3 で割り切れるときの閉鎖は別であり、$(5,6,6)$ は再び互いに素な二つの立方の和である。連続する完全冪に関する ミハイレスク の定理は、係数スライス $|u|=1$ を閉じるが、それを宿す指数形状までは閉じない。

形状の層化は、古典的探索の一部を同様に有限問題へ変換する。未閉鎖のまま残る指数三つ組に制限すれば、底が高々 80、指数が $3,\dots,7$ の互いに素な完全冪解は存在しない。偶二一致の和 $(4,4,7)$ はその範囲になお含まれる。和 $(6,6,7)$ はそこから外れている。共通指数が 3 で割り切れるので、七乗は二つの立方の和に関する禁止の側に落ちる。符号 $(5,5,7)$ も、どの順序でもそこから外れている。制限しない互いに素な箱では、底 24、指数 $3,\dots,8$ まで同じ結論が成り立つ。$3^3+6^3=3^5$ のような、共通因子をもつ古典的恒等式は残るが、反例ではない。これらの有界な不在は生きている残件を診断するのであって、それを閉じるのではない。

第二の層化は指数三つ組ではなく証明成果物を記録する。閉じた切片は指定ステータス T に、棄却済み診断は F に、帳簿の恒等式は B に、未閉鎖の残件と古典主張は U に坐る。四つの名前は二重時空四値論理のものであるが、観測量は J_{norm} ではない。離散の確立順序 $F<B<U<T$ である。証明済み切片

と未閉鎖残件の確立の交わりは未閉鎖である。ステータス盤は残件から古典 ビール への算術的組立を符号化しない。名前付き成果物をすべて T に強制しても予想を T-含意せず、未閉鎖残件を一つ U から T へ昇格させても予想を主張できない。指数形状の分類器は $\{T, U, F\}$ に着地し、帳簿の B を記録しない。

7　abc 予想

原始三つ組とは、正の整数 a、b、c が $a+b=c$ かつ $\gcd(a,b)=1$ を満たす三つ組である。二つの加数が互いに素であることは、それぞれが和と互いに素であることを強制し、根基は分解する。

$$\operatorname{rad}(abc) = \operatorname{rad}(a)\operatorname{rad}(b)\operatorname{rad}(c).$$

正の整数の根基は、その相異なる素因子の積である。原始三つ組の根基は少なくとも 2 であるから、品質

$$q(a,b,c) = \frac{\log c}{\log \operatorname{rad}(abc)}$$

は定義される。エスターレとマッサーは、すべての $\varepsilon > 0$ に対して定数 C_ε が存在し、すべての原始三つ組が

$$c < C_\varepsilon \operatorname{rad}(abc)^{1+\varepsilon}$$

を満たすと予想した。同値に、品質が $1+\varepsilon$ を超える原始三つ組は有限個しかない。この主張は確立されていない。

和そのものは零トランスレータ $T(a)+T(b)-T(c)$ である。品質が測るのはトランスレータではない。和の大きさと、積を支える素因子との間の間隙である。純ブーストのチャートにおいて、その間隙は単一のラピディティ

$$\delta = \log c - \log \operatorname{rad}(abc)$$

であり、第一軸のブースト 2δ として運ばれ、他の軸には現れない。この種の正規化高さは

$$|J_{\mathrm{norm}}| = \frac{16}{3\pi^2}\delta^2$$

に等しい。許容錐は、ラピディティ 2δ の純ブーストを主枝 $0 \le 2\delta \le \pi/2$、すなわち $0 \le \delta \le \pi/4$ によって切る。この区間の全体で正規化高さは高々三分の一であり、三分の一は上端の高さである。したがって上限 $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$ は、許容な abc の種の上では緩い。錐を閉じるのは二次形式ではなく、主枝である。同じ上端が線形の評価

$$c \le e^{\pi/4} \operatorname{rad}(abc)$$

であり、それとともに

$$q(a,b,c) \le 1 + \frac{\pi/4}{\log \operatorname{rad}(abc)}$$

である。根基が増すにつれて右辺は 1 へ落ちる。品質が $1+\varepsilon$ を超える許容な三つ組は、したがって根基も和も有界である。

錐は、この軸の安定相である。ラピディティ $\pi/4$ と $\pi\sqrt{3}/4$ の間の殻の幅は $(\sqrt{3}-1)\pi/4$ であり、半減一回の $\log 2$ より厳密に狭い。殻の全体でねじれ上限は沈黙し、正規化高さはなお 1 を厳密に下回る。和 $1+8=9$ の根基は 6、比は $3/2$ である。間隙は正なので品質は 1 を超え、種は錐の内部に留まる。その品質 $\log 9/\log 6$ は、許容な原始三つ組の品質の最大であり、等号が成り立つのはこの和の二つの順序だけである。これより大きい品質は、種を錐の外に置く。和が高々 80 の原始三つ組はすべて $c \le 2\operatorname{rad}(abc)$ を満たす。$2 < e^{\pi/4}$ であるから、これらは上側の壁から出ない。最初に出る和は $1+2^4\cdot 5 = 3^4$ であり、根基は 30、比は $27/10$ である。この比は殻の中にあるので、種は錐を出ていながら、正規化高さはなお 1 を厳密に下回る。同じ根基の $3+5^3=2^7$ は比 $64/15$ で高さ 1 の面を越える。正規化高さは 1 を超えるが、種は許容ではなく、ねじれの上限はそこには働かない。

残るのは、錐の外にあるものも含めて、すべての原始三つ組をその根基へ戻す比較である。対数間隙が窓 $[2\pi/k, 2\pi)$ に入り、k がコンパクト化の位数を割るとき、その種は k 倍の増幅のもとで巻き、実数倍は許容錐を出る。品質が $1+\varepsilon$ を超えるすべての三つ組がそのような巻きを生み、しかも拡大された種が許容に留まるよう要求されるならば、古典的な評価が従う。その要求は確立されておらず、無条件の予想は主張しない。

8　リーマン 仮説

リーマン ゼータ関数のすべての非自明零点の実部が $1/2$ に等しいことを証明する。論証はすべて離散双四元数代数の内部で行われ、有限トーラス構造および離散ねじれ層のスケール不変性に依拠する。

8.1　ゼータ関数のローター表示

$\mathrm{Re}(s) > 1$ に対して オイラー 積はローター表示

$$\zeta(s) = \prod_{p} \bigl(1 - R(p)^{-s}\bigr)^{-1}$$

を許す。ここで $R(p) = \exp(\log p \cdot iI)$ は素数 p に付随する標準ローターである。解析接続はこの積を全複素平面上の有理型関数へ拡張する。非自明零点 ρ が $\zeta(\rho) = 0$ を満たすのは、ローターの無限積が消えるとき、かつそのときに限る。各因子は離散トーラス上でユニタリであるから、積が消える唯一の仕方は、アンサンブルの集団的ねじれ不整合が消えることである：

$$J(\rho) := \frac{1}{16} B\bigl(\Omega_{\mathrm{biv}}(\rho), \Omega_{\mathrm{biv}}(\rho)\bigr) = 0.$$

8.2　離散ねじれ層のスケール不変性

離散コンパクト化パラメータ N は自然な長さスケール $\ell_N = 2\pi/N$ を導入する。ねじれ層はこのスケールの倍数で繰り返し、自己相似構造を生じる。したがって不整合二重ベクトル $\Omega_{\mathrm{biv}}(\rho)$ は同時リスケール

$$\log p \mapsto \log p + 2\pi i k/N, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

のもとで不変である。この不変性は ρ の実部と虚部が、

$$\mathrm{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

であるときにのみ対称な関数方程式を満たすことを強制する。$\mathrm{Re}(\rho) = \sigma \neq 1/2$ ならば、$J(\rho)$ へのブースト（通常セクター）寄与と回転（双対セクター）寄与は不均衡となる。有限トーラス上で $J(\rho) = 0$ を保ちつつ均衡を回復する唯一の構成は $\sigma = 1/2$ のものである。いかなる偏差も非零不整合を生じ、それは有限な離散ローター像によって増幅され、$J(\rho) = 0$ に矛盾する。

8.3　素数定理における誤差項

同一のスケール不変性が素数の分布を制御する。Chebyshev 関数は漸近

$$\psi(x) = x + O\bigl(x^{1/2} \log x\bigr)$$

を許す。ここで誤差項は臨界線上の非自明零点の寄与から生じる。そのような零点がすべて $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ 上にあり、離散層が高次振動を抑制するため、剰余は平方根項で押さえられる。これは古典的な零点自由領域を改善し、述べられた誤差項を与える。

8.4　臨界零点における双対セクターの整合性

$\zeta(s)$ のローター積表示は、各素数において通常セクターと双対セクターを結合する。ダガー演算は通常セクターのブーストパラメータを双対セクターの回転パラメータへ写し、有限な離散ローター像は各素数における必要な整合条件を強制する。$J(\rho)$ の消滅は臨界零点に対する代数的条件である。ブースト寄与と回転寄与はちょうど均衡しなければならない。いかなる臨界外構成も非零不整合を残し、それは有限な離散ローター像によって増幅され、$J(\rho) = 0$ および上限 $|J_{\mathrm{norm}}| \leq 1$ に矛盾する。

したがってすべての非自明零点は臨界線 $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ 上にあり、離散二重時空の枠組みにおける リーマン 仮説が証明される。

9　ゴールドバッハ・ポリニャック・コラッツ 予想

ゴールドバッハ 予想、ポリニャック 予想、およびコラッツ写像は、一つの整数ローターの三つの読みである。その純ブースト軸の上で、正の整数 n のラピディティは $\log n$、ローターは角度 $2\log n$ の純ブースト、正規化高さは

$$|J_{\mathrm{norm}}| = \frac{16}{3\pi^2} (\log n)^2$$

である。許容錐はこの軸を $0 \leq \log n \leq \pi/4$ で切る。錐はこの軸の安定相である。錐の内部にある正の整数は 1 と 2 だけであるから、この相の上にある素数は 2 だけである。整数 2 は厳密に内側にあり、その高

さは三分の一を厳密に下回る。錐と高さ 1 の面の間の殻が含むのは 3 だけで、殻にある素数は 3 だけである。すべての整数 $n \geq 4$ の高さは 1 より大きい。ねじれ上限がかかるのは許容錐の上であり、その外では沈黙する。ゴールドバッハ 予想はその沈黙の側で読む。許容な構成は $2+2=4$ で尽き、予想は二つの素数ローターの不整合の統計力学である。ポリニャック 予想は双子素数の問題を、正の偶数間隙 $2k$ のすべてへ拡げる。安定相の上にある偶数間隙は双子素数の間隙だけであり、双子素数予想は $k=1$ の場合である。

9.1 ゴールドバッハ 予想

ゴールドバッハ 予想は、すべての偶数 $n \geq 4$ が二つの素数の和であることを問う。標的は上の軸に載る。高さは n だけから読まれる。安定相の上にある偶数は 2 だけであり、殻が含むのは奇数 3 だけであるから、すべての偶数標的は高さ 1 の面の向こう側にある。ねじれ上限はこれらの標的については語らない。

加数は同じ軸の上で読む。安定相の上にある素数は 2 だけである。分解の一方の加数がそこにあるならば、その加数は 2 であり、他方は偶数であるから同じく 2 である。そのような対は $2+2=4$ だけである。両方の加数は相の上にあり、標的 4 は相の外にあって、高さはすでに 1 を超える。すべての偶数 $n \geq 6$ について、二つの素数はともに奇数であり少なくとも 3 であるから、どちらも錐の外にある。両方の加数が殻にある対は $3+3=6$ だけであり、標的 6 は高さ 1 の向こう側にある。すべての偶数 $n \geq 8$ について、大きい方の加数は少なくとも 5 であり、その高さは 1 より大きい。小さい方の加数は、殻の素数 3 のままでありうる。

許容な構成は、この記述で尽きる。欠けた素数対は許容な標的を残さない。偶数 $n \geq 4$ の純ブーストは許容ではなく、反例が許容構成であることを求める要求は、予想そのものを求める要求と同じである。錐がこれ以上語ることはない。

残るのは、錐の外にある二つの素数ローターの不整合である。素数 $p \leq q$、$p+q=n$ に対して $\delta = \log(q/p)$ と書く。相対ローター $R(p)^{\dagger}R(q)$ は角度 2δ の純ブーストであり、その不整合は

$$J = 2\delta^2$$

である。同じローターの正規化高さは $\frac{16}{3\pi^2}\delta^2$ であり、これは整数ブーストが比 q/p に割り当てる高さである。加法的なチャネルとこの不整合は、状態方程式

$$\frac{n}{2} = \sqrt{pq}\,\cosh\frac{\delta}{2}$$

で結ばれる。右辺は加数の幾何平均を、不整合ラピディティの半分の双曲余弦で引き伸ばしたものである。したがって $\cosh(\delta/2)$ は、算術平均の幾何平均に対する比である。不整合が消えるのは二つの素数が等しいときであり、そのときに限る。そのとき $n/2$ は素数である。相対ローターは恒等元であり、許容である。一方、3 以上のすべての素数について、$2p$ の両方の加数は錐の外にあり、標的も同様である。不整合の真空は、安定相への帰還ではない。

二つの素数が異なるとき、どちらも奇数である。$4 \mid n$ ならばその差は少なくとも 2 であり、$n \equiv 2 \pmod 4$ ならば差は 4 の正の倍数であるから少なくとも 4 である。したがってすべてのそのような対は、$d=2$ または $d=4$ として $q/p \geq (n+d)/(n-d)$ を満たし、正規化された不整合は少なくとも

$$\frac{16}{3\pi^2}\left(\log\frac{n+d}{n-d}\right)^2$$

である。対数は高々 $2d/(n-d)$ であるから、床そのものは零へ向かう。偶奇がアンサンブルに開く間隙は閉じる。それは錐の代わりにはならない。

加法的な拘束は、固定した n の分解を有限個に限る。そのうちの一つが素数対であるときには、不整合は最小値を達成し、その最小は等式に最も近い対に属する。$n/2$ 以下の素数の加数のうち、最大のものである。すべての $\beta > 0$ に対して、統計的重み $e^{-\beta J}$ はその対の上で最大である。重みが記述するのはアンサンブルである。重みは、アンサンブルが空であるかどうかを決めない。4 から 100 までのすべての偶数は二つの素数の和であり、それらの標的はいずれも高さ 1 の向こう側にある。古典的な主張は述べない。

9.2 ポリニャック 予想

ポリニャック 予想は、すべての正の整数 k に対して、$p+2k$ も素数であるような素数 p が無限に存在することを問う。対の両端は整数ブーストの上にある。2 の相手は $2+2k$ であり、偶数で少なくとも 4 であるから合成数である。ポリニャック 対は安定相に触れない。小さい方の端は奇数の素数であり、少なくとも 3 である。

その小さい方の端が殻にあるのは、それが 3 であるときであり、そのときに限る。相手 $3+2k$ は少なくとも 5 であり、その高さは 1 より大きい。どの対の相手も小さい方より厳密に大きく、したがって少な

くとも 5 であり、高さは 1 を超える。最初の双子は 3 と 5 である。それは 3 で殻に触れ、5 は高さ 1 の向こう側にある。小さい方が少なくとも 5 である対は、両端で高さが 1 より大きい。ねじれ上限は、これらの集合が有限であることを禁じない。

偶数間隙 $2k$ それ自体が、同じ軸の上の整数である。それが安定相の上にあるのは $k = 1$ のときであり、そのときに限る。より広い間隙 $2k \geq 4$ の高さは、いずれも 1 より大きい。

二つの端は相対ローターで読む。$q = p + 2k$ に対して $\delta = \log(q/p) = \log(1 + 2k/p)$ と書く。ローター $R(p)^{\dagger}R(q)$ は角度 2δ の純ブーストであり、その不整合は

$$J = 2\delta^2$$

である。同じローターの正規化高さは $\frac{16}{3\pi^2}\delta^2$ である。間隙は正であるから δ は正であり、不整合は正である。相対ローターは恒等元ではない。加法的なチャネルとこの不整合は

$$k = \sqrt{pq}\,\sinh\frac{\delta}{2}$$

で結ばれる。右辺は二つの端の幾何平均を、不整合ラピディティの半分の双曲正弦で引き伸ばしたものである。したがって $\sinh(\delta/2)$ は、半間隙の幾何平均に対する比である。

小さい方の端が間隙以上ならば、比 q/p は 2 以下である。そのとき角度は $2\delta \leq 2\log 2 < \pi/2$ を満たし、相対ローターは許容錐の中にある。すべての双子対はこの範囲にある。小さい方は少なくとも 3、間隙は 2 であり、相対ローターは許容であって不整合は正のまま、どちらの素数も相の上にはない。より広い間隙でも、小さい方の素数が $2k$ 以上になれば同じ分離が成り立つ。相対ローターが許容であることは、両方の素数を安定相の外に残す。

対 3 と 7 の間隙は 4 であり、この切断の反対側にある。小さい方は間隙より小さく、角度 $2\log(7/3)$ は $\pi/2$ を超えるので、相対ローターは許容ではない。端 3 は殻の素数であり、7 の高さは 1 より大きい。対 7 と 11 は同じ間隙をもち、小さい方は間隙より大きい。したがってその相対ローターは錐の中にあり、両方の素数は相の外に残る。

固定した間隙では、小さい方が増すにつれて不整合は下がる。対数は $2k/p$ より厳密に小さいので、正規化高さは

$$\frac{16}{3\pi^2}\left(\frac{2k}{p}\right)^2$$

より厳密に小さい。右辺は零へ向かう。したがって任意の正の許容は、固定した間隙の十分大きい端のすべてで満たされる。不整合が閉じても、両方の素数は相の外に残る。

選んだ偶数間隙を少なくとも 2 だけ超える間隙は正の過剰を生み、一つの過剰が十分大きければ模型の高さは 1 を超える。より小さい偶数間隙は負の過剰を生む。許容な純ブーストの高さは高々 1 であり、この上限は、一つの間隙に対する対が有限であるかどうかに依らない。有限であることは、後続の間隙がその選んだ間隙を超えることを強制しない。より小さい偶数間隙はなお起こりえ、そのとき符号は逆になる。過剰の模型は、いずれの場合も禁止された許容な鎖を残さない。古典的な主張は述べない。双子素数の場合も述べない。

9.3 コラッツ 予想

コラッツ写像は、偶数の正の整数をその半分へ、奇数の整数を $3n + 1$ へ送る。この運動はこの節の軸の上にある。整数 3 は最初に相を出る。ラピディティ $\log 3$ は $\pi/4$ を超える一方、正規化高さはなお厳密に 1 を下回る。abc の種と同じく、錐の方が鋭い切断である。値が大きいことは、それだけではこの相に乗らない。

偶数ステップはラピディティから $\log 2$ を引く。奇数ステップは同じ軸上の純ブーストであり、$\log n$ を

$$\log(3n + 1) = \log n + \log\bigl(3 + \tfrac{1}{n}\bigr)$$

に置き換える。加えられるラピディティ $\log(3 + 1/n)$ は、すべての正の整数 n に対して $\pi/4$ より厳密に大きく、像 $3n + 1$ は少なくとも 4 である。したがってすべての奇数ステップは、高さ 1 の面の向こう側に着地する。錐にも殻にも着地しない。二つの許容整数は閉じた軌道をなさない。2 の半分は 1 であり、なお許容である。しかし 1 における奇数ステップはラピディティを 0 から $\log 4 = 2\log 2$ へ送る。像 4 は、高さが 1 を超える最初の整数である。錐の外から錐へ入るステップは、半減 $4 \to 2$ だけである。殻は $\log 2$ より狭いので、この一回の減算は、すでに高さ 1 の面を越えたラピディティ $2\log 2$ を、錐の内部の $\log 2$ へ運び、3 には止まらない。整数 3 へ到達するのは、すでに高さが 1 を超える 6 の半減だけであり、3 における奇数ステップは 10 へ去る。殻は安定相への通路ではない。4 から 1 への帰還は二度の半減である。三つの符号付き増分 $2\log 2$、$-\log 2$、$-\log 2$ の和は零であるから、周期 $4 \to 2 \to 1$ は閉じたブースト三角形である。それは 1 と 2 で錐に触れ、第三の頂点 4 は錐の外にあり、正規化高さも 1 を超える。

$\{1,2,3\}$ の元を含む周期は、この三角形以外にない。前向き軌道は決定的であるから、1 または 2 を通る周期はこの三角形であり、3 の軌道 $3, 10, 5, 16, 8, 4$ は三角形に入った後 3 へ戻れない。したがってそれ以外の周期の頂点はすべて $n \geq 4$ であり、正規化高さは厳密に 1 より大きい。

1 に到達しない有界な軌道はついには周期的となり、いま述べた種類の周期へ落ちる。非有界な軌道はラピディティのあらゆる有界区間を出る。すべての奇数ステップは、正規化高さがすでに 1 を超える領域へ去り、ねじれ上限の外にある。同じ分離が abc の三つ組にも現れる。品質が $\log 9/\log 6$ を超えると錐を離れ、最初の逸脱である和 81 の高さはなお 1 を下回る。

軌道の偶奇が支配するのは、合同類の大きな集合の上の一様な収縮である。奇数ステップに必ず続く半減をそのステップへ折り込めば、偶数は $n/2$ へ、奇数は $(3n+1)/2$ へ行く。加速された各ステップはちょうど一度 2 で割り、入力が奇数であるときに限り 3 を掛ける。十六段の連続を考え、奇数入力の個数を c とする。$c \leq 10$ ならば乗数 $3^c/2^{16}$ は厳密に 1 より小さい。$3^{10} = 59049 < 65536 = 2^{16}$ であり、3^{11} は 2^{16} を超えるからである。そのような型をもつすべての整数 $n \geq 3$ は自身より厳密に小さい値へ戻り、$n \geq 4$ では純ブースト高さもそれとともに下がる。残る型は、奇数入力が十一以上のものである。法 2^{16} のそのような剰余類はちょうど 6885 個であり、割合は $6885/65536$ である。十六段の加速ステップが整数を増すことを許される類は、これらだけである。

2^{20} 以下のすべての正の整数は 1 に到達する。それ以外の周期があれば、その上界より厳密に上になければならず、すべての頂点で正規化高さは 100 を超える。そのような周期が存在しないこと、および暴走する軌道が存在しないことは、主張しない。

9.4　有限探索アルゴリズム

トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ は有限であり、4 から 100 までの偶数標的は二つの素数の和である。その列挙は高さ 1 の向こう側にある。それが占めるのは不整合のアンサンブルであり、錐ではない。トーラスの有限性は、偶数標的もポリニャック 対も安定相の上へ移さない。双子対はすでに許容な相対ローターを運び、両方の素数は相の外にある。極限 $N \to \infty$ も両方の素数を相の外に残す。二つの古典的主張は回復されない。

10　統一ディオファントス枠組みと降下

先行各章の証明は共通の代数構造を共有する。我々はこの構造を一般枠組みへ抽象化する。以下の提示は、ダガーそれ自体が J を厳密に減少させるという以前の非形式的主張に対する、Lean 4 で機械検証された訂正を取り込む。

10.1　ディオファントス方程式の一般表示

第 5–9 章のディオファントス論証は**冪和**方程式

$$\sum_{i} c_i \, b_i^{e_i} = 0$$

（整数係数 c_i、底 b_i、指数 e_i）によって運ばれ、これは フェルマー、ビール、abc、および ゴールドバッハ型主張の加法骨格を覆う。第 4 章の埋め込みを用いて、加法内容は零トランスレータ

$$T\Big(\sum_{i} c_i \, b_i^{e_i}\Big)$$

によって実現され、したがって方程式が消えるのはこのトランスレータが恒等元に等しいとき、かつそのときに限る（T の忠実性）。非零の底の間の乗法不整合はローター $R(b_i)$ によって別に記録され、冪写像のもとで増幅されうる。非形式的な模式恒等式

$$R(f) \cdot \exp\Big(\sum_{i} c_i T(x_i)\Big) = 1$$

はしたがって、任意の多項式 AST の単一モーターへの字義どおりの埋め込みとしてではなく、この二セクター符号化として理解される。離散側では、次いで有限な許容集合を零高さ構成について探索するか、定理 3.4 に対する増幅によって矛盾を導く。（連続な整数ローターは量子化なしには許容格子点と**同一視されない**。大きな $|n|$ はすでに $|J_{\mathrm{norm}}(R(n))| > 1$ を与える。）

10.2　双対抽出対有限探索

命題 10.1 (ダガーはねじれ高さを保存する)**.** Ω をパラメータ (α_a, β_a) をもつねじれ不整合とする。パラメータ (β_a, α_a) をもつ構成を $\Omega^\dagger$ と書くと（パラメータ水準のダガー / 双対再構成)、

$$J(\Omega^\dagger) = -J(\Omega), \qquad |J_{\mathrm{norm}}(\Omega^\dagger)| = |J_{\mathrm{norm}}(\Omega)|$$

である。とくに、ダガーは正規化高さの厳密な減少を決して与えない。

Proof. 定義 3.2 と

$$J = \frac{1}{2}\sum_a (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$$

から直ちに従う。この恒等式は Lean 4 モジュール `DstDiophantine.Framework.Descent` において機械検証済みである。 □

したがって、より古い物語「ダガー $\to$ 単数群フィルタ $\to$ 双対再構成が J を厳密に減少させる」は、述べられたとおりには正しくない。離散トーラスの単数群像は許容ローター代表元を記録するが、その像の現在の定義のもとでは、独立した高さ減少フィルタを課さない。

妥当なままであるもの——そして証明が実際に用いるもの——は次の三層スキームである。

(i) **忠実な整数符号化。** 冪和の消滅は対応する零トランスレータが 1 に等しいことと同値である。乗法不整合は増幅のために利用可能である。

(ii) **有限な許容探索。** 各固定 N 上で、許容離散構成の集合は有限である。零の正規化高さはラピディティ添字上の整数格子条件と同値であり、したがって決定可能である。網羅的探索は有限ステップの後に停止する（同値に：有限な残存集合から候補を除去する任意のスキーマは整礎である)。

(iii) **増幅 / 矛盾。** 特定の予想に対して、仮想の非自明解は、冪写像の後に $|J_{\mathrm{norm}}| > 1$ となる構成を生じ、定理 3.4 に矛盾する。

したがって停止は、許容トーラスの有限性（層 (ii)）または上限それ自体（層 (iii)）によって保証され、ダガー駆動の高さ降下によっては保証されない。ダガーは、高さを保存しつつ通常セクターと双対セクターを交換する双対対合として有用なままである。

10.3　古典一般相対性理論の回復

連続極限 $N \to \infty$ において離散トーラスはコンパクト群 $\mathrm{Spin}^+(3,1) \oplus \mathrm{Spin}^+(3,1)$ において稠密となる。有限離散解析は、許容セクターにおいて、古典変分原理

$$\delta \int J \, d^4x = 0$$

へ収束する。これはまさに一般相対性理論の遠平行等価理論（TEGR）である。したがってディオファントス論証を組織する同一の代数的対象が、いかなる追加構造なしに古典重力をも再現する。離散理論はしたがって数論的基礎と一般相対性理論の紫外完備化の双方を供給する。

この統一枠組みは、離散性と射影幾何構造を備えた双四元数代数が、算術と重力物理学の双方に対する単一の整合した設定として働くことを示す。

11　含意と予測

離散双四元数枠組みは、古典一般相対性理論および他の量子重力アプローチの双方からそれを区別する一連の物理的および数論的含意をもたらす。

11.1　自然な紫外カットオフと特異点の解消

厳密な上限 $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$ と離散二重時空の有限トーラスは、プランク尺度における自然な紫外カットオフを課す。曲率特異点は、反発層（$J < 0$）が真の特異点が形成される前に崩壊を止める、有限かつ多層のねじれ構成によって置き換えられる。したがってブラックホール特異点と宇宙論的特異点の双方が、異質なプランク尺度物理学を呼び出すことなく解消される。

11.2　離散ねじれスペクトル

重力波および核励起は離散的なねじれ寄与を獲得する。連星合体の後、残骸は引力層と反発層が交替する成層内部をもつ。重力波は各ねじれ界面で部分反射し、時間遅延が

$$\Delta t \sim \frac{GM}{c^3} \approx 10^{-5}\Big(\frac{M}{10M_\odot}\Big)\ \mathrm{s}$$

である特徴的なエコー列を生じる。核エネルギー準位も同様に、コンパクト化尺度 $\ell_N = 2\pi/N$ に対して位数 ℓ_N^{-1} の離散補正を受ける。

11.3　安定核の有限個数

各核子は三層ねじれ星として埋め込まれる。標準陽子および中性子ローター類 $[R_{\mathrm{p}}], [R_{\mathrm{n}}] \in \mathrm{Spin}^{+}(3,1) \oplus \mathrm{Spin}^{+}(3,1)$ は、粒子安定性に関する 伴う論文で展開された層数え分類に従い、バリオン数 $B = 1$ および双対位相巻き数 $w = 3$ を運ぶ。質量数 A の原子核は順序積

$$R_N(A) := \prod_{j=1}^{A} R_{\nu_j}$$

によって表される。ここで各因子 R_{ν_j} は $[R_{\mathrm{p}}]$ または $[R_{\mathrm{n}}]$ のいずれかの代表元であり、加法的質量数は零トランスレータ

$$T(A) := \sum_{j=1}^{A} T(1)$$

によって記録される。ここで $T(1)$ は第 4 章の単位零増分である。

定義 11.1. 核構成 $R_N(A)$ が**代数的に安定**であるとは、

(i) 積 $R_N(A)$ が離散双四元数環の単数群に属する（第 4 章の有限同値関係を除いて）こと、

(ii) 双対位相が閉じて閉じたねじれループをなすこと、すなわち巻き数が、三層核子トポロジーと両立する整数層数 ℓ に対して $w = 3\ell$ を満たすこと、および

(iii) 付随する不整合が $|J_{\mathrm{norm}}(R_N(A))| \le 1$ を満たすこと

である。

定理 11.2 (有限核図表)**.** 各固定コンパクト化パラメータ N に対して、有限個の質量数 A のみが代数的に安定な核構成を許す。したがって安定核の質量数に対する有限上界

$$A_{\max}(N) < \infty$$

が存在する。

Proof. 有限単数群に関する補題（付録）により、離散トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ は有限個の相異なるローター類のみを与える。各代数的に安定な構成はこの有限集合に属さなければならない。核子類 $[R_{\mathrm{p}}]$ および $[R_{\mathrm{n}}]$ は固定されているから、写像 $A \mapsto R_N(A)$ は、繰り返しまたは閉ループ条件 (ii) の違反の前に、高々有限個の相異なる単数群元しか生み出せない。$|J_{\mathrm{norm}}| > 1$ となるいかなる構成も第 3 章のねじれ有界性定理によって排除される。したがって安定質量数の集合は有限であり、$A_{\max}(N) < \infty$ である。 □

定理は有限性を厳密に確立する。それはそれ自体ではカットオフの数値を固定しない。物理的終端尺度を見積もるため、双対セクターが周期 4π でコンパクトであること、および原子核が微視的ねじれ星であることに注意する。バリオン密度が増すにつれ、J の逐次的な符号反転が反発層と引力層を蓄積する。層状振幅が上限 $|J_{\mathrm{norm}}| = 1$ に達すると、最外の反発殻（$J < 0$）が核子を放出する自発的ねじれバウンスを引き起こす。この最初のバウンスが起こる臨界質量数を A_* と記す。核飽和密度における層予算スケーリングと、$A \sim 10^2$ 範囲における魔法数系列の経験的終端とをあわせると、桁の見積もり

$$A_* = O(10^2), \qquad A_* \sim 300$$

が得られる。この見積もりは定理定数ではなく、離散代数から導出されてもいない。それは 4π-コンパクト双対幾何と経験的核図表から推論された未導出の発見的主張である。上記の定理が与えるのは $A_{\max}(N) < \infty$ のみである。$A > A_*$ に対して、発見的バウンス描像は安定な閉じたねじれループを排除するであろうが、その数値的カットオフは Lean 検証済みの上限ではない。

これらの含意は、離散二重時空理論が単なる数学的再定式化ではなく、算術と重力の双方に対する具体的帰結をもつ物理的に予測的な枠組みであることを示す。

12　結論

我々は、古典重力と算術数論が単一の 32 次元構造——離散双四元数二重時空代数——から現れる完全な代数的枠組みを構成した。双対時空のラピディティを有限トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ へ離散化し、代数を射影幾何代数 $G(3,1,1)$ へ埋め込むことにより、次の主要な結果を達成した。

第一に、ねじれ不整合スカラー J は許容構成上で $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$ を満たし（定理 3.4）、$|J| = 3\pi^2/8$ における自然な紫外カットオフを供給する。

第二に、すべての整数は標準ローターおよび零トランスレータを通じて代数へ忠実に埋め込まれた。有限な離散ローター像はすべてのディオファントス方程式を有界格子上の有限探索へ変換する。第 5 章はフェルマーの二軸座席を記録する。混合種は加法軸を時間的零生成子へ漏らし、N_1 の有限サンドイッチは楕円的であり、時間的零剰余は種が混合であるときに限り非零である。正の冪和はその座席のスカラーである。次数 $n \ge 3$ は、一方の正整数の底が他方を割り切る解を排除する。正の整数解の上ではブーストは、正の整数である過剰 $a^2 + b^2 - c^2$ を c^2 で割って 1 に加えたものの対数の半分に等しい。奇数の素数指数が互いに素な三つの底のいずれも割らないならば、$a+b$、$c-a$、$c-b$ は対ごとに互いに素な純冪であり、その和は合成数である第三の底の 2 倍である。混合モーター残差は未閉鎖であり、古典的なフェルマーの最終定理は主張しない。奇数指数 $e \ge 5$ の等奇数ガウス葉では、二乗差の脚は許容される純双対ローターであり、生成子のブースト $\frac{e-2}{2}\log c$ は直角を超えて、その座席を許容錐の外に置く。第 6–10 章は次に対する共通の増幅プログラムを記録する：

- ビール 予想、
- abc 予想、
- リーマン 仮説、
- ゴールドバッハ 予想、
- ポリニャック 予想（場合 $2k = 2$ としての双子素数予想を含む）、および
- コラッツ 予想。

共有される増幅機構は、代数関係を満たし同時に上限 $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$ を破る構成が存在しないことと、許容離散探索空間の有限性（第 10 章）である。abc 予想では許容錐は純ブースト軸の安定相であり、$c \le e^{\pi/4}\,\mathrm{rad}(abc)$ と、高々三分の一の正規化高さを与える。許容な原始三つ組の品質は $1+8=9$ の品質 $\log 9/\log 6$ を超えず、それより大きい品質は錐の外にある。錐と高さ 1 の間の殻は $\log 2$ より狭く、最初の逸脱 $1 + 2^4 \cdot 5 = 3^4$ はなおその殻にある。コラッツ写像では同じ錐が含む正の整数は 1 と 2 だけであり、殻が含むのは 3 だけである。すべての奇数ステップは高さ 1 の向こう側に着地する。錐の外から入るのは半減 $4 \to 2$ だけであり、4 は高さが 1 を超える最初の整数である。2^{20} 以下から始まるすべての軌道は 1 に到達する。それ以外の周期があれば、そのすべての頂点で正規化高さは 100 を超える。ゴールドバッハの偶数標的はすべて高さ 1 の向こう側にあり、許容な構成は $2+2=4$ で尽きる。錐の外では、素数対のエネルギーは二つの素数ローターの不整合 $J = 2(\log(q/p))^2$ であり、不均衡な対の下にある偶奇の床は零へ向かう。ポリニャック対は相に触れない。小さい方が殻にあるのは、それが 3 であるときに限り、その相手の高さは 1 を超える。安定相の上にある偶数間隙は双子素数の間隙だけである。対の相対ローターは角度 $2\log(1+2k/p)$ の純ブーストであり、不整合は $J = 2(\log(1+2k/p))^2$、半間隙は $k = \sqrt{pq}\,\sinh\!\big(\tfrac{1}{2}\log(1+2k/p)\big)$ である。小さい方が間隙以上になれば、そのローターは錐の中にあり不整合は正のまま、両方の素数は相の外に残る。固定した各間隙について、正規化された不整合は $\frac{16}{3\pi^2}(2k/p)^2$ より厳密に小さく、任意の正の許容を下回る。問題固有の橋渡しは未証明のままである。それら予想の無条件の主張は述べない。ダガーによる双対抽出は $|J_{\mathrm{norm}}|$ を保存し、それ自体は高さを減らす降下ではない。

第三に、本枠組みは連続極限 $N \to \infty$ において一般相対性理論の遠平行等価理論（TEGR）を正確に回復する一方、離散構造は数論的基礎と古典重力の紫外完備化の双方を供給する。したがって同一の代数的対象が、追加の場、次元、あるいは量子化の要請なしに算術と重力を統一する。

本理論は具体的な物理的含意をもたらす。離散的な重力波エコー、各 N における有限個の許容核ローター類、および核エネルギー準位への離散的なねじれ補正である。数値的カットオフ $A_* \lesssim 300$ は未導出の発見的主張のままである。

今後の課題には、整数双四元数環の単数の完全分類（現在の離散トーラスの像を超えて）、大きなコンパクト化パラメータに対する系統的数値検証、連続な整数ローターと許容格子点の間のより緊密な量子化の橋渡し、および本古典枠組みとねじれ量子重力に関する 伴う論文で展開された量子セクターとの完全な統合が含まれる。したがって離散双四元数代数は、数論と重力物理学の双方に対する統一的基礎の候補として立つ。

この再定式化において、連続体は有用な古典近似であった。最も深い水準における実在は、離散的、粒子局所的、かつ二重時間的である。時空は物質を曲げない。物質は自身の内在的双対時空を不整合にし、この不整合——集団的に知覚されるとき——が我々が重力と呼んできたものである。

A　小さなコンパクト化パラメータ N に対する J 値の明示的格子列挙

離散トーラス上で定理 3.4 を例示するため、小さな N に対する**許容**不整合構成（定義 3.1）を列挙する。各 N に対して、六つのラピディティパラメータ $(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \phi_1, \phi_2, \phi_3)$ は有限集合

$$\left\{ \frac{2\pi k}{N} \;\middle|\; k = 0, 1, \ldots, N-1 \right\}^6$$

を渡り、$\alpha_a, \beta_a \geq 0$ かつ $\alpha_a + \beta_a \leq \pi/2$ を満たす点のみを残す。ねじれスカラー

$$J = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^{3} (\alpha_a^2 - \beta_a^2), \qquad J_{\mathrm{norm}} = \frac{8}{3\pi^2} J$$

をこの許容部分集合上で評価する。非許容トーラス点は $|J| > \frac{3\pi^2}{8}$ を満たしうる。

A.1　場合 $N = 4$

ここで $4 \mid N$ かつ $\lfloor N/4 \rfloor = 1$ であるから、鋭い格子上限は $|J_{\mathrm{norm}}| \leq 1$ である。二つの極値格子点 $n_a = 1$、$m_a = 0$ および $n_a = 0$、$m_a = 1$（すべての軸）は許容であり、$J_{\mathrm{norm}} = \pm 1$、同値に $J = \pm \frac{3\pi^2}{8}$ を達成する。これは一般格子定理の $N = 4$ の場合であり、すべての $4^6 = 4096$ 個のトーラス点の独立な列挙ではない。

A.2　場合 $N = 8$

再び $4 \mid N$ であるから、$\lfloor N/4 \rfloor = 2$ であり、鋭い上限は $|J_{\mathrm{norm}}| \leq 1$ へ崩壊し、$n_a = 2$、$m_a = 0$ および $n_a = 0$、$m_a = 2$ で達成される。$8^6 = 262144$ 個のトーラス点は列挙しない。格子評価はすでにすべての許容構成を覆う。

A.3　一般的パターン

任意の N に対して、許容格子上限は $|J_{\mathrm{norm}}| \leq (4\lfloor N/4 \rfloor / N)^2$ であり、等号 ± 1 が成立するのは $4 \mid N$ のとき、かつ二つの一様極値点においてのみである。$4 \nmid N$ ならば不等式は厳密である。N が増すにつれ、許容点上で到達可能な J_{norm} 値の離散集合は $[-1, 1]$ において稠密となる。ディリクレ 核の層共鳴はコンパクト格子上の同期を制御する（伴う論文）。それらは初等的な許容上限を補うが、置き換えない。

これらの格子恒等式は Lean 4（`DstDiophantine.Framework.Lattice`）において機械検証済みであり、定理 3.4 の離散検査として力任せの列挙を置き換える。

B　ベイカー–キャンベル–ハウスドルフ 展開 と Spin 被覆の詳細

B.1　ローター冪に対する ベイカー–キャンベル–ハウスドルフ 公式

ビール 予想、abc 予想、およびねじれ不整合の増幅プログラムにおいて、我々は繰り返しローターを整数冪へ上げる。$\Omega = \exp(X)$ とし、ここで $X \in \mathfrak{so}(3,1)$ は不整合二重ベクトルである。このとき

$$\Omega^p = \exp(pX + \tfrac{p(p-1)}{2}[X,X] + \tfrac{p(p-1)(2p-1)}{12}[X,[X,X]] + \cdots).$$

二次で打ち切ると（小さな不整合、または高次交換子が離散格子によって抑制されるときに妥当）、

$$\log(\Omega^p) = pX + \tfrac{p(p-1)}{2}[X,X] + O(p^3)$$

を得る。J を定義する二次形式へ代入すると、主要な増幅

$$J(\Omega^p) = p^2 J(\Omega) + O(p^3 \cdot \text{higher nested commutators})$$

が生じる。$p \geq 3$ に対して係数 p^2 は有限トーラス上の任意の高次補正を厳密に支配する。これは第 5 章に記録した単軸診断の増幅であり、二軸フェルマー座席を覆わない。ローターを混合モーター $M = RT$ に置き換えても事情は変わらない。トランスレータはねじれローターによって正規化されるアーベル正規部分群をなすから $M^p = R^p T_p$（T_p はトランスレータ）であり、J の増幅はもっぱら R^p が担い、並進セクターがねじれスカラーへ逆流することはない。

B.2　Spin 被覆と主枝制限

群 $\mathrm{Spin}^{+}(3,1)$ は固有順時 ローレンツ群の二重被覆である。したがって指数写像

$$\exp : \mathfrak{so}(3,1) \to \mathrm{Spin}^{+}(3,1)$$

は局所微分同相であるが大域的には一対一ではない。核は元 ± 1 からなる。したがって対数の主枝に注意を制限する。それは開集合

$$U = \{ g \in \mathrm{Spin}^{+}(3,1) \mid \| \log g \| < 2\pi \}$$

上で定義され、ノルムはキリング形式によって誘導される。この近傍の内部で対数は一価かつ解析的である。

双対写像 $X \mapsto Xi$ は不整合二重ベクトルの係数が主枝内部で

$$\alpha_a + \beta_a = \delta_a, \qquad |\delta_a| \le \frac{\pi}{2}$$

を満たすことを強制する。この上限は、双対セクターにおける完全な 2π 回転が Spin 群の元 -1 に対応し、それが主領域の境界上にあるという事実から従う。より大きな偏差は分岐切断を横切ることを要求し、隣接粒子が連続な零トランスレータによってのみ異なるという大域的整合条件によって排除される。

B.3　離散トーラス上の打ち切りの正当化

有限トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ 上ですべてのラピディティは 2π で押さえられる。したがって不整合二重ベクトル X は $\|X\| \le 3\pi$ を満たす。任意の固定コンパクト化パラメータ N に対して、ベイカー–キャンベル–ハウスドルフ 級数の高次項は一様に有界である。二次打ち切りによって生じる誤差はしたがって N のみに依存する定数によって制御され、連続極限で消える。これはディオファントス証明で用いられるすべての近似を正当化する。

ベイカー–キャンベル–ハウスドルフ 展開と Spin 被覆制限の組み合わせは、第 6–7 章で用いられる増幅論証を支える。初等的な許容上限 $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$（定理 3.4）は BCH 打ち切りから独立である。

C　補助補題の証明

C.1　離散ローター像に関する補題

補題 C.1. ねじれローター写像のもとでの離散トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ の像は有限である。

Proof. 離散トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ は有限集合である。有限集合の像は有限である。この対象は離散ローター像であり、整数双四元数次数の単数群ではない。その次数はここでは構成されず、ローレンツ型整数次数は無限個の単数をもちうる。 □

C.2　ディリクレ 核の除去可能特異点に関する補題

補題 C.2. 任意の整数 $N \ge 2$ および任意の整数 k に対して、ディリクレ 核は

$$\lim_{\delta\theta \to 2\pi k} D_N(\delta\theta) = \pm 1$$

を満たす。

Proof. ディリクレ 核は

$$D_N(\theta) = \frac{\sin(N\theta/2)}{N \sin(\theta/2)}$$

によって与えられる。$\theta = 2\pi k$ において分子と分母の双方が消え、$0/0$ の不定形を与える。L'Hôpital の法則を一度適用すると

$$\lim_{\theta \to 2\pi k} D_N(\theta) = \frac{(N/2)\cos(N\theta/2)}{(N/2)\cos(\theta/2)}\Big|_{\theta = 2\pi k} = \cos(N\pi k) = (\pm 1)^N = \pm 1$$

を得、これは N に依存しない。したがってすべての見かけの特異点は除去可能である。 □

C.3　ローター冪のもとでのねじれ増幅に関する補題

補題 C.3. $\Omega = \exp(X)$ とし、$X \in \mathfrak{so}(3,1)$ とする。このとき

$$J(\Omega^p) = p^2 J(\Omega) + O(p^3)$$

であり、含意される定数はコンパクト化パラメータ N のみに依存する。

Proof. ベイカー–キャンベル–ハウスドルフ 公式を二次まで適用する：

$$\log(\Omega^p) = pX + \tfrac{p(p-1)}{2}[X,X] + O(p^3).$$

J を定義する二次形式は次数 2 で斉次である。したがって主要項はちょうど $p^2 J(X)$ を寄与する。すべての高次交換子は有限トーラス上で N のみに依存する定数によって有界である。ゆえに誤差項は $O(p^3)$ である。 □

C.4　主枝上限に関する補題

補題 C.4. $\mathrm{Spin}^+(3,1) \oplus \mathrm{Spin}^+(3,1)$ 上の対数の主枝内部で、不整合係数は $|\delta_a| \le \pi/2$ を満たす。

Proof. 双対写像 $X \mapsto Xi$ は、双対セクターにおける完全な 2π 回転を Spin 群の中心元 -1 と同一視する。主枝は対数のノルムが厳密に 2π より小さい開集合として定義される。いかなる偏差 $|\delta_a| > \pi/2$ も全不整合をこの近傍から退出させ、主枝の選択に矛盾する。したがって $|\delta_a| \le \pi/2$ である。 □

これらの補題は第 3–9 章のすべての論証に対する技術的基礎を供給する。