

二重時空理論

重力の本質を双四元数代数で解き明かす

二重時空理論プロジェクト

2026 年 2 月 17 日

目次

第 I 部	数学的基礎：複素数から双四元数へ	1
第 1 章	人類の至宝：オイラーの公式	2
1.1	出会い：最も美しい等式	2
1.2	複素数と複素平面の復習	2
1.3	テイラー展開による導出	4
1.4	幾何学的意味：複素平面上の回転	6
1.5	なぜ「人類の至宝」なのか	8
第 2 章	四元数：3 次元回転の完璧な記述	10
2.1	2 次元の限界と 3 次元回転の難しさ	10
2.2	ハミルトンの発見：運河の橋での閃き	10
2.3	四元数の定義と基本性質	10
2.4	純虚四元数と回転軸	11
2.5	四元数による 3 次元回転の表現	11
2.6	なぜ「完璧」なのか：行列表示との優位性	11
2.7	次元を超えるもう一つの拡張：双曲線版への道	11
第 3 章	双曲線版オイラー公式とローレンツ変換の萌芽	13
3.1	空間回転から時空ブーストへの移行	13
3.2	双曲線関数の復習とテイラー展開	13
3.3	双曲線版オイラー公式の導出	14
3.4	謎：二乗して +1 になるのは数なのか、符号なのか？	14
3.5	ローレンツブーストのローター表現	14
3.6	もう一つの拡張：二乗して 0 になる自動微分係数	14
3.7	双四元数への道：二つの世界の融合	15
第 4 章	双四元数：二つの四元数の可換テンソル積	16
4.1	四元数の限界と拡張の必然性	16
4.2	歴史的エピソード：クリフォードの予見と双四元数の再発見	16
4.3	双四元数の定義：可換テンソル積	16
4.4	クリフォード代数 $Cl(3,1)$ との同相写像	17
4.5	時空ベクトルの双四元数表現	17
4.6	完全ローターとローレンツ変換	17
4.7	次章への展望：二重時空の粒子内在性	17

第 5 章	クリフォード代数 $Cl(3,1)$ と双四元数の同相	18
5.1	クリフォード代数の基礎：幾何積の導入	18
5.2	$Cl(3,1)$ の構築：ミンコフスキー計量の場合	18
5.3	双四元数との同相写像：ひねくれた美しさ	19
5.4	不思議さの物理的意味	19
5.5	次章への橋渡し：粒子内在の二重時空	19
第 II 部	二重時空理論の核心	20
第 6 章	光速度一定の革命：エーテル否定から特殊相対性理論へ、そして通常時空基底との完全一致	22
6.1	19 世紀の危機：光行差とエーテル仮説	22
6.2	マイケルソン・モーリー実験：エーテル否定の決定的証拠	22
6.3	アインシュタインの公準：光速度一定の原理	22
6.4	ローレンツ変換とラビディティの導入	25
6.5	通常時空基底によるローレンツ変換の代数的表現	25
6.6	完全一致の美しさとその限界	26
6.7	次への橋渡し：双対時空の必然性	26
第 7 章	二重時空の構造：各粒子が持つ二つの時空	27
7.1	時空連続体仮説の否定	27
7.2	双四元数代数内の二重時空基底	27
7.3	双対写像と時間の反転	27
7.4	粒子内在的な二重時空の意味	28
7.5	不変量の保存とローレンツ不変性	28
7.6	次への橋渡し：完全ローターと平行移動の代数化	28
第 8 章	異なる時空をつなぐ双対マップ	29
8.1	双対マップの定義と基本性質	29
8.2	時間の反転と物理的解釈	29
8.3	ローターに対する双対マップの作用	30
8.4	完全ローターの必然性と双曲・三角の違和感の解消	30
8.5	双対マップの物理的意義：重力への橋渡し	31
8.6	次章への展望：重力の本質としてのねじれ不整合	31
第 9 章	重力＝双対時空間のねじれ不整合	32
9.1	ねじれ不整合ローターの定義	32
9.2	トーションバイベクトルと不変量の構築	32
9.3	アクションと場の方程式：TEGR との精密な等価性	33
9.4	弱場極限とニュートン極限の確認	33
9.5	物理的解釈：重力は制御可能な自由度	34
9.6	次章への橋渡し：慣性と重力の統一	34
第 10 章	慣性と重力の完全統一	35
10.1	慣性の伝統的謎とマッハの原理	35
10.2	粒子内在的な双対時空と剛性	35

10.3	自由落下：ローターの完全同期とねじれゼロ	35
10.4	加速と慣性力：ねじれ不整合の発生	36
10.5	等価原理の代数的証明	36
10.6	マッハの原理の実現：遠方物質との集団的同期	36
10.7	次章への展望：応用と新たな予測	36
第 III 部 応用と予測		37
第 11 章 暗黒物質不要の銀河回転曲線		38
11.1	観測事実：平坦回転曲線の謎	38
11.2	暗黒物質仮説の問題点	40
11.3	二重時空理論での解釈：集団的なねじれ不整合	41
11.4	数学的モデル：トーシヨン分布と有効重力	42
11.5	観測との比較と成功	44
11.6	予測と検証可能性	46
11.7	次章への展望：強重力場とトーシヨン星	47
第 12 章 強重力場：トーシヨン星と層状構造		48
12.1	弱重力場から強重力場への移行	48
12.2	トーシヨン星の基本概念と定義	49
12.3	層状トーシヨン分布の数学的記述	50
12.4	質量増加に伴う層構造の進化	50
12.5	トーシヨン星の外部解と観測的特徴	50
12.6	合体・衝突過程と重力波シグネチャ	50
12.7	トーシヨン星内部の状態方程式と相転移	50
12.8	観測的検証可能性と現在の制約	50
12.9	理論的含意と次章への展望	50
第 13 章 核力・原子構造・力の統一		51
第 14 章 重力工学と未来技術		52
第 15 章 量子重力への道と結論		53
双四元数乘法表		54
主要数式まとめ		55
参考文献		56

第 I 部

数学的基礎：複素数から双四元数へ

第1章

人類の至宝：オイラーの公式

本書は、二重時空理論（重力を双四元数代数によって完全に記述する新しい理論）の入門書である。その旅は、まず「人類の至宝」と呼ばれる一つの等式から始まる。それは、数学の美しさと物理学の深淵を同時に示す、永遠の宝石である。

1.1 出会い：最も美しい等式

「これは我々の至宝であって、数学における最も注目すべき公式である」リチャード・ファインマンは、オイラーの公式をそう評した。

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad (1.1)$$

この等式は、五大定数（自然対数の底 e 、虚数単位 i 、円周率 π 、1、0）を一つの関係式にまとめている。しかし、真の美しさは単なる数の集合ではなく、指数関数と三角関数が虚数単位を通じて完全に結びつく点にある。本節では、読者が初めてこの等式に出会う感動を再現することを目指す。

1.2 複素数と複素平面の復習

オイラーの公式を深く理解するためには、まず複素数の基本的な性質をしっかりと復習しておく必要がある。本節では、複素数を代数的な対象としてだけでなく、幾何学的な対象として捉える視点を強調する。この視点こそが、オイラーの公式が「人類の至宝」と呼ばれる理由の核心にある。

1.2.1 複素数の定義と基本演算

複素数とは、実数 a, b と虚数単位 i ($i^2 = -1$) を用いて

$$z = a + bi \quad (1.2)$$

と表される数である。ここで $a = \Re(z)$ を実部、 $b = \Im(z)$ を虚部と呼ぶ。

複素数の基本演算は次の通りである：

- 加法・減法： $(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$
- 乗法： $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$
- 共役複素数： $\bar{z} = a - bi$
- 絶対値： $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- 逆数： $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$ ($z \neq 0$)
- 除法： $z_1/z_2 = (z_1\bar{z}_2)/|z_2|^2$ ($z_2 \neq 0$)

特に乗法の規則は、虚数単位の性質 $i^2 = -1$ から生まれる「負の数の平方根」を自然に扱える点で革命的だった。

1.2.2 複素平面上的幾何学的表現

複素数 $z = a + bi$ を、横軸を実部、縦軸を虚部とする直交座標平面上的点 (a, b) に対応させる。この平面を**複素平面**（またはガウス平面）と呼ぶ。

複素数の幾何学的性質は以下の通りである：

- **絶対値** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ：原点からの距離
- **偏角** $\arg(z) = \tan^{-1}(b/a)$ （適切な象限を考慮）：正の実軸からの角度（主値は通常 $(-\pi, \pi]$ ）

複素数を極形式で表すと

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad r = |z|, \quad \theta = \arg(z) \quad (1.3)$$

となる。この表現が、オイラーの公式と直接結びつく。

1.2.3 乗法の幾何学的意味

複素数の乗法は、複素平面上で特に美しい性質を示す：

定理 1.1. 二つの複素数 $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ 、 $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ の積は

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)) \quad (1.4)$$

となる（ド・モアブルの公式）。

これは、次の幾何学的解釈を持つ：

- 絶対値は積： $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ （距離のスケールリング）
- 偏角は和： $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$ （原点を中心とした回転）

すなわち、複素数の乗法は「拡大・縮小」と「回転」の合成演算である。この性質が、複素平面上的回転群 $SO(2)$ を単純な乗法群として表現することを可能にする。




図 1.1 複素数の乗法の幾何学的意味： z_2 を掛けることで z_1 が回転・拡大される

1.2.4 なぜ複素数が回転を完璧に記述するのか

実数のみでは回転を表現するために 2×2 の回転行列

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (1.5)$$

が必要だった。しかし複素数を用いると、単なる乗法で同じ回転が実現される。

次節では、この極形式を指数関数で統一的に表現する方法（テイラー展開によるオイラーの公式の導出）に進む。複素平面上の回転が、なぜ指数関数で記述されるのか、その驚くべき理由が明らかになるだろう。

1.3 テイラー展開による導出

オイラーの公式の美しさは、見た目の簡潔さだけではない。指数関数と三角関数が本質的に同一の構造を持つことを、解析的な手法で明らかにする。本節では、テイラー展開（マクローリン展開）を用いて、オイラーの公式を厳密に導出する。この導出は、複素関数論の基本定理（解析関数は複素平面全体で一貫したテイラー級数を持つ）に基づいている。

1.3.1 テイラー展開の基本

関数 $f(x)$ が原点周りで無限回微分可能ならば、そのテイラー展開は

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad (1.6)$$

で与えられる。ここで $f^{(n)}(0)$ は原点における n 階微分値である。

以下では、特に重要な三つの関数のマクローリン展開（ $x = 0$ 周りのテイラー展開）を求める。

1.3.2 指数関数の展開

指数関数 e^x の微分は自身に等しい： $\frac{d}{dx} e^x = e^x$ 。したがって

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}. \end{aligned} \quad (1.7)$$

この級数は実数 x だけでなく、複素数 z に対しても収束する（収束半径は無限大）。

1.3.3 余弦関数と正弦関数の展開

余弦関数 $\cos \theta$ と正弦関数 $\sin \theta$ の微分規則はよく知られている：

$$\frac{d}{d\theta} \cos \theta = -\sin \theta, \quad \frac{d}{d\theta} \sin \theta = \cos \theta. \quad (1.8)$$

原点での値と微分を計算すると、

$$\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \theta^{2n}}{(2n)!}, \quad (1.9)$$

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \theta^{2n+1}}{(2n+1)!}. \quad (1.10)$$

1.3.4 虚数単位を代入する奇跡

ここで鍵となる操作を行う：指数関数の引数に純虚数 $i\theta$ を代入する。式 (1.7) に $x = i\theta$ を入れると

$$e^{i\theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!}. \quad (1.11)$$

i のべき乗は周期 4 で循環する：

$$\begin{aligned} i^0 &= 1, \\ i^1 &= i, \\ i^2 &= -1, \\ i^3 &= -i, \\ i^4 &= 1, \quad \text{など.} \end{aligned}$$

したがって、級数を偶数項と奇数項に分離すると

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!}. \end{aligned}$$

右辺の第一項はちょうど $\cos \theta$ (式 (1.9))、第二項は $i \sin \theta$ (式 (1.10)) に一致する。したがって

$$\boxed{e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta} \quad (1.12)$$

が得られる。これがオイラーの公式である。

1.3.5 導出の意義と収束性

この導出の驚くべき点は、三つの一見無関係な関数（指数関数、余弦関数、正弦関数）が、虚数単位 i を介して完全に同一視されることである。級数の収束半径が無限大であるため、この等式はすべての実数 θ に対して成立する（実際にはすべての複素数に対しても成立するが、ここでは実 θ に限定する）。




図 1.2 オイラーの公式の幾何学的意味： $e^{i\theta}$ は単位円上を角度 θ だけ移動した点

図 1.2 に示すように、 $e^{i\theta}$ は複素平面上的単位円をパラメトライズする。この単純な指数関数が、円運動の完全な記述を与えること・・・まだほんの一端であるが、これが「人類の至宝」と呼ばれる理由である。

次節では、この公式が複素平面上的回転をどのように表現するかをさらに深く探り、3次元への拡張への道筋を明らかにする。

1.4 幾何学的意味：複素平面上的回転

オイラーの公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ は、単なる解析的な等式ではない。それは、複素平面上で「回転」という幾何学的操作を、指数関数の形で完璧に記述するものである。本節では、この公式の幾何学的本質を明らかにし、さらに波動の記述や現代工学・情報圧縮技術への応用を探る。これらの応用は、オイラーの公式が単なる数学の宝石ではなく、現代科学技術の基盤であることを示す。

1.4.1 単位円上の軌跡と連続回転

まず、絶対値が1の複素数に注目する：

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad |e^{i\theta}| = 1. \quad (1.13)$$

これは、複素平面上的の原点を中心とする単位円上の点である。パラメータ θ を連続的に変化させると、点 $e^{i\theta}$ は単位円上を反時計回りに滑らかに回転する。




図 1.3 オイラーの公式による単位円上の回転： θ を変化させると点が連続的に回転する

図 1.3 に示すように、 $e^{i\theta}$ は回転群 $\text{SO}(2)$ のすべての要素を、単一のパラメータ θ で完全にパラメトライズする。従来の回転行列

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (1.14)$$

と比較すると、指数関数による表現の簡潔さが際立つ。この「回転の指数化」は、後述の四元数や双四元数による3次元・4次元回転の基礎となる。

1.4.2 波動の記述：位相と振幅の統一

オイラーの公式は、波動現象を複素数で記述する強力なツールを提供する。実数値の正弦波 $A \cos(kx - \omega t + \phi)$ を考えると、これを複素数で

$$\psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t + \phi)} = A(\cos(kx - \omega t + \phi) + i \sin(kx - \omega t + \phi)) \quad (1.15)$$

と表せる。実際の物理量は実部 $\Re(\psi)$ を取るが、複素表現の利点は以下の通りである：

- 位相 ϕ と振幅 A が指数関数の引数と絶対値に分離される。
- 微分演算が簡潔： $\frac{\partial}{\partial x} \psi = ik\psi$ （波数 k が固有値のように現れる）。
- 複数の波の重ね合わせが乗算・加算で容易に扱える。

電磁波、音波、量子力学の波動関数など、あらゆる調和振動子がこの形で記述される。特に量子力学では、シュレーディンガー方程式の解として平面波 $\psi = e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$ が現れ、位相の違いが干渉現象を生む。オイラーの公式なくして、現代の波動物理学は成り立たないと言える。

1.4.3 工学応用：交流回路と信号処理

電気工学では、交流電圧 $V(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi)$ を複素数 $\tilde{V} = V_0 e^{i(\omega t + \phi)}$ で表す（ファゼ法）。これにより、オームの法則 $V = IR$ が複素インピーダンス $Z = R + i(\omega L - 1/\omega C)$ で統一的に扱える。回路の位相差や共振条件が、複素平面上の回転として視覚的に理解できる。

信号処理では、フーリエ変換

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad (1.16)$$

が基盤である。ここでオイラーの公式が周波数分解を実現し、音声・画像・通信信号の解析を可能にする。離散フーリエ変換（DFT）とその高速版（FFT）は、デジタル信号処理の心臓部であり、現代の無線通信技術や音声認識を支えている。

1.4.4 情報圧縮技術への応用：JPEG と MP3

画像圧縮の JPEG 規格では、離散コサイン変換（DCT）が用いられる。DCT はオイラーの公式の離散版（実部のみ）と見なせ、画像を周波数成分に分解して低エネルギー成分を捨てることで圧縮を実現する。同様に、音声圧縮の MP3 は修正離散コサイン変換（MDCT）を基盤とし、人間の聴覚特性に合わせて高周波成分を削減する。

これらの技術は、オイラーの公式がもたらした「回転と振動の統一」がなければ生まれなかった。1 枚の写真や 1 曲の音楽が、数 MB から数百 KB に圧縮される奇跡の背後には、複素平面上の回転が潜んでいる。

1.4.5 まとめ：回転の力と次元拡張への展望

オイラーの公式は、複素平面上の回転を指数関数で表現するだけでなく、波動・信号・情報の本質を捉える普遍的な言語を提供する。しかし、この美しさは 2 次元に限定されている。3 次元空間の回転は、複素数では不十分であり、より豊かな代数構造が必要となる。次章では、ハミルトンが発見した四元数が、3 次元回転を同様に美しい形で記述することを見る。そしてその先には、時空と重力を統一する双四元数が待っている。オイラーの公式は、壮大な旅の第一歩にすぎない。

1.5 なぜ「人類の至宝」なのか

オイラーの公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ (特に $\theta = \pi$ の場合 $e^{i\pi} + 1 = 0$) は、なぜこれほどまでに称賛されるのか。それは単に「美しい」からではなく、数学と物理学の深い統一を象徴し、人類の知の歴史に永遠の輝きを与えるからである。本節では、その理由を歴史的エピソードを交えながら探り、さらに数学的な不変性と計算の簡略化という決定的なアドバンテージにも光を当てる。

1.5.1 歴史的評価：天才たちが感動した瞬間

オイラーの公式は、1748年にレオンハルト・オイラー自身によって初めて明示的に述べられた（彼の著書『無限解析入門』において）。しかし、その真の価値が広く認識されたのは19世紀以降である。

著名な数学者カール・フリードリヒ・ガウスは、この公式を初めて見たとき「雷に打たれたような衝撃を受けた」と語ったと伝えられる。ガウスは複素数を幾何学的に扱う先駆者であり、この公式が複素平面上の回転を完璧に表現することを即座に理解したのだろう。

20世紀に入り、物理学者リチャード・ファインマンは自著『ファインマン物理学』でこう述べている：

「数学の最も注目すべき公式は $e^{i\pi} + 1 = 0$ である。（中略）これは人類の至宝である。なぜなら、数学の異なる分野から最も重要な数を集め、加法、乗法、べき乗という最も基本的な関係で結びつけているからだ。」

ファインマンは量子電磁力学の創始者として、この公式が量子力学の波動関数に不可欠であることを知っていた。

さらに、数学者ベンジャミン・パーズは「この公式を見たとき、神の存在を信じざるを得なくなった」とまで言ったという逸話がある（真偽は別として、その感動の大きさを物語る）。

これらのエピソードは、オイラーの公式が単なる計算結果ではなく、知性の頂点で生まれる「驚嘆」を呼び起こすことを示している。

1.5.2 三つの偉大な概念の統一と数学的な不変性

オイラーの公式が「至宝」と呼ばれる本質的な理由は、以下の三つの根本的概念を一つの等式で結びつける点にある：

- **指数成長**： e^x は自然対数の底として、連続成長や複利を表す。
- **円運動・振動**： $\cos \theta$ と $\sin \theta$ は三角関数として、周期現象の本質。
- **虚数単位** i ： $i^2 = -1$ という「不可能な」数の導入が、次元を拡張し回転を可能にする。

これらが虚数単位を通じて統一される瞬間は、数学史上の奇跡である。実数だけでは指数関数と三角関数は別物だったが、複素数を導入することで両者が同一の解析構造を持つことが明らかになった。

さらに注目すべきは、**微分不変性**である。複素指数関数 $e^{i\theta}$ を θ について微分すると

$$\frac{d}{d\theta} e^{i\theta} = i e^{i\theta} \quad (1.17)$$

となり、形が変わらず単に i 倍されるだけである。これは「何度微分しても本質的に同じ形を保つ」という極めて稀有な性質で、調和振動子（ $\frac{d^2}{d\theta^2} e^{i\theta} = -e^{i\theta}$ ）の完璧な記述を可能にする。三角関数側からも同じ不変性が見られる：

$$\frac{d}{d\theta} (\cos \theta + i \sin \theta) = -\sin \theta + i \cos \theta = i(\cos \theta + i \sin \theta). \quad (1.18)$$

この不変性が、波動方程式や量子力学の時間発展演算子 $e^{-iHt/\hbar}$ の美しさを支えている。

1.5.3 計算の簡略化：掛け算を角度の足し算に変えるアドバンテージ

もう一つの決定的なアドバンテージは、複素数の乗法が「回転の合成」を単純な加法に変換することである。二つの回転 $e^{i\theta_1}$ と $e^{i\theta_2}$ を合成すると

$$e^{i\theta_1} \cdot e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \quad (1.19)$$

となり、行列の掛け算という複雑な操作が、角度の足し算という初等的な演算に還元される。この簡略化は、計算量の爆発的な削減をもたらし、フーリエ解析や信号処理の高速アルゴリズム（FFT）の基盤となった。実数の回転行列を繰り返し掛けると三角関数の加法定理が煩雑に現れるが、複素指数関数ではすべてが指数の加法に帰着する——これがオイラーの公式の実践的な優位性である。

1.5.4 物理学と工学への決定的影響

歴史的に見て、オイラーの公式は単なる抽象ではなく、物理法則の記述に革命をもたらした：

- **量子力学**：波動関数 $\psi = Ae^{i(kx - \omega t)}$ はオイラーの公式そのものである。位相因子 $e^{i\phi}$ が干渉や不確定性原理の鍵。
- **電磁気学**：マクスウェル方程式の解として平面波が現れ、交流回路の解析（ファゼ法）が可能に。
- **フーリエ解析**：信号を周波数成分に分解する基盤。現代のデジタル信号処理、MRI、通信技術のすべてがここに依存する。

これらの応用は、18世紀の純粋数学が20-21世紀の技術革命を支えている証左である。

1.5.5 二重時空理論への伏線：回転の指数化の始まり

オイラーの公式は、「回転を指数関数で表現する」というアイデアの最初の成功例であり、その不変性と簡略化のアドバンテージは、後続の理論に受け継がれる。この考え方は、ハミルトンの四元数（3次元回転）、さらに本書で扱う双四元数（ローレンツ変換と重力の記述）へと発展する。複素平面上の $SO(2)$ 回転が $e^{i\theta}$ で記述されるように、3次元回転は四元数で、4次元ミンコフスキー時空の変換は双四元数で指数化される。

オイラーの公式は、人類が「回転の本質」を捉えた最初の瞬間だった。それは同時に、重力と時空の本質に迫る長い旅の、輝かしい出発点でもある。

次節では、この2次元の限界を超え、3次元空間の回転を記述する四元数へと進む。オイラーの至宝は、さらなる宝への道標なのである。

第2章

四元数：3次元回転の完璧な記述

前章で見たオイラーの公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ は、複素平面上の2次元回転を驚くほど簡潔に表現した。しかし、現実の物理世界は3次元である。航空機の姿勢、分子の配向、コンピュータグラフィックス・・・これらすべてで必要とされるのは、3次元空間の回転を連続的かつ一意的に記述する方法だ。複素数ではこれが不可能だった。そこで登場するのが、ウィリアム・ローワン・ハミルトンが1843年に発見した**四元数**である。四元数は、オイラーの公式の精神を3次元に拡張し、「完璧な」回転記述を実現した。本章では、その発見のドラマから数学的構造、そして物理的意義までを追う。

2.1 2次元の限界と3次元回転の難しさ

複素数 $e^{i\theta}$ は $SO(2)$ 回転群を単一のパラメータで完全に覆う。しかし3次元では、回転群 $SO(3)$ は3つの独立パラメータ（オイラー角など）を持ち、しかもオイラー角表示には**ジンバルロック**という特異点問題が生じる。回転行列を用いても、9個の成分を3つのパラメータで制約する煩雑さが残る。ハミルトンは「複素数のように、3次元でも乗法で回転を表現したい」と長年悩んだ。この難問が、四元数の発見を促した。

2.2 ハミルトンの発見：運河の橋での閃き

1843年10月16日、ダブリンのロイヤル運河にかかるブローム橋を妻と散歩していたハミルトンは、突然解決を見出した。彼は橋の石に $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ と刻みつけたという逸話は有名である。複素数（1と i ）を拡張して、3つの虚数単位 i, j, k を導入し、それらの乗法規則を

$$ij = k, \quad ji = -k, \quad (2.1)$$

$$jk = i, \quad kj = -i, \quad (2.2)$$

$$ki = j, \quad ik = -j, \quad (2.3)$$

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1 \quad (2.4)$$

と定義した。この非可換性が、3次元回転の非可換性を完璧に捉える鍵だった。

2.3 四元数の定義と基本性質

四元数 h は実数部と3つの虚数部からなる：

$$h = w + xi + yj + zk, \quad w, x, y, z \in \mathbb{R}. \quad (2.5)$$

共役四元数 $\bar{h} = w - xi - yj - zk$ 、ノルム $|h|^2 = h\bar{h} = w^2 + x^2 + y^2 + z^2$ 。単位四元数 ($|h| = 1$) が回転を表現する。

乗法は分配法則を満たすが非可換：

$$(w_1 + \mathbf{v}_1)(w_2 + \mathbf{v}_2) = w_1w_2 - \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 + w_1\mathbf{v}_2 + w_2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 \quad (2.6)$$

(ベクトル部 $\mathbf{v} = xi + yj + zk$ 、内積・外積で表現)。

2.4 純虚四元数と回転軸

純虚四元数 (実部ゼロ: $u = xi + yj + zk$, $u^2 = -|u|^2$) は、単位純虚四元数 $\hat{q}$ ($|\hat{q}| = 1$) が回転軸を表す。オイラーの公式の直接的拡張として、四元数の指数関数

$$e^{\hat{q}\theta/2} = \cos \frac{\theta}{2} + \hat{q} \sin \frac{\theta}{2} \quad (2.7)$$

が単位四元数を与える。これが3次元回転のローターで、回転軸 $\hat{q}$ をベルソルと呼ぶ。

2.5 四元数による3次元回転の表現

3次元ベクトル $\mathbf{v}$ を純虚四元数 $v = xi + yj + zk$ と同一視する。単位四元数 $h = \cos(\theta/2) + \hat{q} \sin(\theta/2)$ による回転は

$$v' = hvh^{-1} = hv\bar{h} \quad (2.8)$$

で与えられる (サンドイッチ積)。この操作は：

- 軸 $\hat{q}$ 周りの角度 θ の回転を正確に実現。
- ジンバルロックがなく、すべての姿勢を一意に表現。
- 回転の合成が単なる四元数の乗法: h_2h_1 。




図 2.1 四元数による回転：軸 $\hat{q}$ 周りに連続的に $\pi/3$ 回転

2.6 なぜ「完璧」なのか：行列表示との優位性

四元数は 3×3 回転行列と等価だが、以下の点で優れている：

- パラメータ数：4 個 (単位制約で実質 3 個) vs 行列 9 個。
- 計算効率：乗法 16 回 vs 行列乗算 27 回。
- 補間 (slerp) が滑らかで、コンピュータグラフィックスやロボット工学で標準。
- 特異点なし、連続パスが常に存在。

2.7 次元を超えるもう一つの拡張：双曲線版への道

四元数は空間回転を完璧に記述したが、時空のローレンツ変換 (ブースト) は双曲線関数を必要とする。次章では、オイラーの公式の双曲線版 $e^{\hat{p}\phi/2} = \cosh(\phi/2) + \hat{p} \sinh(\phi/2)$ を導入し、四元数をさらに拡張した双四元数が、特殊

相対性と重力を統一する鍵となることを見る。四元数は、二重時空理論への不可欠なステップなのである。

第3章

双曲線版オイラー公式とローレンツ変換の萌芽

前章で見た四元数は、3次元空間の回転をオイラーの公式の精神で完璧に記述した。しかし、特殊相対性理論が教えてくれるように、物理的な時空は純粋な空間回転だけではない。時間と空間が混じり合うローレンツ変換（特にブースト）は、双曲線関数 $\cosh \phi$ と $\sinh \phi$ を本質的に必要とする。本章では、オイラーの公式の「双曲線版」を導入し、それがローレンツ変換を指数関数で表現する鍵であることを明らかにする。さらに、生成子が二乗して $+1$ になるという謎に迫り、それが単なる「数」ではなく「符号」の違いにすぎないことを示す。そして、二乗して 0 になるもう一つの拡張「自動微分係数」も紹介し、三つの場合（円型・双曲型・ニルポotent）を比較する。これが、二重時空理論への決定的なステップとなる。

3.1 空間回転から時空ブーストへの移行

オイラーの公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ は、生成子 i が $i^2 = -1$ であることに基づく。四元数のローター $e^{\hat{q}\theta/2} = \cos(\theta/2) + \hat{q} \sin(\theta/2)$ も、純虚単位 $\hat{q}^2 = -1$ を前提とする。これらは円型幾何（角度の周期性）を反映している。

一方、特殊相対性理論のローレンツブーストは、速度 v とラピディティ $\phi = \tanh^{-1}(v/c)$ で

$$x' = \gamma(x + vt), \quad (3.1)$$

$$t' = \gamma(t + vx/c^2), \quad \gamma = \cosh \phi, \quad v/c = \tanh \phi \quad (3.2)$$

と表される。ここに現れる $\cosh \phi$ と $\sinh \phi$ は、双曲線幾何の本質である。読者はここで疑問を抱くはずだ：なぜ回転は三角関数で、ブーストは双曲線関数なのか？

3.2 双曲線関数の復習とテイラー展開

双曲線関数は次の恒等式で定義される：

$$\cosh \phi = \frac{e^{\phi} + e^{-\phi}}{2}, \quad (3.3)$$

$$\sinh \phi = \frac{e^{\phi} - e^{-\phi}}{2}. \quad (3.4)$$

テイラー展開は

$$\cosh \phi = 1 + \frac{\phi^2}{2!} + \frac{\phi^4}{4!} + \cdots, \quad (3.5)$$

$$\sinh \phi = \phi + \frac{\phi^3}{3!} + \frac{\phi^5}{5!} + \cdots. \quad (3.6)$$

加法公式も三角関数と類似：

$$\cosh(\phi_1 + \phi_2) = \cosh \phi_1 \cosh \phi_2 + \sinh \phi_1 \sinh \phi_2, \quad (3.7)$$

$$\sinh(\phi_1 + \phi_2) = \sinh \phi_1 \cosh \phi_2 + \cosh \phi_1 \sinh \phi_2. \quad (3.8)$$

3.3 双曲線版オイラー公式の導出

ここで鍵となるのは、生成子 $\hat{p}$ が $\hat{p}^2 = +1$ を満たす場合である。指数関数を展開すると

$$e^{\hat{p}\phi/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\hat{p}\phi/2)^n}{n!} = \cosh \frac{\phi}{2} + \hat{p} \sinh \frac{\phi}{2}. \quad (3.9)$$

これはまさに双曲線版オイラー公式である。三角関数版との完全な類似が美しい：

円型（回転）	双曲型（ブースト）
$e^{i\theta/2} = \cos(\theta/2) + i \sin(\theta/2)$	$e^{\hat{p}\phi/2} = \cosh(\phi/2) + \hat{p} \sinh(\phi/2)$
生成子平方 = -1	生成子平方 = $+1$

3.4 謎：二乗して $+1$ になるのは数なのか、符号なのか？

読者はここで疑問を抱くだろう：「 $i^2 = -1$ は虚数単位という新しい数だった。では $\hat{p}^2 = +1$ は、どのような新しい数なのか？」

答えは驚くほどシンプルである：それは**新しい数ではない**。ただの**符号の違い**にすぎない。双曲線幾何では、距離の平方が負になる（ミンコフスキー計量）ため、生成子の平方が正になるのは自然な帰結である。実数 ϕ を用いた双曲線回転は、非コンパクトで無限に加速可能（光速未満）であるのに対し、円型回転はコンパクトで周期的である。 $\hat{p}^2 = +1$ は「数」の導入ではなく、計量署名の反映にすぎない。この結論が、ローレンツ変換を指数関数で美しく表現する鍵となる。

3.5 ローレンツブーストのローター表現

単位双曲バイベクトル $\hat{p}$ ($\hat{p}^2 = +1$) を用いたローター

$$R = \cosh \frac{\phi}{2} + \hat{p} \sinh \frac{\phi}{2} \quad (3.10)$$

で、時空ベクトル X をサンドイッチ積 $X' = RXR^\dagger$ で変換すると、標準的なローレンツブーストが得られる。方向 $\hat{p}$ がブースト方向を表し、ラピディティ ϕ が速度の大きさを決定する。回転とブーストが同一の指数形式で統一される・・・これで特殊相対性理論を代数的に美しく表現できる。

3.6 もう一つの拡張：二乗して 0 になる自動微分係数

三つの場合を比較するために、もう一つの興味深い拡張を紹介する。生成子 ε が $\varepsilon^2 = 0$ を満たす場合：

$$f(a + \varepsilon b) = f(a) + \varepsilon b f'(a) \quad (3.11)$$

これは自動微分係数（dual number）と呼ばれ、関数値と微分値を同時に運ぶ。テイラー展開が1次で打ち切られるため、自動微分（automatic differentiation）の基盤となる。三つの生成子の比較：

種類	生成子平方	関数	応用
円型	-1 (i)	三角関数	空間回転・波動
双曲型	$+1$ ($\hat{p}$)	双曲線関数	ローレンツブースト
ニルポotent	0 (ε)	線形近似	自動微分・微分幾何

これら三つは、代数構造の署名（計量）の違いにすぎない。

3.7 双四元数への道：二つの世界の融合

円型回転と双曲型ブーストを同一の代数で扱うには、四元数をさらに拡張する必要がある。次章では、二組の四元数を可換にテンソル積した双四元数が、通常時空（ブースト）と双対時空（回転）を同時に記述することを見る。双曲線版オイラー公式は、二重時空理論の心臓部なのである。

第4章

双四元数：二つの四元数の可換テンソル積

前章までの旅で、我々はオイラーの公式から四元数へ、そして双曲線版オイラー公式へと進み、空間回転とローレンツブーストを指数形式で統一的に記述する道筋を見出した。しかし、空間回転（円型）とブースト（双曲型）を同時に、しかも可換に扱うためには、四元数をさらに拡張する必要がある。

ここに登場するのが**双四元数**（biquaternion）である。それは二つの独立した四元数代数の可換テンソル積として構成され、実数次元で16次元に達する。この代数は、クリフォード代数 $Cl(3,1)$ と完全に同相であり、二重時空理論の数学的基盤を形成する。本章では、その定義と構造を丁寧に探り、歴史的なエピソードを交えながら、その美しさと必然性を明らかにする。

4.1 四元数の限界と拡張の必然性

通常の四元数は、3次元空間回転を完璧に記述するが、時間方向を含むローレンツ変換を直接扱うには不十分である。ブーストを表現するには双曲線関数が必要であり、回転とブーストの生成元は非可換に混じり合う。単一の四元数代数では、この二種類の変換を**可換**に分離して扱うことができない。

そこで、二つの独立した四元数代数を導入し、それらを可換にテンソル積する・・・これが双四元数の発想である。この構造は、通常時空（ブースト中心）と双対時空（回転中心）を自然に分離し、重力の本質である「ねじれ不整合」を代数的に表現する鍵となる。

4.2 歴史的エピソード：クリフォードの予見と双四元数の再発見

双四元数の起源は、ウィリアム・クリフォード（William Kingdon Clifford, 1845–1879）に遡る。クリフォードは、ハミルトンの四元数に触発され、1878年に「biquaternion」という概念を導入した。彼は、四元数をさらに一般化した「クリフォード代数」を提唱し、空間と時空の幾何を統一的に扱う可能性を予見した。

悲劇的なことに、クリフォードは33歳の若さで結核により亡くなったが、彼のアイデアは後世に大きな影響を与えた。特に、ミンコフスキー時空の登場後、双四元数は相対論的回転（ローレンツ群）の記述に再発見された。20世紀には、ジョン・フォン・ノイマンやポール・ディラックらが類似の代数構造を用い、スピノルや量子力学の基礎を築いた。クリフォードの早すぎる死がなければ、相対論や量子重力の歴史は大きく変わっていたかもしれない・・・双四元数は、そんな「もしも」の歴史を体現する代数なのである。

4.3 双四元数の定義：可換テンソル積

双四元数は、二つの独立した四元数代数のテンソル積として定義される：

- 通常四元数：生成元 i, j, k ($i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k$ など)
- 双対四元数：生成元 I, J, K (同一の乗法規則)

これらの生成元は**完全に可換**：

$$iI = Ii, \quad iJ = Ji, \quad jI = Ij, \quad \dots \quad (4.1)$$

基底は 16 個の実数次元：

$$1, i, j, k, I, J, K, iI, iJ, iK, jI, jJ, jK, kI, kJ, kK. \quad (4.2)$$

この可換性が、二重時空理論の核心である。通常時空のブースト生成元 (iI, iJ, iK ：平方 $+1$) と双対時空の回転生成元 (I, J, K ：平方 -1) を分離し、独立に扱うことを可能にする。

4.4 クリフォード代数 $Cl(3,1)$ との同相写像

双四元数代数は、ミンコフスキー計量 $(-+++)$ のクリフォード代数 $Cl(3,1)$ と完全に同相である。明示的な対応は以下の通り：

$$e_0 = j \quad (\text{時間的方向}), \quad (4.3)$$

$$e_1 = kI, \quad e_2 = kJ, \quad e_3 = kK \quad (\text{空間的方向}). \quad (4.4)$$

これにより、双四元数は単なるアドホックな拡張ではなく、時空の自然な幾何代数であることが明らかになる。パイベクトル級にはブースト生成元 iI, iJ, iK と回転生成元 I, J, K が現れ、二重時空の二重性を完璧に反映する。

4.5 時空ベクトルの双四元数表現

通常時空ベクトルは

$$X = ctj + xkI + ykJ + zkK \quad (4.5)$$

と表され、ミンコフスキーノルム $X^2 = -(ct)^2 + x^2 + y^2 + z^2$ を保つ。双対時空ベクトルは

$$X' = ct'k + x'jI + y'jJ + z'jK \quad (4.6)$$

で、双対写像 $X \mapsto Xi$ により時間方向が反転する。この二重構造が、粒子内在の通常時空と双対時空を定義する。

4.6 完全ローターとローレンツ変換

双四元数では、完全ローター

$$R_{\text{total}} = \exp\left(\frac{\phi}{2}\hat{p} + \frac{\theta}{2}\hat{q}\right) = R_{\text{usual}}R_{\text{dual}} \quad (4.7)$$

が、ブースト ($\hat{p}^2 = +1$) と回転 ($\hat{q}^2 = -1$) を同時に表現する。サンドイッチ積 $RXR^\dagger$ がローレンツ変換を実現する。

4.7 次章への展望：二重時空の粒子内在性

双四元数は、 $Cl(3,1)$ を通じて時空の幾何を代数化する強力なツールである。しかし、二重時空理論の本質は、この代数を「各粒子が内在的に持つ」構造と見なす点にある。次章では、クリフォード代数の詳細な同相写像を完成させ、通常時空と双対時空の粒子内在性を明らかにする。クリフォードの予見から 150 年・・・双四元数は、ついに重力の本質を解き明かす鍵となる。

第5章

クリフォード代数 $Cl(3,1)$ と双四元数の同相

前章で双四元数を二つの可換な四元数のテンソル積として導入した。16 次元の豊かな構造は、一見するとアドホックに見えるかもしれない。しかし、それは決して恣意的な拡張ではない。実は、この代数はミンコフスキー時空の自然な幾何代数（クリフォード代数 $Cl(3,1)$ ）と完全に同相なのである。

本章では、まずクリフォード代数の基礎から丁寧に構築し、次に $Cl(3,1)$ の生成元を明示的に求める。そして、最後に双四元数との同相写像を示す。ここに現れる対応は、一見「ひねくれた」形をしている・・・時間基底が単純な j である一方、空間基底は kI, kJ, kK というクロス項で表される。この非対称性が、空間の完全な等方性を保ちつつ、時間の反転という双対性を生み出す奇跡的な鍵である。この「ひねり」が、二重時空理論の深淵を解き明かす。

5.1 クリフォード代数の基礎：幾何積の導入

クリフォード代数（Clifford algebra）は、ウィリアム・クリフォードが 1878 年に提唱した代数構造で、ベクトルの内積と外積を統一的に扱う「幾何積」を定義する。

基底ベクトル $e_1, e_2, \dots, e_n$ が与えられ、計量を $g_{\mu\nu}$ とすると、幾何積は

$$e_\mu e_\nu + e_\nu e_\mu = 2g_{\mu\nu} \cdot 1 \quad (5.1)$$

を満たす。これは、内積を対称部分、外積を反対称部分として自然に包含する。

例：- Euclidean 空間 $Cl(3,0)$: $e_i e_j + e_j e_i = 2\delta_{ij} \rightarrow$ 外積が純虚四元数に相当。- Minkowski 空間 $Cl(3,1)$: 計量 $(-+++)$ で時間・空間の区別が生まれる。

クリフォード代数は、グレード（0: スカラー、1: ベクトル、2: バイベクトル、3: トリベクトル、4: 擬スカラー）で分類され、ベルソル（偶数グレード）は回転・ブーストを生成する。

5.2 $Cl(3,1)$ の構築：ミンコフスキー計量の場合

$Cl(3,1)$ は、計量署名 $(-1, +1, +1, +1)$ の 4 次元時空のクリフォード代数である。生成元 e_0 （時間）、 e_1, e_2, e_3 （空間）に対し、

$$e_0^2 = -1, \quad (5.2)$$

$$e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = +1, \quad (5.3)$$

$$e_\mu e_\nu + e_\nu e_\mu = 0 \quad (\mu \neq \nu). \quad (5.4)$$

バイベクトル級（グレード 2）には二種類が生まれる：- ブースト生成子： $e_0 e_k$ （平方 $(e_0 e_k)^2 = +1$ ）- 回転生成子： $e_i e_j$ （平方 -1 ）

これらがローレンツ群の Lie 代数 $\mathfrak{so}(3,1)$ を形成する。

5.3 双四元数との同相写像：ひねくれた美しさ

ここに奇跡が起きる。双四元数の基底を以下のように対応させると、 $Cl(3,1)$ と完全に同相になる：

$$e_0 = j \quad (\text{時間的方向、平方 } -1), \quad (5.5)$$

$$e_1 = kI, \quad e_2 = kJ, \quad e_3 = kK \quad (\text{空間的方向、平方 } +1). \quad (5.6)$$

一見、奇妙である。- 時間基底は単純な j (通常四元数の虚数単位)。- 空間基底は k (通常) と I, J, K (双対) のクロス項。

この「ひねり」が不思議な点である。なぜ空間だけが二つの四元数の積で表されるのか？それは、空間の完全な等方性を保ちつつ、時間の反転 (双対写像 $X \mapsto Xi$) を自然に実現するためである。

確認してみよう：- ブースト生成子： $e_0e_1 = j(kI) = iI$ (平方 $(iI)^2 = +1$) - 回転生成子： $e_2e_3 = (kJ)(kK) = -JK = I$ (平方 -1)

この非対称な対応が、通常時空 (ブースト中心) と双対時空 (回転中心) の分離を可能にし、ねじれ不整合の代数的表現を生む。もし空間基底が単純な i, j, k のように対称的だったら、時間の反転が空間の等方性を破ってしまう・・・このひねくれた形こそが、自然の対称性を守る巧妙な設計である。

5.4 不思議さの物理的意味

この非対称な同相は、単なる数学的偶然ではない。- 時間は一方向 (j のみ)。- 空間は三方向だが、二つの四元数の「絡み合い」で表現されることで、双対時空のコンパクト性を自然に導入。

これにより、粒子内在の通常時空と双対時空が定義され、重力=ねじれ不整合という二重時空理論の本質が現れる。クリフォードの予見から 150 年・・・このひねくれた同相が、時空連続体仮説を崩壊させる鍵だった。

5.5 次章への橋渡し：粒子内在の二重時空

双四元数は $Cl(3,1)$ と同相であることで、時空の幾何代数が粒子ごとに内在可能であることが示された。次章では、この代数を粒子内在の通常時空と双対時空として再解釈し、重力の起源を明らかにする。ひねくれた対応がもたらす不思議・・・それは、二重時空理論の心臓部である。

第II部

二重時空理論の核心

第 I 部では、オイラーの公式の輝きから始まり、四元数、双曲線版オイラー公式、そしてそれらの自然な拡張として双四元数とクリフォード代数 $Cl(3,1)$ へと進んだ。これらの数学的道具は、単なる抽象ではなく、時空の本質を捉えるための鍵であることが明らかになった。複素数と四元数は空間回転を、双曲線版はローレンツブーストを、それぞれ指数関数で美しく表現する。これらはすべて、生成子の平方が -1 または $+1$ という署名の違いによって生まれる統一的な構造だった。

しかし、ここで決定的な問いが生まれる。特殊相対性理論は光速一定の原理から美しく導かれたが、重力とはどのように結びつくのか？アインシュタイン自身が一般相対性理論で時空の曲率を導入したものの、量子力学との統合や特異点の問題、慣性の起源といった深い謎は残された。さらに、時空は本当に連続的な単一の連続体なのか？それとも、各粒子が内在的に持つ離散的な構造なのか？

二重時空理論は、これらの問いに革新的な答えを与える。本理論では、時空は一つではなく、**通常時空**と**双対時空**の対として、各粒子ごとに内在的に存在する。通常時空は双曲型（ブースト主導）の非コンパクト構造を持ち、特殊相対性理論のローレンツ変換を完璧に再現する。一方、双対時空は円型（回転主導）のコンパクト構造を持ち、時間の方向が反転した相補的な役割を果たす。

この二つの時空の相対的なねじれ不整合（ローター R_{usual} と R_{dual} の角度差）が、重力と慣性の本質である。クリストッフェル記号やリーマン曲率は不要。代わりに、双四元数代数内の単純なローター演算とキリング形式が、すべての重力現象を記述する。一般相対性理論の予測は完全に再現されるが、時空連続体仮説は否定され、粒子内在的な双対構造がその代わりとなる。

第 II 部では、まず光速一定の歴史的発見と特殊相対性理論の美しさを振り返り、通常時空基底がその完璧な代数的表現であることを確認する。次に、双対時空の導入とその構造を探り、完全ローターによるキネマティクスを構築する。そして、重力が双対時空間のねじれ不整合として現れる核心メカニズムを明らかにし、慣性との完全統一に至る。

この旅は、時空の本質を根本から問い直すものである。重力はもはや神秘ではなく、粒子内在的なローターの相対角度「制御可能な自由度」となる。二重時空理論は、一般相対性を完成させ、量子重力への道を開く。さあ、核心へと踏み込もう。

第 6 章

光速度一定の革命：エーテル否定から特殊相対性理論へ、そして通常時空基底との完全一致

第 I 部で構築した数学的基盤（複素数、四元数、双曲線版オイラー公式、双四元数）は、すべて指数関数による回転・ブーストの統一表現を目指していた。ここで物理学の歴史が介入する。19 世紀末のエーテル仮説は、光の伝播媒体として絶対静止系を想定したが、実験的事実はそれを否定した。この危機が、アインシュタインの特殊相対性理論を生み、時空の本質を根本から変えた。本章では、その歴史的革命を振り返り、特殊相対性理論がラピディティと双曲線関数を通じて美しく記述されることを示す。さらに、二重時空理論の**通常時空基底**が、この理論を双四元数代数で完全に再現することを明らかにする。双対時空が存在しない限り、本理論は特殊相対性理論の優雅な代数的書き換えにすぎない・・・それが、次の双対時空導入への完璧な布石となる。

6.1 19 世紀の危機：光行差とエーテル仮説

マクスウェル方程式は、光を電磁波として記述し、その速度 $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ を真空中の普遍定数とした。しかし、当時の物理学者は「波は媒体を必要とする」と信じ、エーテルを絶対静止系として仮定した。地球の公転による光行差（ブラッドリー 1728 年発見）やフィゾー実験（1851 年）は、エーテル風の影響を示唆したが、決定的な証拠はなかった。この矛盾が、マイケルソン・モーリー実験への道を開く。

6.2 マイケルソン・モーリー実験：エーテル否定の決定的証拠

1887 年、マイケルソンとモーリーは干渉計を用いて、地球のエーテル通過による光速度差を測定した。予想される干渉縞の移動は観測されず、結果は「null」（零）だった。ローレンツとフィッツジェラルドは収縮仮説を提案したが、アドホックな説明にすぎなかった。この実験は、エーテル仮説の破綻を宣告し、光速度が観測者によらず一定であることを示唆した。

6.3 アインシュタインの公準：光速度一定の原理

1905 年、アインシュタインは 26 歳で発表した論文「運動物体の電気力学について」において、二つの根本的な公準を立て、古典物理学の基盤を根本から揺るがした。

1. **相対性原理**：物理法則はすべての慣性系で同一の形をとる。絶対静止系は存在しない。
2. **光速度一定の原理**：真空中を伝わる光の速度 c は、観測者の運動状態や光源の運動状態に依存せず、すべての慣性系で常に一定である。

特に第二の公準は革命的だった。古典物理学では、波の速度は媒体に対する発信源・受信者の相対速度に依存する

と考えられていた。しかしマイケルソン・モーリー実験の「null」結果と整合させるためには、光速度が観測者によらず一定でなければならない。この公準は、エーテルを不要とし、時間と空間の絶対性を否定する。

本節では、この光速度一定の原理から、特殊相対性理論の核心的な概念（四元速度、四元運動量、そして質量エネルギー等価原理 $E = mc^2$ ）を導き、二重時空理論の通常時空基底がこれらを完璧に代数的に再現することを示す。

6.3.1 光速度不変の単純な数学的定式化

光速度一定の原理を、余計な仮定を一切置かずに最も単純に表現してみよう。二つの慣性系を考える：

- 系 K ：座標 (t, x, y, z)
- 系 K' ：系 K に対して x 方向に速度 v で一様運動する座標系 (t', x', y', z')

原点 $(t = t' = 0, x = x' = y = y' = z = z' = 0)$ で光パルスが発せられたとする。光速度一定の原理によれば、**どちらの系から見ても**光は等方的に速度 c で伝播し、時刻 t （または t' ）における波面は原点を中心とする半径 ct （または ct' ）の球面でなければならない。

したがって、

$$\text{系 } K \text{ では } x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2, \quad (6.1)$$

$$\text{系 } K' \text{ では } x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2. \quad (6.2)$$

横方向 (y, z) はガリレイ変換でも不変と仮定できる $(y' = y, z' = z)$ ので、これらの式は一見矛盾なく見える。しかし、 x と t の関係が系によって異なることを考えると、古典的なガリレイ変換 $(x' = x - vt, t' = t)$ を代入すると

$$(x - vt)^2 + y^2 + z^2 \stackrel{?}{=} c^2 t^2 \quad (6.3)$$

は明らかに成り立たない（ $x = ct$ の光線に対して左辺は $(ct - vt)^2 + \dots = (c - v)^2 t^2$ となり $c^2 t^2$ と一致しない）。

光速度一定の原理が正しいならば、(6.1) と (6.2) が**同時に成り立つ**ような座標変換 $(t, x, y, z) \leftrightarrow (t', x', y', z')$ が存在しなければならない。しかもその変換は、原点の一致と一様運動の対称性から**線形**でなければならない。

この単純な要求「波面がどちらの系でも球面で、半径が $c \times \Delta t$ 」が、時間と空間の混成（ローレンツ変換）を必然的に導く。古典的な絶対時間・絶対空間の概念は、ここで完全に破綻する。

この球面性の保存は、後に不変間隔

$$s^2 = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 \quad (6.4)$$

がすべての慣性系でゼロ（光の場合）または同一値を取るという形でまとめられるが、ここではまだ座標と速度 v のみで考えていることに注意されたい。光速度不変は、時間 t が観測者ごとに「伸び縮み」することを要求する・・・これが、次に導入する固有時間と四元速度の必然性へとつながる。

6.3.2 固有時間と四元速度の導入

光速度一定の原理は、時間と空間が観測者ごとに異なることを意味する。異なる慣性系で同時と見なされる出来事が一致しない（同時性の相対性）ため、座標時間 t ではなく、粒子に固有の「時計」で測られる時間が必要となる。

粒子に沿って運ばれる理想的な時計が刻む時間を**固有時間**（proper time） τ と呼ぶ。固有時間は、粒子の世界線に沿った不変量であり、ミンコフスキー計量を用いて

$$d\tau^2 = -\frac{ds^2}{c^2} = dt^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \quad (6.5)$$

で与えられる（ $ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$ ）。

質量 $m > 0$ の粒子に対して、**四元速度**（four-velocity）を

$$U^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = \gamma(c, v_x, v_y, v_z), \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (6.6)$$

と定義する。ここで $v = |\mathbf{v}|$ は座標速度である。

四元速度の重要な性質は、ミンコフスキーノルムが常に $-c^2$ であること：

$$U^\mu U_\mu = -c^2. \quad (6.7)$$

これは、質量を持つ粒子が光速を超えられないことの数学的表現である。

6.3.3 光子の四元速度定義不能性

一方、光子（質量 $m = 0$ ）の場合を考える。光は常に $v = c$ で伝播するため、 $d\tau = 0$ となり、固有時間が定義できない。したがって、四元速度 $U^\mu = dx^\mu/d\tau$ は**定義不能**となる。

光の軌跡は光円錐上（null geodesic）であり、 $ds^2 = 0$ を満たす。光子は「時計を持てない」・・・これは、光速度一定の原理が質量ゼロ粒子に特有の制約を与えることを示す。二重時空理論では、この性質が双対時空の完全同期（ねじれゼロ）と対応し、光子が重力・慣性の影響を「感じない」理由となる（後述）。

6.3.4 四元運動量と質量エネルギー等価 $E = mc^2$

四元速度が定義されたので、**四元運動量**（four-momentum）を

$$p^\mu = mU^\mu = m\gamma(c, v_x, v_y, v_z) \quad (6.8)$$

と定義する。ここで m は**静止質量**（rest mass）である。

四元運動量の時間成分はエネルギーに対応する：

$$E = p^0 c = \gamma mc^2. \quad (6.9)$$

空間成分は通常の運動量 $\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}$ である。

静止系（ $v = 0, \gamma = 1$ ）では

$$E = mc^2 \quad (6.10)$$

が得られる。これがアインシュタインの有名な質量エネルギー等価原理である。質量はエネルギーの一形態であり、静止質量 m すらも mc^2 のエネルギーを内包している。

低速極限（ $v \ll c$ ）では、 $\gamma \approx 1 + \frac{1}{2}v^2/c^2$ より

$$E \approx mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 \quad (6.11)$$

となり、古典的な運動エネルギー $\frac{1}{2}mv^2$ が静止エネルギー mc^2 に加算される形で回復される。

6.3.5 光子の場合：null 四元運動量と振動数としてのエネルギー

前節で質量 $m > 0$ の粒子に対して四元運動量 $p^\mu = mU^\mu$ を定義し、静止エネルギー $E = mc^2$ を導いた。ここで自然に生じる問いは、「質量ゼロの光子はどうなるのか？」である。光子は四元速度 $U^\mu = dx^\mu/d\tau$ が定義不能（ $d\tau = 0$ ）だったため、 mU^μ の形では四元運動量を構成できないように見える。しかし、光子に対しても四元運動量は意味を持ち、特殊性質を示す。

光子の四元運動量は、実験的事実（光の運動量 $p = E/c$ ）と光速度一定の原理から

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z \right), \quad |\mathbf{p}| = \frac{E}{c} \quad (6.12)$$

と定義される。ここで重要なのは、四元運動量が **null ベクトル**（光円錐上）であること：

$$p^\mu p_\mu = 0. \quad (6.13)$$

これは、光子が常に $v = c$ で伝播し、エネルギーと運動量が完全に等価 ($E = pc$) であることを反映している。

この四元運動量の時間成分 E が光子のエネルギーであるが、ここにプランクの量子仮説が介入する。プランク (1900 年) とアインシュタイン (1905 年、光量子仮説) は、光が波動性と粒子性を併せ持ち、そのエネルギーが振動数 ν に比例することを示した：

$$E = h\nu, \quad (6.14)$$

ここで h はプランク定数である。

この関係は革命的だった。古典的な波動論ではエネルギーは振幅の二乗に比例するが、プランク・アインシュタインの関係では**振動数そのものがエネルギー**を決定する。光子一つひとつが離散的なエネルギー $h\nu$ を運び、振動数が高いほど（青い光ほど）エネルギーが大きい。光電効果の実験がこれを決定的に証明し、アインシュタインにノーベル賞をもたらした。

二重時空理論の観点から見ると、この性質は深い意味を持つ。光子は質量ゼロゆえに双対時空が完全に同期（ねじれ不整合 $J = 0$ ）しており、重力・慣性の影響を「感じない」。そのエネルギーは、通常時空の伝播（波動性）と双対時空のコンパクト振動（振動数 ν ）の完全な調和として現れる。振動数 ν は、双対時空のコンパクト回転周波数に相当し、エネルギー $E = h\nu$ はその剛性のゼロ限界での「残響」として解釈可能である（量子重力章で詳述）。

こうして、光速度一定の原理は、質量を持つ粒子に静止エネルギー mc^2 を与え、質量ゼロの光子に振動数エネルギー $h\nu$ を与える。物質と光は、同一の相対論的枠組み内で統一され、二重時空理論はこれを粒子内在的な双対構造から自然に説明する基盤を提供する。

6.3.6 通常時空基底による代数的再現

二重時空理論の通常時空基底 (j, kI, kJ, kK) は、これらの概念を双四元数ローターで完璧に表現する。四元速度はローターの微分形式で、四元運動量は質量スケーリングされたローター演算で現れる（詳細は付録）。特に $E = mc^2$ は、粒子内在的な双対時空の剛性が静止エネルギーを生むことを予感させる・・・次章以降で明らかになる重力・慣性の統一への布石である。

光速度一定の原理は、単なる公準ではなく、時空の本質を規定する絶対的な制約である。この制約が、四元速度の定義不能性を通じて光子の特異性を生み、質量エネルギー等価を通じて物質の本質をエネルギーとして統一する。二重時空理論は、これらを粒子内在的な双対構造から自然に導く枠組みを提供する。

6.4 ローレンツ変換とラピディティの導入

ローレンツ変換は

$$ct' = \gamma(ct + \beta x), \quad (6.15)$$

$$x' = \gamma(x + \beta ct), \quad (6.16)$$

$$y' = y, \quad z' = z, \quad (6.17)$$

で与えられる ($\beta = v/c$, $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$)。ラピディティ ϕ を $\beta = \tanh \phi$, $\gamma = \cosh \phi$ と定義すると、変換は加法的：

$$\phi_{\text{total}} = \phi_1 + \phi_2. \quad (6.18)$$

これは双曲線幾何の自然な帰結であり、前章の双曲線版オイラー公式と完全に一致する。

6.5 通常時空基底によるローレンツ変換の代数的表現

二重時空理論の通常時空基底は (j, kI, kJ, kK) であり、時空ベクトル

$$X = ctj + xkI + ykJ + zkK \quad (6.19)$$

で表される。ブースト方向の単位バイベクトル $\hat{p} = p_1 iI + p_2 iJ + p_3 iK$ ($\hat{p}^2 = +1$) を用いたローター

$$R_{\text{usual}} = \exp\left(\frac{\phi}{2}\hat{p}\right) = \cosh\frac{\phi}{2} + \hat{p}\sinh\frac{\phi}{2} \quad (6.20)$$

でサンドイッチ積 $X' = R_{\text{usual}} X R_{\text{usual}}^\dagger$ を施すと、標準的なローレンツブーストが得られる。空間回転も双対セクターのバイベクトルで同様に表現可能。これにより、特殊相対性理論の全ローレンツ群が双四元数内の指数関数で統一的に記述される。

6.6 完全一致の美しさとその限界

通常時空基底と双曲線版オイラー公式は、特殊相対性理論を**完全に**再現する。行列や座標に依存せず、純粹代数的なローター演算だけで光速度一定と相対性原理が満たされる。これは、1905年の理論が双四元数代数に内在していたことを示す。しかし、重力の記述や慣性の起源、量子との統合は残された課題である。ここに双対時空の導入が必要となる・・・通常時空だけでは不十分だからだ。

6.7 次への橋渡し：双対時空の必然性

特殊相対性理論は平坦時空の美しさを示したが、重力は曲率として別扱いされた。二重時空理論は、双対時空を粒子内在的に導入し、通常時空とのねじれ不整合を重力の本質とする。次章では、この双対構造の詳細を探り、二重時空の革命的なビジョンを明らかにする。光速度一定の革命は、さらなる革命への序曲にすぎない。

第 7 章

二重時空の構造：各粒子が持つ二つの時空

前章で見たように、二重時空理論の通常時空基底は、特殊相対性理論のローレンツ変換を双四元数代数のローターで完全に再現する。光速一定の原理と相対性原理が、純粹代数的に満たされる・・・これは 1905 年の革命が、すでに $Cl(3,1)$ 同相の双四元数代数に内在していたことを示す。しかし、重力の記述や慣性の起源は残された。ここで本理論の核心が現れる：時空は単一の連続体ではなく、各粒子が内在的に持つ**通常時空**と**双対時空**の対である。本章では、この二重構造の詳細を明らかにし、時空連続体仮説の否定と粒子内在性の必然性を探る。双対時空は時間の方向が反転したコンパクト構造を持ち、重力と慣性の鍵となる。

7.1 時空連続体仮説の否定

一般相対性理論は、時空を滑らかなリーマン多様体として仮定する。しかし、この連続体仮説は量子力学との統合で深刻な困難を生む（特異点、無限大の発散）。二重時空理論は、これを根本から否定する。時空は共有された背景ではなく、各質量を持つ粒子が内在的に持つ離散的・代数的構造である。粒子が存在しない場所に「空の時空」はなく、すべての時空度は粒子に付随する。

7.2 双四元数代数内の二重時空基底

双四元数代数 ($\mathbb{H} \oplus \mathbb{H} \cong Cl(3,1)$) は、二組の基底を自然に提供する：

- **通常時空基底**： (j, kI, kJ, kK) （時間： j 、空間： kI, kJ, kK ）
- **双対時空基底**： (k, jI, jJ, jK) （時間： k 、空間： jI, jJ, jK ）

通常時空ベクトル：

$$X = ctj + xkI + ykJ + zkK \quad (7.1)$$

双対時空ベクトル：

$$X' = ct'k + x'jI + y'jJ + z'jK \quad (7.2)$$

両者ともミンコフスキーノルム $X^2 = X'^2 = -(ct)^2 + x^2 + y^2 + z^2$ を保つ。

7.3 双対写像と時間の反転

二つの時空は、擬スカラー i による右乗法で結びつく：

$$X' = Xi \quad (7.3)$$

計算すると：

$$(ctj)i = -ctk, \quad (xkI)i = xjI, \quad \text{など} \quad (7.4)$$

結果、時間の符号が反転する：

$$Xi = -ctj + xkI + ykJ + zkK \quad (7.5)$$

双対時空は通常時空の時間反転鏡像であり、両者は可換な双四元数構造内で共存する。

7.4 粒子内在的な二重時空の意味

各質量 $m > 0$ の粒子は、この 16 次元実構造を内在的に持つ。通常時空は外向きの運動学（ブースト）を、双対時空は内向きのコンパクト自由度（回転）を担う。質量ゼロ粒子（光子）は双対時空が完全に同期し、ねじれゼロを保つ。質量を持つ粒子では、双対時空のコンパクト性が剛性を生み、慣性と重力の起源となる。時空は粒子ローカルで、共有連続体ではない・・・これがマッハの原理の自然な実現である。

7.5 不変量の保存とローレンツ不変性

$X^2 = X'^2$ が常に保たれるため、二重構造はミンコフスキー計量を尊重する。通常時空のローター R_{usual} はローレンツブーストを、双対時空のローター R_{dual} はコンパクト回転を生成する。両者は可換なので、完全ローター $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}}R_{\text{dual}}$ が全体の変換を記述する。

7.6 次への橋渡し：完全ローターと平行移動の代数化

二重時空の構造が明らかになったところで、次章では完全ローターによるキネマティクスを構築する。平行移動がクリストッフェル記号ではなくローターのサンドイッチ積で表現され、重力がねじれ不整合として現れるメカニズムに至る。粒子内在的な二重時空は、時空の本質を根本から変える。

第 8 章

異なる時空をつなぐ双対マップ

前章では、二重時空理論の核心である通常時空と双対時空の基底を明らかにした。通常時空ベクトル $X = ctj + xkI + ykJ + zkK$ と双対時空ベクトル $X' = ct'k + x'jI + y'jJ + z'jK$ は、共にミンコフスキーノルムを保ちながら、時間基底の符号が逆転していることがわかった。

この二つの時空は、粒子内在的に共存するにもかかわらず、一見独立に見える。では、両者をどのように結びつけ、統一的に扱うのか？本章では、その橋渡し役となる**双対マップ** (dual map) を中心に据える。双対マップは、擬スカラー i による右乗法 $X \mapsto Xi$ として定義され、時間の方向を反転させつつ不変量を保存する。さらに、このマップが完全ローター R_{total} の必然性を明らかにし、双曲関数と三角関数の「見た目の不一致」という違和感を根本的に解消することを示す。双対マップこそが、二重時空理論の代数構造が単なる数学的遊戯ではなく、物理の本質を捉える鍵であることを証明するものである。

8.1 双対マップの定義と基本性質

双対マップは、双四元数代数内の擬スカラー (pseudoscalar) i を用いた右乗法として最も自然に定義される：

$$X \mapsto X' = Xi. \quad (8.1)$$

ここで i は、通常四元数セクターの擬スカラーであり、 $i^2 = -1$ を満たす。この演算が「右乗法」であることに注意されたい。双四元数代数は非可換だが、 i はすべての基底要素と可換ではないものの、特定の構造を持つため、右乗法が時空ベクトルの変換として一貫性を保つ。

具体的に計算してみよう：

$$(ctj)i = ct(ji) = -ctk, \quad (8.2)$$

$$(xkI)i = x(kIi) = x(kiI) = x(-ikI) = xjI, \quad (\text{同様に } ykJi = yjJ, zkKi = zjK). \quad (8.3)$$

よって、

$$Xi = -ctk + xjI + yjJ + zjK. \quad (8.4)$$

時間成分の符号が反転し、空間成分は通常基底 (kI, kJ, kK) から双対基底 (jI, jJ, jK) へと移行する。この結果は、双対時空ベクトル X' の形と完全に一致する（時間基底 k が正の符号で現れるように調整すればよい）。

重要な性質として、ミンコフスキーノルムが保存される：

$$(Xi)^2 = X^2 i^2 = X^2 (-1) = -X^2. \quad (8.5)$$

したがって $X^2 = (Xi)^2$ が成立し、ローレンツ不変性が双対マップの下でも保たれる。

8.2 時間の反転と物理的解釈

双対マップの本質は、時間の方向の反転にある。通常時空では時間基底 j が未来指向（正の ct 係数）であるのに対し、双対マップ適用後は時間基底 k が過去指向に相当する形で現れる。この反転は、双対時空が「時間反転鏡像」

であることを示す。

物理的には、次のように解釈できる：

- 通常時空は外向きの運動学（粒子が未来へ進む）を担う。
- 双対時空は内向きのコンパクト自由度（粒子の内在的剛性）を担い、時間反転により「粒子が自身の過去と対峙する」構造を持つ。

質量を持つ粒子では、この時間反転鏡像が完全に同期しないことで、ねじれ不整合（torsional mismatch）が発生し、それが重力・慣性の源となる（後章で詳述）。

8.3 ローターに対する双対マップの作用

双対マップは時空ベクトルだけでなく、ローターにも自然に作用する。通常時空のブーストローター $R_{\text{usual}} = \exp(\phi/2 \hat{p})$ ($\hat{p}^2 = +1$) を考えよう。単位ブーストバイベクトル $\hat{p} = p_1 iI + p_2 iJ + p_3 iK$ に対し、

$$\hat{p}i = p_1(iIi) + \dots = p_1(-I) + p_2(-J) + p_3(-K) = -\hat{q}', \quad (8.6)$$

ここで $\hat{q}' = p_1 I + p_2 J + p_3 K$ は双対時空の単位回転バイベクトル ($\hat{q}'^2 = -1$) である。したがって、ブースト生成子は双対マップで純回転生成子へと変換される。

この変換が、完全ローター R_{total} の必然性を生む鍵である。

8.4 完全ローターの必然性と双曲・三角の違和感の解消

通常時空のローターは双曲関数（cosh, sinh）、双対時空のローターは三角関数（cos, sin）で表される：

$$R_{\text{usual}} = \cosh \frac{\phi}{2} + \hat{p} \sinh \frac{\phi}{2}, \quad (8.7)$$

$$R_{\text{dual}} = \cos \frac{\theta}{2} + \hat{q} \sin \frac{\theta}{2}. \quad (8.8)$$

これらを単純に $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ と書くと、指数形では

$$R_{\text{total}} = \exp\left(\frac{\phi}{2} \hat{p} + \frac{\theta}{2} \hat{q}\right) \quad (8.9)$$

となり、双曲関数と三角関数が「足し合わされた」ように見える。この表記は、一見不自然で違和感を覚える読者も多いだろう。「双曲関数と三角関数をどうして同じ指数の中に共存させられるのか？」という疑問である。

この違和感の根本的な解決が、双対マップにある。前節で見たように、通常時空のブースト生成子 $\hat{p}$ は双対マップで $-\hat{q}'$ （純回転生成子）へと変換される。逆に、双対時空の回転生成子 $\hat{q}$ を双対マップで変換すればブースト型に見える。つまり、**ブーストと回転は、双対マップを介して本質的に同一の自由度**なのである。生成子が可換（commute）であるため、指数関数の加法が数学的に正当化され、物理的には「通常時空から見たブースト」と「双対時空から見た回転」が同一現象の二つの顔にすぎないことを反映している。

R_{total} を導入する必然性は以下の通りである：

1. **統一性**：双対マップによる同相性を明示的に保ち、6個の実パラメータ（ $\phi, \hat{p}$ と $\theta, \hat{q}$ ）を単一のローターで扱う。
2. **ねじれ不整合の自然な定義**：重力の源である相対ローター $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$ を、 R_{total} から直接導出可能にする。
3. **代数的簡潔さ**：毎回双対マップを明示的に挿入する煩雑さを避け、対称性を前景化する。

この記法は、見た目の「双曲＝三角」の不一致を犠牲にして、理論の深い対称性（通常 $\leftrightarrow$ 双対の同相性）と物理的解釈（重力＝相対ローター）を最優先したものである。双対マップがなければ、この統一は不可能だった。

8.5 双対マップの物理的意義：重力への橋渡し

双対マップは、単なる数学的変換ではない。真空（自由落下）では $R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}^\dagger$ が要求され、双対マップが完全な鏡像対称を保証する。質量存在下ではこの同期が崩れ、相対角 $\Omega \neq 1$ が生じる。この相対角が、ねじれ不整合 (torsional mismatch) として重力を引き起こす（次章で詳述）。

8.6 次章への展望：重力の本質としてのねじれ不整合

双対マップにより、異なる二つの時空が統一的に結びつけられた。完全ローター R_{total} はその結晶であり、双曲・三角の違和感を双対変換の美しさへと昇華させる。次章では、この枠組みの中で重力が純粋に代数的なねじれ不整合として現れるメカニズムを明らかにする。時空連続体はもはや必要なく、粒子内在的な双対ローターの相対角がすべての重力現象を支配する時代が始まる。

第9章

重力＝双対時空間のねじれ不整合

前章で、双対マップにより通常時空と双対時空が統一的に結びつけられ、完全ローター $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ がその代数的表現であることを見た。この二つのローターは、真空では完全に同期 ($R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}^\dagger$) し、ねじれがゼロとなる。しかし、質量・エネルギーが存在すると、この同期が崩れ、相対的な「ねじれ不整合」が生じる。

本章では、このねじれ不整合こそが重力の本質であることを明らかにする。クリストッフェル記号やリーマン曲率テンソルは一切登場しない。代わりに、純粋に双四元数代数内のローター演算とキリング形式によって、重力の場の方程式が導かれ、一般相対性理論 (GR) と完全に等価になることを示す。特に、この理論がテレパラレル重力 (Teleparallel Equivalent of General Relativity:TEGR) の双四元数的実現であることを詳述し、トーションスカラー T とねじれ不整合スカラー J の精密な対応を明らかにする。時空連続体仮説を否定しつつ、GR のすべての予測 (ニュートン極限、ブラックホール、宇宙論、重力波など) を正確に再現する枠組みが、ここに完成する。

9.1 ねじれ不整合ローターの定義

各粒子は、通常時空ローター R_{usual} と双対時空ローター R_{dual} を内在的に持つ。これらは、粒子間の平行移動を要求する際に、互いに同期する必要がある。

ねじれ不整合ローターを次のように定義する：

$$\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}. \quad (9.1)$$

ここで $R_{\text{usual}}^\dagger$ は通常ローターの共役逆元であり、双対マップの効果を内包する (前章参照)。真空 (自由落下) では、ねじれ不整合がゼロであるためには $\Omega = 1$ でなければならない。これは $R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}^\dagger$ 、すなわち双対時空が通常時空の時間反転鏡像として完全に同期している状態に対応する。

質量・エネルギーの存在は、この同期を乱し、 $\Omega \neq 1$ を引き起こす。 Ω は $\text{Spin}^+(3, 1) \oplus \text{Spin}^+(3, 1)$ の元であり、ローレンツ群の二重コピー内に収まる。

9.2 トーションバイベクトルと不変量の構築

ねじれ不整合の本質的な幾何量は、 Ω の対数として得られるバイベクトルである：

$$\Omega_{\text{biv}} = \log \Omega \in \mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1). \quad (9.2)$$

このバイベクトルは、通常時空のブースト成分と双対時空の回転成分の相対誤差を表す。

ローレンツ不変な唯一の二次スカラー不変量は、Lie 代数 $\mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1)$ 上のキリング形式を用いて

$$J = \frac{1}{16} B(\Omega_{\text{biv}}, \Omega_{\text{biv}}) \quad (9.3)$$

と定義される。ここでキリング形式 $B(X, Y) = 4\text{Tr}(XY)$ は、ブースト成分に対して正の符号、回転成分に対して負の符号を与える (署名 $(-+++)$ を反映)。

物理的解釈：

- $J = 0$ ：真空、ねじれ不整合なし。
- $J > 0$ ：通常時空のブースト優位 → 通常の引力重力。
- $J < 0$ ：双対時空の回転優位 → 斥力重力（強重力場での可能性、後述）。

9.3 アクションと場の方程式：TEGR との精密な等価性

重力のアクションを

$$S = \frac{c^4}{16\pi G} \int J d^4x \quad (9.4)$$

と提案する。このアクションは純粋代数的で、背景独立である。

ここで鍵となるのは、 J が TEGR のトーションスカラー T と本質的に同一であることである。TEGR (Maluf 2013 など文献参照) では、ヴァイツェンベック接続を用い、曲率ゼロ・トーションのみの幾何で重力を記述する。トーションテンソル $T_{\mu\nu}^\lambda$ から構築される。トーションスカラー T は、特定の組み合わせで

$$T = \frac{1}{4} T_{\mu\nu}^\lambda T_\lambda^{\mu\nu} + \frac{1}{2} T_{\mu\nu}^\lambda T_\lambda^{\mu\nu} - T^\lambda T_\lambda \quad (9.5)$$

($T_\lambda = T_{\mu\lambda}^\mu$) と定義され、アクション $\int T e d^4x$ ($e = \sqrt{-g}$) がアインシュタイン・ヒルベルトアクションと境界項を除いて等価であることが厳密に証明されている：

$$\int T e d^4x = - \int R e d^4x + \text{境界項}. \quad (9.6)$$

二重時空理論では、ねじれ不整合バイベクトル Ω_{biv} が TEGR のトーションテンソル $T_{\mu\nu}^\lambda$ の役割を果たす。具体的対応：

- Ω_{biv} のブースト成分 (iI, iJ, iK) がトーションの「軸性」部分に対応。
- 回転成分 (I, J, K) が「トレース」および「反対称」部分に対応。
- キリング形式のトレース計算が、TEGR のトーションスカラー T の契約と完全に一致するよう正規化されている。

結果、 J は T (または $-R$) と定数倍・境界項を除いて同一となる。したがって、アクション (9.4) は TEGR アクションと同等であり、変分から得られる場の方程式は真空・物質共役ともにアインシュタイン方程式と完全に一致する。

重要な点：

- クリストッフエル記号不要：平行移動はローターのサンドイッチ積で代数的に実現。
- リーマン曲率ゼロ：曲率は「見かけの効果」として集団的なねじれ不整合から創発。
- 時空連続体不要： d^4x はマクロな体積要素として残るが、微視的には粒子内在的な離散構造（後述の離散化章参照）。

この等価性により、二重時空理論は GR を「修正」するものではなく、「完成」するものである。TEGR が幾何学的解釈の再構成であるのに対し、本理論はそれを粒子内在的な双四元数代数で物理的に実現したものである。

9.4 弱場極限とニュートン極限の確認

線形近似で $\Omega \approx 1 + \epsilon \Omega_{\text{biv}}$ ($\epsilon \ll 1$) とすると、

$$J \approx \frac{1}{2} (\nabla \phi_a)^2 + \dots \quad (9.7)$$

となり、ポアソン方程式 $\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho$ が回復される（詳細計算は付録参照）。これは TEGR と同様の経路でニュートン重力を再現する。

9.5 物理的解釈：重力は制御可能な自由度

ねじれ不整合 J が粒子内在的な相対ローター Ω のみに依存するため、外部場（例：円偏向電磁場）で双対ローター θ_a を同期させれば $J \rightarrow 0$ （重力遮蔽）や $J < 0$ （斥力）が原理的に可能となる（重力工学章参照）。重力はもはや不可侵の幾何ではなく、エンジニアリング可能なトーション自由度となる。

9.6 次章への橋渡し：慣性と重力の統一

重力が双対時空間のねじれ不整合として TEGR と等価に記述されることが明らかになった。次章では、この同一のメカニズムが慣性力も説明し、等価原理が代数的な恒等式として現れることを示す。重力と慣性は、もはや別現象ではなく、同一のねじれ不整合の二つの顔である。二重時空理論は、ここに真の統一をもたらす。

第 10 章

慣性と重力の完全統一

前章では、重力が通常時空と双対時空のねじれ不整合として現れ、テレパラレル重力（TEGR）と完全に等価であることを示した。ねじれ不整合スカラー J がアインシュタイン・ヒルベルトアクションと同等の役割を果たし、一般相対性理論のすべての予測を正確に再現する。しかし、ここでさらに深い統一が待っている。

重力と慣性は、従来の理論では別々に扱われつつも、等価原理によって「局所的に区別できない」とされた。二重時空理論では、この区別不能性が偶然ではなく、**同一の代数的メカニズム**から必然的に生じることを明らかにする。慣性力も重力も、粒子内在的な通常ローター R_{usual} と双対ローター R_{dual} の相対的なねじれ不整合にほかならない。本章では、この完全統一を段階的に解明し、等価原理が双四元数代数内の単純な恒等式として現れることを示す。さらに、マッハの原理が自然に実現され、慣性が「宇宙全体の物質分布」によって決定される理由が明らかになる。重力と慣性は、もはや二つの現象ではなく、ねじれ不整合の二つの顔である。

10.1 慣性の伝統的謎とマッハの原理

ニュートン力学では、慣性質量は物体の本質的な性質として与えられ、加速に対する「抵抗」として現れる。しかし、なぜ物体は加速に抵抗するのか？この問いに答えたのがマッハの原理である：「物体の慣性は、宇宙全体の遠方物質分布によって決定されるべきである」。

一般相対性理論は、等価原理を通じて慣性と重力を局所的に結びつけたが、マッハの原理を完全に実現するには至らなかった。背景時空が独立に存在する限り、慣性の起源は不明瞭なままだった。二重時空理論は、時空連続体を否定し、すべての時空自由度を粒子内在的な双対構造に移すことで、この謎を根本的に解決する。

10.2 粒子内在的な双対時空と剛性

各質量 $m > 0$ の粒子は、通常時空（非コンパクト、ブースト主導）と双対時空（コンパクト、回転主導）の対を内在的に持つ。双対時空のコンパクト性（ $\theta \bmod 4\pi$ ）は、質量に比例した**剛性**（rigidity）を生む。

この剛性は、双対ローター R_{dual} が通常ローター R_{usual} に「追従しようとする」傾向として現れる。真空では、完全な同期 $R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}^\dagger$ がエネルギー的に最安定であり、ねじれ不整合 $J = 0$ を実現する。この同期状態が、慣性系（自由落下）の本質である。

10.3 自由落下：ローターの完全同期とねじれゼロ

自由落下する粒子では、通常ローター R_{usual} が外部重力場によるブーストを反映する。双対ローター R_{dual} は、内在的な剛性により $R_{\text{usual}}^\dagger$ にぴったり追従する。結果、ねじれ不整合ローター $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}} = 1$ となり、 $J = 0$ が保たれる。

観測者にとって、自由落下粒子は「力を感じない」・・・これは重力が「消えた」ように見える状態である。実際に

は、重力は存在するが、双対時空の剛性がそれを完全に相殺している。この相殺が、等価原理の局所的実現である。

10.4 加速と慣性力：ねじれ不整合の発生

いま、粒子を外部力で強制的に加速させる場合を考える。通常ローター R_{usual} は加速による追加ブーストを反映するが、双対ローター R_{dual} はコンパクト剛性のために即座に追従できない。結果、 $\Omega \neq 1$ となり、ねじれ不整合 $J > 0$ が生じる。

この J が、粒子に「慣性力」として感じられる。慣性力は重力と同一のねじれ不整合であり、方向は通常時空のブースト優位 ($J > 0$) として現れる。加速観測者は、自身が静止していると仮定すると、周囲のすべての粒子が「逆方向に加速」しているように見え、それに対応するねじれ不整合を重力場として解釈する。

こうして、**慣性力 = 重力と同じメカニズム**が明らかになる。

10.5 等価原理の代数的証明

等価原理は、次の代数的恒等式として厳密に証明される：

自由落下（重力場内）では $R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}^\dagger$ （重力ブーストを双対剛性が相殺）。強制加速（慣性系外）では、同じく $R_{\text{dual}} \neq R_{\text{usual}}^\dagger$ だが、相対ねじれ Ω が同等となる。

局所的に、ねじれ不整合 J は重力加速度 g と慣性力 ma を同一のスカラーとして記述する：

$$J \propto g \cdot x = a \cdot x \quad (10.1)$$

(x は局所座標)。これは、クリストッフェル記号や測地線方程式を一切使わず、純粋にローターの相対角から導かれる。等価原理は、もはや公準ではなく、双四元数代数の必然的な帰結である。

10.6 マッハの原理の実現：遠方物質との集団的同期

二重時空理論では、時空が粒子内在的であるため、宇宙全体の物質分布が各粒子の双対ローターに影響を与える。遠方の質量は、集団的なねじれ不整合を通じて、局所粒子の双対剛性を「基準」として固定する。

慣性系とは、宇宙全体の平均的なローター同期状態である。これに対し局所加速すると、遠方物質とのねじれ不整合が生じ、慣性力として現れる。こうして、マッハの原理が背景時空なしに、純粋に粒子間のローター相対角から、自然に、かつ厳密に実現される。

10.7 次章への展望：応用と新たな予測

重力と慣性がねじれ不整合の同一現象であることが明らかになった。等価原理は代数的な事実となり、マッハの原理は粒子内在性の帰結となる。次章以降では、この統一がもたらす革新的な応用（暗黒物質不要の銀河回転曲線、トーション星による特異点解消、核力の重力起源、重力工学の実現可能性）を探る。二重時空理論は、一般相対性を超え、真の統一物理学への道を開く。

第 III 部

応用と予測

第 11 章

暗黒物質不要の銀河回転曲線

銀河の回転曲線は、20 世紀後半の天文学が直面した最大の謎の一つである。観測では、銀河外縁部の星やガスの軌道速度が距離とともに減少せず、ほぼ一定（平坦）であることが繰り返し確認された。これは、ニュートン重力や一般相対性理論の標準的な予測（可視物質のみでは $v \propto 1/\sqrt{r}$ で減少）と矛盾する。この矛盾を解消するために導入されたのが暗黒物質ハローである・・・可視物質の数倍から十数倍の質量を持つ、見えない物質の球対称分布が、遠方まで重力を補うと仮定された。

しかし、暗黒物質仮説は多くの問題を抱えている。粒子物理学での候補（WIMP、アクシオンなど）は未検出であり、銀河スケールでの分布細構造（コア・カスプ問題）や多様性問題との不整合が指摘される。さらに、暗黒物質は重力のみで相互作用すると仮定されるため、検証が極めて困難である。

二重時空理論は、これらの問題を根本的に解決する。時空連続体を否定し、各粒子が内在的に持つ双対時空のねじれ不整合が重力の本質であるため、銀河スケールでの集団的なトーション効果が自然に平坦回転曲線を生む。暗黒物質は不要・・・可視物質（バリオン）だけで観測を完全に説明できる。本章では、このメカニズムを段階的に明らかにし、二重時空理論が銀河回転曲線の「自然な」解釈を提供することを示す。

11.1 観測事実：平坦回転曲線の謎

銀河の回転曲線は、現代天文学が発見した最も衝撃的な観測事実の一つである。古典的なニュートン重力理論では、太陽系のように中心質量が支配的な系では、外縁に行くほど軌道速度が減少する（ケプラー則 $v \propto 1/\sqrt{r}$ ）と予測される。しかし、実際の銀河観測は全く異なる振る舞いを示す・・・外縁部まではほぼ一定の速度が保たれる「平坦回転曲線」である。この謎は、1930 年代に遡るが、1970 年代以降の高精度観測によって決定的に確立された。

11.1.1 歴史的背景と初期の示唆

1930 年代、ヤン・オールトやフリッツ・ツビッキーは、銀河団の運動から「欠落質量」の存在を指摘していた。しかし、個別銀河レベルでの決定的証拠は、1970 年代にヴェラ・ルービンとケント・フォードによる光学分光観測によってもたらされた。彼らはアンドロメダ銀河（M31）をはじめとする多くの渦巻銀河で、外縁部の星々が予想外に高速で回転していることを発見した。ルービンは「可視光で輝く恒星やガスだけでは、重力が不足している」と結論づけ、これが暗黒物質仮説の強力な動機付けとなった。

11.1.2 観測手法と測定の進化

回転曲線の測定には、主に以下の手法が用いられる：

- **光学分光**： $H\alpha$ 線やその他の発光線を用い、ドップラーシフトから視線方向速度を測定。内側領域（恒星支配）の回転曲線に有効。

- **21cm 中性水素線観測**：電波干渉計（VLA、WSRT など）で銀河外縁の HI ガスを追跡。外側領域まで広範にカバー可能。
- **CO 分子線観測**：分子ガス雲の回転を高解像度で測定。
- 近年では、THINGS（The HI Nearby Galaxy Survey）や SPARC データベースなどの大規模サーベイにより、数千銀河の高品質回転曲線が蓄積されている。

これらの観測は、渦巻銀河だけでなく、低表面輝度銀河（LSB）、矮小銀河、楕円銀河の一部にまで及び、平坦回転曲線が**普遍的な現象**であることを示している。

11.1.3 典型的な回転曲線の形状

観測された回転曲線は、以下の特徴を持つ：

- **内側領域**（ $r \lesssim \text{数 } kpc$ ）：速度が半径にほぼ比例して上昇（ $v \propto r$ ）。これはディスクの固体回転に近い挙動で、バリオン（恒星＋ガス）の密度分布を反映。
- **外側領域**（ $r \gtrsim 10 - 100 kpc$ ）：速度がほぼ一定（ $v \approx 100 - 300 km/s$ ）で平坦に保たれる。半径が 10 倍になっても速度低下がほとんどない。

具体例として：

- **NGC 3198**：典型的な平坦曲線を示す渦巻銀河。外縁で $v \approx 150 km/s$ が持続。
- **NGC 6503**：THINGS サーベイの代表例。バリオン支配内側から平坦外側への滑らかな遷移。
- **低表面輝度銀河（例：UGC 2259）**：可視物質が少ないにもかかわらず、高い平坦速度を示し、暗黒物質ハローの必要性を強調するケース。




図 11.1 典型的な銀河回転曲線の模式図。赤破線が可視物質のみのニュートン予測、青実線が実際の観測（平坦）。

図 11.1 に模式的に示すように、観測曲線は外縁で明確に平坦である。

11.1.4 理論との矛盾：欠落質量問題

円運動の平衡条件から、回転速度は

$$v^2(r) = \frac{GM(< r)}{r} \quad (11.1)$$

で与えられる。ここで $M(< r)$ は半径 r 以内の総質量である。可視物質（恒星＋ガス）の光度分布から推定される $M_b(< r)$ は、外縁でほぼ一定となるため、

$$v(r) \propto \frac{1}{\sqrt{r}} \quad (11.2)$$

で減少するはずである。しかし観測では $v(r) \approx \text{const.}$ であり、これは $M(< r) \propto r$ 、すなわち密度 $\rho \propto 1/r^2$ の球対称ハローが必要であることを意味する。この「見えない質量」は可視バリオンの 5–10 倍以上と推定され、暗黒物質仮説の基盤となった。

11.2 暗黒物質仮説の問題点

暗黒物質仮説は、銀河回転曲線の平坦性や銀河団の運動、宇宙背景放射のゆらぎ構造形成など、広範な観測事実を説明する上で大きな成功を収めてきた。 Λ CDM (Lambda Cold Dark Matter) モデルは、宇宙の大規模構造を驚くほど精密に再現し、現代宇宙論の標準モデルとなっている。しかし、この仮説は本質的に**アドホック**（後付け）であり、数十年にわたる探求にもかかわらず、深刻な問題を抱え続けている。これらの問題は、粒子物理学的な未解決、銀河スケールでの観測的矛盾、理論的・哲学的な難点に大別できる。二重時空理論は、これらの問題を一切必要とせず、可視バリオン成分だけで同等の（あるいはより優れた）説明を提供する。

11.2.1 粒子物理学的未検出と候補の困難

暗黒物質の最も有力な候補は、超対称性理論から予想される **WIMP** (Weakly Interacting Massive Particles) である。WIMP は弱い相互作用で重力以外に電磁気と関わらず、質量が $\text{GeV} - \text{TeV}$ スケールと予想される。しかし、LHC (大型ハドロン衝突型加速器) での生成実験、地下深くの直接検出実験 (XENON、LUX、PandaX など)、宇宙線による間接検出 (フェルミ衛星、AMS-02) で、数十年にわたり**決定的な信号は検出されていない**。

他の候補も同様の困難を抱える：

- **アクシオン (Axion)**：QCD の強い CP 問題を解決する軽い擬スカラー粒子。ADMX や CAST などの実験で探索されているが、広大なパラメータ空間のため未検出。
- **ステライルニュートリノ**：質量が keV スケールでウォームダークマター (WDM) 候補だが、ライマン α の森の観測との矛盾。
- **プリマコフ粒子**やその他のエキゾチック候補：理論的動機は弱く、検出可能性が低い。

これらの非検出は、暗黒物質が「重力のみで相互作用する」仮定の限界を示唆する。検出されないままパラメータを調整し続ける状況は、理論の予測力を損なっている。

11.2.2 銀河スケールでの観測的矛盾

大規模構造 (宇宙マイクロ波背景放射や銀河団) では Λ CDM が成功する一方、銀河・矮小銀河スケールでは深刻な不整合が生じる：

- **コア・カスプ問題 Cusp-Core Problem**：シミュレーションでは暗黒物質ハローの中心密度が尖点 (cusp, $\rho \propto 1/r$) を示すが、観測された低表面輝度銀河や矮小銀河では平坦なコア (core, $\rho \approx \text{const.}$) が多い。
- **大きすぎて失敗できない問題 Too-Big-To-Fail Problem**：シミュレーションで予想される大量の巨大サブハロー (衛星銀河) が、実際の天の川銀河周辺では観測されない (missing satellites problem の変種)。
- **多様性問題 Diversity Problem**：銀河ごとの回転曲線や密度プロファイルが多様すぎ、 Λ CDM の「普遍的」ハロー形成と矛盾。
- **衛星銀河の平面問題 Plane of Satellites Problem**：天の川やアンドロメダの衛星銀河が薄い平面に並ぶ現象が、球対称ハローでは確率的に極めて低い。

これらの問題を解決するため、バリオン物理 (超新星フィードバック、星形成など) を導入する試みがあるが、調整パラメータが増大し、予測力が低下する。

11.2.3 宇宙論的・哲学的な難点

さらに広範な問題として：

- **弾丸銀河団の成功例と矛盾**：弾丸銀河団（Bullet Cluster）では重力レンズと X 線ガスのずれが暗黒物質の「証拠」とされるが、二重時空理論ではトーシヨンの非対称効果で同様に説明可能。
- **細かい調整の問題**：暗黒物質密度パラメータ $\Omega_{DM} \approx 0.27$ がバリオン $\Omega_b \approx 0.05$ の約 5 倍という比率が、なぜこの値なのか理論的説明がない。
- **検出可能性の欠如**：重力のみの相互作用を仮定すると、暗黒物質は本質的に「見えない」ままとなり、科学的な検証が困難。

哲学的には、暗黒物質は「観測されないものを仮定して観測を説明する」循環論法に陥る危険がある。オッカムの剃刀の指針から、より少ない仮定で同等の説明が可能なら、それが優位である。

11.3 二重時空理論での解釈：集団的なねじれ不整合

二重時空理論では、重力は各粒子が内在的に持つ通常時空と双対時空のねじれ不整合として現れる。前章で見たように、個々の粒子レベルではねじれ不整合ローター $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$ が定義され、その対数から得られるバイベクトル Ω_{biv} をキリング形式で約定したスカラー J が重力の強さを決定する。真空では $J = 0$ （完全同期）、質量存在下では $J > 0$ （引力優位）となる。

銀河回転曲線の平坦性というマクロスケール現象は、このねじれ不整合が**集団的に累積**する効果から自然に生じる。暗黒物質のような追加の「見えない質量」を仮定する必要はなく、可視バリオン（恒星、ガス、星間物質）だけで外縁部の高速回転を説明できる。本節では、この集団的メカニズムを段階的に明らかにする。

11.3.1 粒子レベルのねじれ不整合の復習

各質量 $m > 0$ の粒子は、双対時空のコンパクト剛性により、通常ローター R_{usual} に双対ローター R_{dual} が追従しようとする。局所的な質量密度が高い領域（銀河中心）では、この追従に遅れが生じ、 $\Omega \neq 1$ となり $J > 0$ が発生する。これは個別粒子の重力吸引として現れるが、単独ではニュートン重力と同等である。

鍵は、粒子が多数集まる銀河スケールでの**集団的相互作用**にある。粒子間の平行移動を要求する際、全粒子の双対ローターが互いに「同期」を強制され合う。この同期過程で、位相誤差が半径方向に累積的に伝播する。

11.3.2 集団的同期と位相累積効果

銀河を多数の粒子集合と見なし、各粒子の双対ローターを考える。中心から外縁に向かう方向に、バリオン密度 $\rho(r)$ に比例したねじれ不整合が生じる。内側領域では密度が高く、個々の J が強く寄与する（急峻な上昇部に対応）。外縁部では密度が低下するが、双対時空のコンパクト性（ $\theta \bmod 4\pi$ ）が重要な役割を果たす：

- 双対ローターの位相 θ はコンパクトであり、粒子間で「層状」に同期する傾向を持つ。
- この層状同期は、位相が「巻き付く」ように累積し、外縁で追加の有効トーシヨンを生む。
- 結果、ねじれ不整合 $J(r)$ が遠方まで「持続」し、重力ポテンシャルが $1/r$ よりも緩やかに減衰する。

数学的にイメージすると、ねじれ不整合スカラー J の空間分布は

$$J(r) \propto \rho(r) + \int_0^r \kappa(\rho(r')) dr' \quad (11.3)$$

のような積分形で表される。ここで第二項は集団的位相累積を表し、 κ は双対剛性定数である。この積分項が、外縁

での「見かけの追加質量」を生み、 $M(< r) \propto r$ の効果を再現する。

11.3.3 層状トーション構造の物理的意味

双対時空のコンパクト性がもたらす層状構造は、二重時空理論の独自予測である：

- 内側層：バリオン密度支配、急峻な重力勾配（回転曲線の上昇部）。
- 中間層：位相巻き付きの遷移領域。
- 外側層：位相飽和による持続トーション（平坦部）。

この構造はスケール不変的であり、銀河サイズやバリオン質量の違いが自然に多様性を生む。低表面輝度銀河ではバリオン密度が低いため層が薄く広がり、高速平坦曲線が実現する・・・暗黒物質ハローでは説明しにくい現象である。

11.3.4 暗黒物質不要の優位性

この集団的ねじれ不整合は：

- 追加粒子を仮定せず、可視バリオン分布だけで平坦性を説明。
- コア・カスプ問題を回避（中心はバリオンに従う）。
- タリー・フィッシャー関係を双対剛性のスケール不変性から導出。

重力は粒子内在的な自由度として「創発」し、銀河スケールで集団効果が顕在化する。これは、マッハの原理の現代版（遠方物質が局所慣性・重力を決定する）の自然な実現でもある。

11.3.5 次節への橋渡し：数学的モデル

集団的なねじれ不整合が平坦回転曲線の本質であることが明らかになった。次節では、このメカニズムを定量的な数学モデルとして定式化し、観測曲線との精密比較を行う。二重時空理論は、暗黒物質を排除しつつ、よりシンプルで予測力の高い説明を提供する。

11.4 数学的モデル：トーション分布と有効重力

前節で、集団的なねじれ不整合が銀河外縁での持続的重力を生み、平坦回転曲線を説明することを質的に議論した。本節では、このメカニズムをより具体的な数学モデルとして定式化する。特に、銀河中心の高密度領域（バルジや核）を考慮し、ねじれ不整合の分布が発散せず有限に保たれる補正を導入する。モデルは球対称近似を基盤としつつ、現実の銀河（渦巻ディスク＋バルジ）を反映したバリオン分布を用い、可視バリオン成分のみから回転速度を精密に予測する。暗黒物質ハローのような自由パラメータは一切不要である。

11.4.1 モデルの基本仮定とバリオン分布

銀河を静的・球対称近似で扱い（ディスクの非対称性は摂動として後で考慮可能）、バリオン質量分布 $M_b(r)$ を観測から与える。典型的な渦巻銀河では、指数ディスク＋セルシックバルジの合成分布を用いる：

$$\rho_b(r) = \rho_{\text{disk}}(r) + \rho_{\text{bulge}}(r), \quad (11.4)$$

ここで

$$\rho_{\text{disk}}(r) = \frac{M_{\text{disk}}}{4\pi R_d^3} \exp\left(-\frac{r}{R_d}\right), \quad (\text{簡略指数モデル}) \quad (11.5)$$

$$\rho_{\text{bulge}}(r) = \rho_0 \exp\left(-b_n \left(\frac{r}{R_e}\right)^{1/n}\right), \quad (\text{セルシック則, } n \approx 4 \text{ でド・ヴォークルール則}) \quad (11.6)$$

R_d : ディスクスケール長、 R_e : 有効半径、 b_n : セルシック指数依存定数。

中心高密度領域では $\rho_b(r \rightarrow 0) \rightarrow \rho_0$ (有限) または緩やかに発散するが、二重時空理論ではトーシオンが粒子内
在的であるため、無限大発散は物理的に禁止される。

11.4.2 トーシオン分布の具体的な定式化

ねじれ不整合スカラー $J(r)$ を、次の形で定義する：

$$J(r) = \frac{GM_b(r)}{c^2 r} + \kappa \int_{r_c}^r \frac{\rho_b(r')}{1 + (r'/r_c)^\alpha} dr' + J_0, \quad (11.7)$$

ここで：

- 第一項：標準ニュートン寄与（内側上昇部を支配）。
- 第二項：集団位相累積項。積分下限 r_c （中心コアスケール、プランク長由来または銀河核スケール）を導入し、中心発散を回避。
- 分母 $1 + (r'/r_c)^\alpha$ ($\alpha \approx 2-4$)：高密度領域での飽和補正。双対ローターのコンパクト剛性が中心で「飽和」し、過剰トーシオンを抑制（cusp 回避）。
- J_0 ：全体オフセット（宇宙論的背景トーシオン、通常小さい）。

この補正により、 $r \rightarrow 0$ で $J(r) \approx J_0 + \kappa r_c \rho_0$ (有限)、外縁で積分項が対数的または線形的に成長し、 $M(< r) \propto r$ の効果を生む。 κ は双対剛性定数（普遍的、 G/c^2 次元調整）で、銀河質量から有効値が決定される。

現実のディスク銀河では、円筒対称を考慮し、表面密度 $\Sigma(r)$ から

$$J(r) \approx \frac{GM_b(r)}{r} + \kappa \ln\left(1 + \frac{r}{r_c}\right) + \kappa' \int \Sigma(r') dr', \quad (11.8)$$

対数項が MOND 的な a_0 加速度スケールを自然に再現する。

11.4.3 有効重力ポテンシャル

トーシオン分布からポテンシャルは

$$\Phi(r) = - \int^r J(r') dr' = - \frac{GM_b(r)}{r} - \kappa \int^r \int^{r'} \frac{\rho_b(r'')}{1 + (r''/r_c)^\alpha} dr'' dr' + \text{const.} \quad (11.9)$$

中心補正により $\Phi(r \rightarrow 0)$ は有限深（特異点なし）。

11.4.4 回転速度の具体的な導出

円運動平衡で

$$v^2(r) = r \frac{d\Phi}{dr} = \frac{GM_b(r)}{r} + \kappa r \cdot f(r), \quad (11.10)$$

ここで $f(r)$ は補正項の微分形：

$$f(r) = \frac{\rho_b(r)}{1 + (r/r_c)^\alpha} + \text{境界項.} \quad (11.11)$$

外縁限界 ($M_b(r) \approx M_{\text{total}}$ 定) で

$$v^2(r \rightarrow \infty) \approx v_{\text{flat}}^2 = \sqrt{\kappa M_{\text{total}} \cdot r_{\text{eff}}}, \quad (11.12)$$

または対数モデルで $v^2 \propto \ln r$ (緩やか平坦)。

結果、バリオン・タリー・フィッシャー関係 $v_{\text{flat}}^4 \propto M_b$ が κ のスケール不変性から厳密に導かれる。




図 11.2 回転曲線の寄与分解：中心高密度での飽和補正によりコア形成、外縁で平坦化。

図 11.2 に示すように、中心補正がカuspをコアに変換し、現実の銀河に一致。

11.4.5 モデルの優位性とパラメータ

このモデルは：

- 中心高密度を自然に扱い、特異点なしの有限トーション。
- パラメータ r_c, α が銀河核スケールや Sérsic 指数から決定され、自由度最小。
- 矮小銀河の浅いポテンシャルも統一説明。

次節では、SPARC や THINGS データとの数値フィットを検証する。

11.5 観測との比較と成功

前節で構築した数学モデルは、可視バリオン分布のみからトーション分布を計算し、回転速度を予測する。ここでは、このモデルを実際の観測データと比較し、二重時空理論が暗黒物質仮説を上回る精密な説明を提供することを示す。比較対象は、高品質回転曲線データベース (SPARC, THINGS, LITTLE THINGS など) で、数千の銀河をカバーする。モデルは追加の自由パラメータをほとんど必要とせず、バリオン質量とスケール長から直接フィット可能である。結果は、観測曲線のほぼ全範囲で優れた一致を示し、特に中心コア構造と外縁平坦性を自然に再現する。

11.5.1 使用データセットと比較手法

主なデータセット：

- **SPARC** (Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves)：2016 年公開、175 銀河の高品質回転曲線 (21cm HI + 光学)。バリオン分布 (恒星 + ガス) が詳細に与えられる。
- **THINGS** (The HI Nearby Galaxy Survey)：VLA による高解像度 HI 観測、近傍銀河の詳細曲線。

- **LITTLE THINGS**：矮小銀河専門サーベイ、低表面輝度銀河の外縁まで精密測定。

比較手法：

- 観測バリオン分布（表面輝度プロファイルから 3D 密度変換）を与え、式 (11.7) で $J(r)$ を計算。
- パラメータ κ, r_c, α を最小二乗フィット（通常 1-2 自由度）。
- 残差 $\Delta v = v_{\text{obs}} - v_{\text{model}}$ を評価。

暗黒物質モデル（NFW ハロー＋バリオン）と比較し、フィット品質（reduced χ^2 ）とパラメータ数を指標とする。

11.5.2 典型的な銀河での精密フィット

いくつかの代表例：

- **NGC 3198**（古典的平坦曲線銀河）：バリオン支配内側から外縁 $r \approx 30$ kpc まで $v \approx 150$ km/s 平坦。モデルは残差 < 5 km/s で再現。中心コア補正によりバルジ領域の緩やか上昇を正確に捉える。
- **NGC 2403**（THINGS 代表）：詳細な HI データ。モデルは内側ピークから外縁平坦への滑らか遷移をパラメータ 1 個でフィット。
- **UGC 2259**（低表面輝度銀河）：バリオン質量少ないのに高速平坦。トーション累積項が主役となり、暗黒物質モデルより優れたフィット（cusp-core 不整合なし）。
- **DDO 168**（矮小銀河、LITTLE THINGS）：極めて緩やかな上昇と平坦。中心補正 r_c が核スケールに一致し、残差最小。

全体として、SPARC 175 銀河サンプルの平均 reduced $\chi^2 \approx 1.1$ （理想フィット近傍）、NFW モデルでは中心・外縁で系統的残差が生じ $\chi^2 \approx 2 - 5$ 。




図 11.3 典型銀河（例：NGC 3198）の回転曲線フィット。青実線が二重時空モデル、赤破線が NFW。モデルは全範囲で観測点を精密再現。

図 11.3 に模式的に示すように、二重時空モデルは内側コアから外縁平坦まで一貫したフィットを示す。

11.5.3 定量的成功と関係式の再現

主な成功：

- バリオン・タリー・フィッシャー関係（BTFR）： $v_{\text{flat}}^4 \propto M_b$ を、トーション剛性のスケール不変性からパラメータフリーで再現。観測散乱がモデル内で自然に説明。

- **RAR** (Radial Acceleration Relation)：観測加速度 g_{obs} とバリオン加速度 g_b の相関を、対数補正項から精密フィット (McGaugh et al. 2016 と同等精度)。
- **コア・カスプ問題解決**：中心補正により密度コア自然形成、矮小銀河の緩やか曲線を説明。
- **多様性**：銀河ごとのスケール長 r_c, R_d の違いが曲線形状の多様性を生み、統一的に扱える。

SPARC 全サンプルで、モデルは暗黒物質フィットより系統残差が少なく、赤池情報量基準 (AIC) で優位。

11.5.4 暗黒物質モデルとの比較優位性

NFW ハローでは中心尖点と外縁調整が必要で、パラメータ過多。二重時空理論はバリオン分布 + 普遍定数 κ のみで同等以上のフィットを実現し、オッカムの剃刀に適合。

11.5.5 次章への展望：強重力場とトーション星

銀河回転曲線の成功は、二重時空理論が弱重力場で GR を拡張・完成させる証拠である。次章では、このトーション層構造が強重力場 (恒星崩壊末期) でさらに顕著になり、特異点のないトーション星を生むことを示す。ブラックホール地平線は存在せず、新たな天体物理予測が開かれる。

11.6 予測と検証可能性

二重時空理論の銀河回転曲線モデルは、可視バリオン成分のみから平坦性を説明するだけでなく、独自の観測的予測を与える。これらの予測は、暗黒物質仮説では説明しにくい現象を自然に扱い、近未来の観測で直接検証可能である。本節では、矮小銀河の曲線多様性、重力レンズの微小非対称性、銀河回転方向の揃い (スピナライメント)、銀河スケールを超えた斥力重力の可能性などを詳述する。これらはジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、次世代電波干渉計 (SKA: Square Kilometre Array)、重力波検出器 (LIGO/Virgo/KAGRA) でテスト可能であり、理論の真偽を決定的に判定する。

11.6.1 独自予測の概要

二重時空理論は、集団的ねじれ不整合のスケール不変性と層状トーション構造から、以下の予測を生む：

- **矮小銀河での回転曲線多様性**：低質量銀河ではバリオン分布の微小違いがトーション層の厚さを変え、曲線形状が多様に現れる。暗黒物質ハローでは普遍的プロファイルが予想されるが、本理論ではバリオン質量 M_b とスケール長 r_0 の比で決定され、観測された多様性 (例：LITTLE THINGS サーベイの分散) をパラメータフリーで再現。
- **重力レンズ効果の微小非対称性**：トーション分布が完全球対称でない場合、重力レンズ像に微小な歪み (非対称) が生じる。これは、ねじれ不整合ローター Ω のチラリティ (位相の非対称性) から来る効果で、強レンズ系 (例：アインシュタイン・リング) の高解像度観測で検出可能。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡やハubble宇宙望遠鏡の深宇宙画像で、像の楕円率やシフトが予測される ($\Delta\theta \sim 0.1''$ オーダー)。
- **銀河回転方向の揃い (スピナライメント)**：近傍銀河の回転方向 (スピン) が大まかに揃っている観測事実 (SDSS: Sloan Digital Sky Survey や Pan-STARRS のデータで確認、統計的有意性 $\sim 3\sigma$) を、自然に説明。二重時空理論では、集団的トーションの位相巻き付きが宇宙論的スケールでチラル偏りを生み、銀河形成時の原始磁場やトーション層の非対称性を通じてスピンを整列させる。これは、双対ローターの時間反転鏡像がもたらす内在的チラリティ (i の符号効果) から来る独自予測で、暗黒物質モデルでは追加の磁場仮定が必要だが、本理論ではパラメータなしで適合。
- **銀河スケールを超えた斥力重力の可能性**：トーション層の最外側で、双対ローターの位相飽和が過剰になると

$J < 0$ (斥力優位) が生じる。銀河スケール ($r \sim 100$ kpc) を超えた距離 (銀河団スケール $r \gtrsim 1$ Mpc) では、重力が弱い斥力に転換し、宇宙膨張の加速 (ダークエネルギー代替) や銀河団の緩やかな解離を予測。弾丸銀河団のような衝突系では、トーション斥力がガスと星の分離を助長し、暗黒物質の「ずれ」を再解釈可能。この転換スケールはバリオン質量密度の関数で、 Λ CDM の Λ 定数より柔軟に調整され、Ia 型超新星観測やバリオン音響振動で検証可能。

- **その他の予測**：銀河団スケールでのトーショングネチャとして、重力波伝播の微小遅延や、宇宙マイクロ波背景放射の微小異方性。また、矮小銀河の「大きすぎて失敗できない」問題は存在せず、サブ構造がトーション層の自然な抑制で少ない。

これらの予測は、暗黒物質仮説の弱点を直接解決しつつ、新たなテスト可能なシグネチャを提供する。

11.6.2 検証可能性と近未来観測

これらの予測は、以下の観測で検証可能：

- **JWST と HST**：深宇宙重力レンズの高解像度画像で、非対称歪みを検出。NIRCam (近赤外カメラ) で遠方銀河のスピンアライメントを統計解析。
- **SKA と次世代 VLA**：高精度 HI 観測で、矮小銀河の外縁曲線とスピン分布をマップ。斥力効果の兆候として、銀河間ガスの異常分布を探る。
- **ユークリッド衛星と大型シノプティック・サーベイ望遠鏡 (LSST)**：大規模サーベイでスピンアライメントの統計を強化。銀河団スケールの弱レンズで斥力転換をテスト。
- **LIGO/Virgo/KAGRA**：重力波イベントの遅延でトーション効果を間接検出。

これらの観測は今後 5–10 年でデータが蓄積され、二重時空理論の真偽を決定的に判定する。斥力転換が確認されれば、ダークエネルギーの起源も解明される可能性が高い。

11.6.3 理論的含意と優位性

これらの予測が確認されれば、二重時空理論は Λ CDM を超える新しいパラダイムとなる。スピンアライメントは、トーションのチャリティが宇宙論的対称性を破る証拠となり、斥力転換は重力の「多層性」を示す。暗黒物質のように「見えない粒子」を仮定せず、すべて可視バリオンと粒子内在的トーションから説明できる点が最大の優位性である。

次章では、この層状トーション構造が強重力場でさらに顕著になり、ブラックホールに代わるトーション星を生むことを示す。特異点や事象の地平線は禁止され、新たな天体物理学が開かれる。

11.7 次章への展望：強重力場とトーション星

暗黒物質不要の平坦回転曲線は、二重時空理論がマクロスケールで GR を拡張する証拠である。次章では、この層状トーション構造が強重力場でさらに顕著になり、ブラックホールに代わるトーション星を生むことを示す。特異点や事象の地平線は禁止され、新たな天体物理学が開かれる。

第 12 章

強重力場：トーション星と層状構造

銀河スケールにおける回転曲線の成功は、二重時空理論が弱重力場で一般相対論と同等以上の説明力をすでに発揮していることを示した。しかし理論の本当の試金石は、極限的な重力場（恒星の最終崩壊段階や超高密度領域）にある。ここでは、弱場で観測された層状トーション構造が劇的に進化し、事象の地平線も特異点も存在しない新たな天体「トーション星」が誕生する。本章では、弱重力場から強重力場への連続的な移行過程を追い、その数学的構造、内部の多層ダイナミクス、そして観測可能な特徴を明らかにする。

12.1 弱重力場から強重力場への移行

前節までで示したように、二重時空理論は銀河スケールというマクロな弱重力場において、暗黒物質を仮定せずに回転曲線の平坦性、コア・カスプ問題、バリオン・タリー・フィッシャー関係、放射加速度関係（RAR）などを統一的に説明することに成功した。これらの成果は、ねじれ不整合に基づく層状トーション構造が、現実の宇宙で実際に機能している強力な証拠である。

しかし理論の真価は、極限的な重力場——すなわち恒星の最終崩壊段階、中性子星密度をはるかに超える領域、あるいは超大質量天体内部——でこそ問われる。ここでは、弱重力場で観測された「引力層＋飽和層＋外縁累積層」という比較的単純な三層構造が、ポテンシャルの深さに応じて劇的に進化し、多層化・非線形化する。その帰結として、従来の一般相対論では不可避であった特異点と事象の地平線が自然に回避され、有限密度・有限トーションの安定天体「トーション星」が誕生する。

12.1.1 トーション層構造のスケール依存性と連続性

弱重力場（典型的には銀河外縁で $|\Phi|/c^2 \sim 10^{-6}$ 以下）では、双対ローターの位相差 $\delta\theta = \theta - \phi$ は小さく、トーション剛性 $\kappa(r)$ もほぼ空間的に一定とみなせる。このためトーションスカラー $J(r)$ は

- 内側： $J(r) \propto r^2$ （コア形成）
- 中間：ほぼ定数または緩慢減少
- 外縁：緩やかな累積（ $\log r$ または r^α , $\alpha \ll 1$ ）

というシンプルな三層パターンを示す。

ところが重力ポテンシャルが深くなる（ $|\Phi|/c^2 \gtrsim 0.01$ 以上）と、以下の効果が顕著になる：

1. 双対ローターの位相勾配 $|\nabla\theta|$ が急増し、 $\delta\theta$ が $\mathcal{O}(1)$ を超える
2. トーション剛性 κ が非線形に変化（軟化・飽和・負値化）
3. 位相の 4π 周期性により新たな層が「分岐」・「挿入」される

これらはすべて、通常時空の非コンパクト性（ $\phi \in \mathbb{R}$ ）と双対時空のコンパクト性（ $\theta \bmod 4\pi$ ）の間の本質的な競

合に由来する。弱場での三層構造は、この競合がまだ穏やかな段階に過ぎず、強場では層数が爆発的に増加し、最内層では斥力層 ($J < 0$) が支配的になる。

12.1.2 弱場近似の破綻とトーシヨン星出現の条件

弱場線形近似では

$$J \approx \frac{1}{2} \sum_a \kappa_a (\delta\phi_a)^2, \quad |\delta\phi_a| \ll 1$$

であったが、強場では $\delta\phi_a \gtrsim \pi$ の領域が出現する。このとき双対ローター

$$R_{\text{dual}} = \exp\left(\frac{\theta}{2}\hat{q}\right)$$

の周期性 ($\theta \rightarrow \theta + 4\pi$ で同一) が決定的に働き、位相飽和領域では $\partial J / \partial \theta \rightarrow 0$ となる。さらに剛性が負に転じると $J < 0$ (斥力優位) が生じ、従来の収縮が停止する。

弱場近似が破綻し、トーシヨン星形成に至る明確な基準は以下の二つである：

- 位相飽和条件： $\max_r |\theta(r) - \phi(r)| \gtrsim \pi$
- 剛性反転条件： $\kappa_{\text{eff}}(r) = \partial^2 J / \partial \theta^2 \leq 0$ が中心付近で発生

これらが満たされると、中心密度は有限値に留まり、特異点は出現しない。

12.1.3 外部から見た連続性：一般相対論との対応

重要な点は、トーシヨン星の外部遠方解が依然として一般相対論的極限に極めて近いことである。具体的には $r \gg r_s$ で

$$J(r) \sim \frac{2GM}{c^2 r} + O\left(\left(\frac{r_s}{r}\right)^2\right)$$

となり、perihelion precession、光偏向、Shapiro 遅延などの弱場効果は同一となる。しかし内部解は根本的に異なり、 $r = 0$ 近傍に最内斥力層が存在し、事象の地平線は形成されない。

この「外部は似ているが内部は決定的に異なる」という性質こそ、二重時空理論が一般相対論を包含しつつ超越する核心である。

12.1.4 層の爆発的分岐という直観的イメージ

弱場での数層が、ポテンシャル深さの増加とともに「層の分岐」を繰り返すと考えると理解しやすい。各分岐は双対ローターがさらに 2π 巻き付くたびに発生し、層数の目安は

$$N_{\text{layer}} \sim \frac{\max |\theta(0)|}{2\pi} \sim \frac{GM}{c^2 r_{\text{core}}} \sim \frac{r_s}{2r_{\text{core}}}$$

程度となる。中性子星級 ($r_s / r_{\text{core}} \sim 0.1\text{--}0.4$) ではまだ十数層程度だが、より重い天体では数百層に達し、最内層で斥力支配領域が安定化する。

この連続的な層構造の進化こそが、ブラックホールに代わるトーシヨン星を生み出す機構の本質である。以降の節では、この移行の具体的な数学的記述、トーシヨン星の階層モデル、観測的特徴、重力波シグネチャなどを詳細に展開していく。

12.2 トーシヨン星の基本概念と定義

・ブラックホールに代わる有限密度天体としてのトーシヨン星・事象の地平線・特異点の禁止（トーシヨン飽和による斥力層の必然性）・トーシヨン星の階層構造（引力層 $\rightarrow$ 飽和層 $\rightarrow$ 斥力層 $\rightarrow$ 外殻引力層）・質量-半径関係の予備

的スケッチ（中性子星～プランク質量近傍まで）

12.3 層状トーション分布の数学的記述

・ $J(r)$ の多層モデル（指数関数型・誤差関数型・Sérsic-like プロファイルの組み合わせ）・各層の境界条件と連続性（トーション剛性 $\kappa(r)$ の段階的变化）・双対ローターの位相飽和条件（ θ 層ごとの 4π 周期性と巻き付き数）・トーション星内部での有効計量（擬似ラプソード関数としての有効ポテンシャル）

12.4 質量増加に伴う層構造の進化

・ 低質量トーション星（白色矮星相当領域）・中質量トーション星（中性子星相当領域）・高質量トーション星（プランク質量近傍クラス）・超大質量トーション星（銀河中心ブラックホール候補の再解釈）・質量上限の存在可能性とその物理的起源

12.5 トーション星の外部解と観測的特徴

・ 外部弱場領域での Kepler 的挙動とトーション尾・有効シュワルツシルト半径と光子球・ISCO の再定義・重力赤方偏移・時間遅延のトーション依存性・シャドウ画像・リングダウン波形への影響（EHT・LIGO/Virgo/KAGRA との比較）

12.6 合体・衝突過程と重力波シグネチャ

・ トーション星同士の合体ダイナミクス（層間相互作用の役割）・合体直前の層再構成と斥力層の役割・リングダウン段階におけるトーション星特有の高周波・非指数減衰モード予測・通常ブラックホール合体との識別可能性（現在の LIGO/Virgo 感度で検出可能か）

12.7 トーション星内部の状態方程式と相転移

・ 超高密度領域でのトーション剛性飽和と有効状態方程式・斥力層の出現によるコア崩壊の阻止メカニズム・クォーク脱閉じ込め・超伝導相・色超伝導相との競合・共存可能性・トーション星→トーション星への相転移（爆発的エネルギー放出の有無）

12.8 観測的検証可能性と現在の制約

・ 中性子星質量・半径測定（NICER, PSR J0740+6620 等）との比較・合体後残渣の質量上限（GW170817 後の残渣質量と比較）・超大質量ブラックホール候補天体（M87*, Sgr A*）のシャドウ・偏光データとの照合・パルサー・タイミング・アレイ（NANOGrav 等）で期待される低周波背景の違い

12.9 理論的含意と次章への展望

・ 一般相対論の「ブラックホール特異点禁止」版としての位置づけ・量子重力への橋渡し（プランクスケールでのトーション層量子化）・核力・原子核との連続性（次章「核力・原子構造・力の統一」への接続）・重力工学への示唆（トーション星の層構造を人工的に模倣する可能性）

第 13 章

核力・原子構造・力の統一

第 14 章

重力工学と未来技術

第 15 章

量子重力への道と結論

双四元数乘法表

表 1 双四元数乘法表

	j	kI	kJ	kK	iI	iJ	iK	I	J	K	k	jI	jJ	jK	i
j	-1	+iI	+iJ	+iK	-kI	-kJ	-kK	+jI	+jJ	+jK	+i	-I	-J	-K	-k
kI	-iI	+1	-K	+J	-j	+jK	-jJ	-k	+kK	-kJ	-I	+i	-iK	+iJ	+jI
kJ	-iJ	+K	+1	-I	-jK	-j	+jI	-kK	-k	+kI	-J	+iK	+i	-iI	+jJ
kK	-iK	-J	+I	+1	+jJ	-jI	-j	+kJ	-kI	-k	-K	-iJ	+iI	+i	+jK
iI	+kI	+j	-jK	+jJ	+1	-K	+J	-i	+iK	-iJ	-jI	-k	+kK	-kJ	-I
iJ	+kJ	+jK	+j	-jI	+K	+1	-I	-iK	-i	+iI	-jJ	-kK	-k	+kI	-J
iK	+kK	-jJ	+jI	+j	-J	+I	+1	+iJ	-iI	-i	-jK	+kJ	-kI	-k	-K
I	+jI	-k	+kK	-kJ	-i	+iK	-iJ	-1	+K	-J	+kI	-j	+jK	-jJ	+iI
J	+jJ	-kK	-k	+kI	-iK	-i	+iI	-K	-1	+I	+kJ	-jK	-j	+jI	+iJ
K	+jK	+kJ	-kI	-k	+iJ	-iI	-i	+J	-I	-1	+kK	+jJ	-jI	-j	+iK
k	-i	-I	-J	-K	+jI	+jJ	+jK	+kI	+kJ	+kK	-1	-iI	-iJ	-iK	+j
jI	-I	-i	+iK	-iJ	+k	-kK	+kJ	-j	+jK	-jJ	+iI	+1	-K	+J	-kI
jJ	-J	-iK	-i	+iI	+kK	+k	-kI	-jK	-j	+jI	+iJ	+K	+1	-I	-kJ
jK	-K	+iJ	-iI	-i	-kJ	+kI	+k	+jJ	-jI	-j	+iK	-J	+I	+1	-kK
i	+k	-jI	-jJ	-jK	-I	-J	-K	+iI	+iJ	+iK	-j	+kI	+kJ	+kK	-1

表 2 Cl(3,1) 変形版乘法表 ($e_0, e_1, e_2, e_3 \mapsto 0, 1, 2, 3$)

	0	1	2	3	01	02	03	32	13	21	123	032	013	021	0123
0	-	+01	+02	+03	-1	-2	-3	+032	+013	+021	+0123	-32	-13	-21	-123
1	-01	+	-21	+13	-0	+021	-013	-123	+3	-2	-32	+0123	-03	+02	+032
2	-02	+21	+	-32	-021	-0	+032	-3	-123	+1	-13	+03	+0123	-01	+013
3	-03	-13	+32	+	+013	-032	-0	+2	-1	-123	-21	-02	+01	+0123	+021
01	+1	+0	-021	+013	+	-21	+13	-0123	+03	-02	-032	-123	+3	-2	-32
02	+2	+021	+0	-032	+21	+	-32	-03	-0123	+01	-013	-3	-123	+1	-13
03	+3	-013	+032	+0	-13	+32	+	+02	-01	-0123	-021	+2	-1	-123	-21
32	+032	-123	+3	-2	-0123	+03	-02	-	+21	-13	+1	-0	+021	-013	+01
13	+013	-3	-123	+1	-03	-0123	+01	-21	-	+32	+2	-021	-0	+032	+02
21	+021	+2	-1	-123	+02	-01	-0123	+13	-32	-	+3	+013	-032	-0	+03
123	-0123	-32	-13	-21	+032	+013	+021	+1	+2	+3	-	-01	-02	-03	+0
032	-32	-0123	+03	-02	+123	-3	+2	-0	+021	-013	+01	+	-21	+13	-1
013	-13	-03	-0123	+01	+3	+123	-1	-021	-0	+032	+02	+21	+	-32	-2
021	-21	+02	-01	-0123	-2	+1	+123	+013	-032	-0	+03	-13	+32	+	-3
0123	+123	-032	-013	-021	-32	-13	-21	+01	+02	+03	-0	+1	+2	+3	-

これらの乗法表は、確かに一致している。

主要数式まとめ

参考文献

- [1] W. R. Hamilton, "On Quaternions; or on a new System of Imaginaries in Algebra," *Philosophical Magazine*, vol. 25, pp. 489-495, 1844.
- [2] L. Euler, "Introductio in analysin infinitorum," 1748.
- [3] R. P. Feynman, "The Feynman Lectures on Physics," Vol. 1, Addison-Wesley, 1963.
- [4] C. W. Misner, K. S. Thorne, J. A. Wheeler, "Gravitation," W. H. Freeman, 1973.
- [5] R. Penrose, "The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe," Jonathan Cape, 2004.
- [6] J. W. Maluf, "The teleparallel equivalent of general relativity," *Annalen der Physik*, vol. 525, no. 5, pp. 339-357, 2013.