

한가지 형태의 비선형다항임펄스분수계미분방정식의 적분경계값문제에 대한 피보나치연산행렬법

홍성금, 김광혁

경애하는 최고령도자 김정은동지께서는 다음과 같이 말씀하시였다.

《제국주의자들의 경제기술적봉쇄를 짓부시고 우리의 자강력을 급격히 증대시키며 모든 부문을 빨리 발전시키자면 과학기술을 생명선으로 틀어쥐고나가야 합니다.》(《조선로동당 제7차대회에서 한 중앙위원회사업총화보고》 단행본 38페이지)

논문에서는 수많은 수학적모형들로 제기되는 비선형다항임펄스분수계미분방정식의 풀이의 존재성을 논의한 기초우에서 풀이를 구하는 피보나치연산행렬법을 제기하고 일반 피보나치다항식합렬의 수렴성해석을 진행하였다. 또한 선행연구에서 일부 잘못된 표현식들을 수정하였다.

1. 선행연구결과와 문제설정

선행연구[1-3]에서는 단항인 경우 각이한 적분경계조건을 가지는 임펄스분수계미분방정식의 풀이의 존재성과 유일존재성결과를 얻었다.

또한 선행연구[4]에서는 적분경계조건을 가지는 다항임펄스분수계미분방정식의 풀이의 존재성과 피보나치다항식에 대한 캐퓨터분수계도함수의 연산행렬을 구성하고 선형분수계미분방정식과 비선형분수계미분방정식의 피보나치연산행렬법을 고찰하였으며 함수가 피보나치다항식합렬로 전개될 때 수렴성해석과 오차평가를 진행하였다.

그런데 선행연구의 연산행렬표시식에서 정확하지 못한 부분들이 나타났다. 구체적으로 보면 분수계미분연산행렬을 이루는 원소 $\zeta_{\alpha}(i, j)$ 를 표현하는데서 유한합조건에서 조건 $k+1 \geq j$ 가 없었다.

논문에서는 증명을 통하여 아래와 같이 표현해야 정확하다는것을 밝혔다.

$$\zeta_{\alpha}(i, j) = j \sum_{\substack{k=\alpha \\ (i+k)\text{odd} \\ (j+k)\text{odd} \\ k+1 \geq j}}^i \frac{(-1)^{(k-j+1)/2} k! \left(\frac{i+k-1}{2}\right)!}{\left(\frac{i-k-1}{2}\right)! \left(\frac{k-j+1}{2}\right)! \left(\frac{k+j+1}{2}\right)! \Gamma(k+1-\alpha)}$$

또한 실험결과들을 통하여 선행연구[5]에서 1계피보나치연산행렬의 원소의 표시가 잘못되었으며 정확한 표현식을 확인하였다.

그러므로 우리는 선행연구에서 지적한 잘못된 표현들을 바로 수정하고 피보나치다항식에 대한 분수계적분연산행렬을 구성하였으며 분수계미분연산행렬과 분수계적분연산행렬을 리용하여 다음의 다항임펄스분수계미분방정식의 근사풀이를 구하는 방법을 제시하

고 피보나치다항식합렬의 수렴성을 논의하였다.

$$\begin{cases} {}^C D_0^\alpha x(t) = f(t, x(t), {}^C D_0^\beta x(t)) & (t \in I = [0, 1], t \neq t_k, k = 1, 2, \dots, m) \\ \Delta x(t_k) = I_k(x(t_k^-)), \Delta x'(t_k) = J_k(x(t_k^-)) \\ x(0) = 0, aI^\gamma x(1) + bx'(1) = c \end{cases} \quad (1)$$

여기서

$$\begin{aligned} f &\in C(I \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}, \mathbf{R}) \quad (I_k, J_k \in C(\mathbf{R}, \mathbf{R})), \quad 0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m < t_{m+1} = 1 \\ 1 < \alpha \leq 2, \quad 0 < \beta < 1, \quad 1 < \gamma < 2 \quad (a, b, c \in \mathbf{R}) \quad a \neq -b\Gamma(\gamma + 2) \\ \Delta x(t_k) &= x(t_k^+) - x(t_k^-), \quad \Delta x'(t_k) = x'(t_k^+) - x'(t_k^-) \end{aligned}$$

이다.

2. 기 초 지 식

$u(x) \in L_2(0, 1)$ 이 피보나치합렬로 다음과 같이 전개[5]된다고 가정하자.

$$u(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k F_k(x)$$

여기서 n 째 부분합을 $u(x)$ 의 근사로 생각할수 있다.

$$u(x) \approx u_n(x) = \sum_{k=1}^n c_k F_k(x) = C^T \Phi(x)$$

여기서 $C^T = [c_1, c_2, \dots, c_n]$ 이다.

$$\Phi(x) = [F_1(x), F_2(x), \dots, F_n(x)]^T \quad (2)$$

정리 1 만일 $\Phi(x)$ 가 식 (2)와 같이 정의된 피보나치다항식벡토르이면 임의의 $\alpha > 0$ 에 대하여 다음의 관계식이 성립한다.

$$D^\alpha \Phi(x) = x^{-\alpha} M^{(\alpha)} \Phi(x) \quad (3)$$

행렬 $M^{(\alpha)} = (m_{i,j}^{(\alpha)})_{n \times n}$ 은 캐푸터의미에서의 α 계 n 차피보나치미분연산행렬이다. 즉

$$m_{i,j}^{(\alpha)} = \begin{cases} \zeta_\alpha(i, j), & (i \geq \lceil \alpha \rceil, i \geq j) \\ 0, & \text{기타} \end{cases}$$

$$\zeta_\alpha(i, j) = j \sum_{\substack{k=\lceil \alpha \rceil \\ (i+k) \text{ odd} \\ (j+k) \text{ odd} \\ k+1 \geq j}}^i \frac{(-1)^{(k-j+1)/2} k! \left(\frac{i+k-1}{2} \right)!}{\left(\frac{i-k-1}{2} \right)! \left(\frac{k-j+1}{2} \right)! \left(\frac{k+j+1}{2} \right)! \Gamma(k+1-\alpha)} \quad (4)$$

정리 2 만일 $\Phi(x)$ 가 식 (2)와 같이 정의된 피보나치다항식벡토르이면 임의의 $\alpha > 0$ 에 대하여 다음의 관계식이 성립한다.

$$I^\alpha \Phi(x) = x^\alpha N^{(\alpha)} \Phi(x)$$

행렬 $N^{(\alpha)} = (n_{i,j}^{(\alpha)})_{n \times n}$ 은 α 계 n 차 피보나치적분연산행렬이다. 즉

$$n_{i,j}^{(\alpha)} = \begin{cases} \eta_{\alpha}(i, j), & (i \geq \lceil \alpha \rceil, i \geq j) \\ 0, & \text{기타} \end{cases}$$

$$\eta_{\alpha}(i, j) = j \sum_{\substack{k=0 \\ (k+i)\text{odd} \\ (k+j)\text{odd} \\ k+1 \geq j}}^i \frac{(-1)^{(k-j+1)/2} \cdot k! \left(\frac{i+k-1}{2} \right)!}{\left(\frac{i-k-1}{2} \right)! \left(\frac{k-j+1}{2} \right)! \left(\frac{k+j+1}{2} \right)! \Gamma(\alpha+k+1)}$$

3. 기본결과와 계산실례

론의를 간단히 하기 위해 $m=1$, $t_* = t_1$ 이라고 하겠다. 이때 문제 (1)은 다음과 같이 쓸수 있다.

$${}^C D_0^{\alpha} x(t) = f(t, x(t), {}^C D_0^{\beta} x(t)) \quad (t \in I_k, k=0, 1) \quad (5)$$

$$\Delta x(t_*) = I_1(x(t_*^-)), \Delta x'(t_*) = J_1(x(t_*^-)) \quad (6)$$

$$x(0)=0, aI^{\gamma}x(1)+bx'(1)=c \quad (7)$$

여기서 조건들은 식 (1)에서의 조건들과 같다.

만일 $x(t) \in L_2[0, 1]$ 이고 $x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k F_k(t)$ 로 전개된다고 가정하자.

$$x(t) \approx x_n(t) = \sum_{k=1}^n c_k F_k(t) = C^T \Phi(t)$$

라고 하면 정리 1에 의하여 식 (5)에서 분수계도함수항들은

$${}^C D^{\alpha} x(t) \approx t^{\alpha} C^T M^{(\alpha)} \Phi(t), {}^C D^{\beta} x(t) \approx t^{-\beta} C^T M^{(\beta)} \Phi(t)$$

이고 식 (6), (7)에서 1계도함수와 분수계적분은

$$x'(t) \approx C^T M^{(1)} \Phi(t), I^{\gamma} x(t) \approx t^{\gamma} C^T N^{(\gamma)} \Phi(t)$$

로 근사계산할수 있다.

매 구간 I_k 에서 C^T 를 얻기 위하여 점배치를 진행한다.

$$t_k = \frac{k}{n-1}, k=1, 2, \dots, n-\lceil \alpha \rceil$$

따라서 주어진 방정식과 임펄스조건, 경계조건들로련립방정식을 구성한다.

$$\tilde{R}(t_k) = t_k^{\alpha} C^T M^{(\alpha)} \Phi(t_k) - f(t_k, C^T \Phi(t_k), t^{-\beta} C^T M^{(\beta)} \Phi(t_k)) = 0 \quad (t \in I_k, k=0, 1)$$

$$(D^T - C^T) \Phi(t_*) = I_1(C^T \Phi(t_*)), (D^T - C^T) M^{(1)} \Phi(t_*) = J_1(C^T \Phi(t_*))$$

$$C^T \Phi(0) = 0, a t^{\gamma} D^T N^{\gamma} \Phi(1) + b D^T M^{(1)} \Phi(1) = c$$

여기서 I_0 에서 피보나치다항식의 곱수는 C^T 이고 I_1 에서 피보나치다항식의 곱수는 D^T 이다.

우와 같은 비선형련립방정식을 뉴턴반복법을 리용하여 C^T , D^T 와 $x_n(t)$ 를 구한다.

$X = \{x \mid x \in PC^\infty(l, \mathbf{R})\}$ 라고 가정하자.

정리 3 만일 $x \in X$ 이고 적당한 정의 상수 M 이 있어서 $|x^{(i)}(t)| \leq M^i$ ($i \geq 0, \forall t \in [0, 1]$)

이면 $x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k F_k(t)$ 에 대하여 다음의 사실이 성립한다.

$$\textcircled{1} \quad |c_k| \leq \frac{M^{k-1} \cosh(M)}{2^{k-1}(k-1)!}$$

$$\textcircled{2} \quad x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k F_k(t) \text{ 는 절대수렴한다.}$$

정리 4 함수 $x(t)$ 가 정리 3의 가정을 만족시킨다면 나머지항

$$e_n(t) = \sum_{k=n+1}^{\infty} c_k F_k(t)$$

는 다음의 오차한계를 가진다.

$$|e_n(t)| < \frac{\cosh(M) \cdot (M\sigma)^n \cdot e^{\frac{M\sigma}{2}}}{2^n \cdot n!}$$

참 고 문 헌

- [1] 김광혁, 홍성금; 수학, 2, 4, 주체106(2017).
- [2] B. Ahmad, S. Sivasundaram; Nonlinear Anal. Hybrid Syst., 4, 134, 2010.
- [3] X. Fu, X. Bao; Adv. Differ. Equ., 129, 1, 2014.
- [4] Y. Liu; Mathematical Methods in the Applied Sciences, 39, 5436, 2016.

주체107(2018)년 6월 5일 원고접수

Fibonacci Operational Matrix Method for Solving an Integral Boundary Value Problem of Nonlinear Multi-Term Fractional Differential Equation

Hong Song Gum, Kim Kwang Hyok

In this paper, we point out some mistakes in a known paper and study on the numerical method for the integral boundary value problem of nonlinear multi-term impulsive fractional differential equation using a Fibonacci operational matrix method. And we consider its convergence.

Key words: Caputo fractional derivative, impulsive fractional differential equation