

## 리만다양체에서 $\alpha$ -반대칭재귀계량접속족에 대하여

전철용, 허달윤

경애하는 최고령도자 김정은동지께서는 다음과 같이 말씀하시였다.

《과학기술부문에서 첨단돌파전을 힘있게 벌려야 하겠습니다.》

선행연구[5]에서는 리만다양체에서 반대칭계량접속을 처음으로 제시하고 반대칭계량접속의 곡률텐소르가 령이면 레비-찌비따접속이 정의된 리만다양체가 공형평탄이라는것을 밝히고 반대칭계량접속이 정의된 리만다양체가 일정곡률다양체로 되기 위한 조건을 밝혔다. 선행연구[5]에 기초하여 선행연구[1]에서는 리만다양체에서  $\pi$ -반대칭비계량접속을 정의하고 그것의 기하학적성질을 연구하였으며 선행연구[2]에서는 이 접속이 중력의 스칼라텐소르리론에 대한 기하학적모형으로 된다는것을 연구하였다. 선행연구[3]에서는 반대칭비계량접속에 대한 슈르의 정리를 연구하였으며 선행연구[4]에서는 리만다양체에서 슈르의 정리를 만족시키는 사영공형반대칭접속을 연구하였다.

본문에서는 리만다양체에서 반대칭계량접속과  $\pi$ -반대칭비계량접속을 일반화하여 새롭게  $\alpha$ -반대칭재귀계량접속족을 정의하고 그것의 기하학적성질들인 체적평탄성, 레비-찌비따접속과의 관계, 공역대칭조건, 일정곡률조건을 연구하였다.

정의 리만다양체  $(M, g)$ 에서  $\forall X, Y, Z \in T(M)$ ,  $\pi \in T^*(M)$ ,  $\alpha \in \mathbf{R}$ 에 대하여

$$\nabla_Z g(X, Y) = 2\alpha\pi(Z)g(X, Y), \quad T(X, Y) = \pi(Y)X - \pi(X)Y \quad (1)$$

를 만족시키는 접속  $\nabla$ 를  $\alpha$ -반대칭재귀계량접속족이라고 부른다. 여기서  $\alpha$ 는 접속족을 표시하는 보조변수이다.

식 (1)의 국부표시는

$$\nabla_k g_{ij} = 2\alpha\pi_k g_{ij}, \quad T_{ij}^k = \pi_j \delta_i^k - \pi_i \delta_j^k \quad (2)$$

이며 이 접속의 접속결수는

$$\Gamma_{ij}^k = \{\delta_{ij}^k\} - \alpha\pi_i \delta_j^k - (\alpha-1)\pi_j \delta_i^k + (\alpha-1)g_{ij}\pi^k \quad (3)$$

이다.

식 (1)에서 보는것처럼  $\alpha=0$ 이면 접속  $\nabla$ 는 선행연구[5]에서 연구된 반대칭계량접속이며  $\alpha=1$ 이면 접속  $\nabla$ 는 선행연구[1]에서 연구된  $\pi$ -반대칭비계량접속이다.

식 (3)을 리용하면  $\alpha$ -반대칭재귀계량접속족  $\nabla$ 의 곡률텐소르는

$$R_{ijk}^l = K_{ijk}^l + \delta_i^l a_{jk} - \delta_j^l a_{ik} + g_{jk} a_i^l - g_{ik} a_j^l - \alpha \delta_k^l \pi_{ij} \quad (4)$$

이다. 여기서  $K_{ijk}^l$ 은 레비-찌비따접속  $\overset{\circ}{\nabla}$ 의 곡률텐소르이고

$$a_{ik} = (\alpha-1) \left[ \overset{\circ}{\nabla}_i \pi_k + (\alpha-1)\pi_i \pi_k + \frac{1}{2}(\alpha-1)g_{ik} \pi_p \pi^p \right] \quad (5)$$

$$\pi_{ij} = \overset{\circ}{\nabla}_i \pi_j - \overset{\circ}{\nabla}_j \pi_i$$

이다.

리만다양체  $(M, g)$  에서  $R_{ijk}^l = 0$  이면 리만다양체  $(M, g, \nabla)$  를 평탄,  $R_{jk} = 0$  이면  $(M, g, \nabla)$  를 리찌평탄,  $P_{ij} = 0$  이면  $(M, g, \nabla)$  를 체적평탄이라고 부른다.

정리 1 리만다양체  $(M, g)$  에서  $\alpha$ -반대칭재귀계량접속족  $\nabla$ 에 대하여 1-형식  $\pi$ 가 닫힌형식이면 리만다양체  $(M, g, \nabla)$ 는 체적평탄이다.

주의 1  $\alpha = 0$  이면 리만다양체  $(M, g, \nabla)$ 는 체적평탄이다.

정리 2 리만다양체  $(M, g)$  에서  $\alpha$ -반대칭재귀계량접속족  $\nabla$ 에 관한 곡률텐소르가 평이면 리만다양체  $(M, g, \overset{\circ}{\nabla})$ 은 공형평탄이다.

주의 2 정리 2의 결과는  $\alpha$ 에 무관계하게 성립한다.

식 (2)와 (3)으로부터  $\alpha$ -반대칭재귀계량접속  $\nabla$ 의 쌍대접속  $\overset{*}{\nabla}$ 에 관한 접속계수는

$$\Gamma_{ij}^k = \{_{ij}^k\} + \alpha \pi_i \delta_j^k - (\alpha - 1) \pi_j \delta_i^k + (\alpha - 1) g_{ij} \pi^k \quad (6)$$

이고 곡률텐소르는 우의 식으로부터

$$R_{ijk}^k = K_{ijk}^l + \delta_i^l a_{jk} - \delta_j^l a_{ik} + g_{jk} a_i^l - g_{ik} a_j^l + \alpha \delta_k^l \pi_{ij} \quad (7)$$

이다. 따라서 식 (4)와 (7)로부터

$$R_{ijk}^k = R_{ijk}^l + 2\alpha \delta_k^l \pi_{ij} \quad (8)$$

가 성립한다.

정리 3 리만다양체  $(M, g)$  에서  $\alpha$ -반대칭재귀계량접속족  $\nabla$ 에 대하여 다음의 식은 접속변환  $\overset{\circ}{\nabla} \rightarrow \nabla$ ,  $\overset{\circ}{\nabla} \rightarrow \overset{*}{\nabla}$ 에 관하여 불변이다.

$$C_{ijk}^l + C_{ijk}^{\overset{*}{l}} = 2 \overset{\circ}{C}_{ijk}^l \quad (9)$$

여기서  $C_{ijk}^l$ ,  $C_{ijk}^{\overset{*}{l}}$  및  $\overset{\circ}{C}_{ijk}^l$ 은 각각 접속  $\nabla$ ,  $\overset{*}{\nabla}$  및  $\overset{\circ}{\nabla}$ 에 관한 와일공형곡률텐소르이다.

주의 3 정리 3의 결과는  $\alpha$ 에 무관계하다. 그리고 정리 3의 식 (9)로부터  $C_{(ijk)}^l + C_{(ijk)}^{\overset{*}{l}} = 0$ 이 성립한다. 여기서  $(\cdot)$ 는 첨수의 원순환을 표시한다.

리만다양체  $(M, g)$  에서 비계량접속  $\nabla$ 와 그것의 쌍대접속  $\overset{*}{\nabla}$ 에 대하여  $R_{ijk}^l = R_{ijk}^{\overset{*}{l}}$ 이면  $\nabla$ 를 공액대칭,  $R_{jk}^* = R_{jk}^{\overset{*}{*}}$ 이면 공액리찌대칭,  $P_{jk}^* = P_{jk}^{\overset{*}{*}}$ 이면  $\nabla$ 를 공액체적대칭이라고 부른다.

정리 4 리만다양체  $(M, g)$  에서 반대칭재귀계량접속족  $\nabla$ 에 대하여 1-형식  $\pi$ 가 닫힌형식이면  $\alpha$ -반대칭재귀계량접속족  $\nabla$ 는 공액대칭이다.

증명 1-형식  $\pi$ 가 닫힌형식이면  $\pi_{ij} = 0$ 이다. 따라서 식 (8)로부터  $R_{ijk}^l = R_{ijk}^{\overset{*}{l}}$ 이다.(증명끝)

정리 5 리만다양체  $(M, g)$ 에서  $\pi$ -반대칭재귀계량접속속  $\nabla$ 가 공액대칭이기 위해서는 그것이 공액리찌대칭일것이 필요하고 충분하다.

정리 6 리만다양체  $(M, g)$ 에서  $\pi$ -반대칭재귀계량접속속  $\nabla$ 가 공액대칭이기 위해서는 그것이 공액체적대칭일것이 필요하고 충분하다.

주의 4  $\alpha$ -반대칭비계량접속속  $\nabla$ 에 대하여 지금까지 고찰한 성질들은  $\alpha$ 의 값에 무관계한 성질들이다.

리만다양체  $(M, g)$ 의 임의의 점  $P$ 에서 접속  $\nabla$ 에 관한 단면곡률이 2차원방향  $E(T_P(M))$ 의 임의의 2차원부분공간선택에 무관계하면 곡률텐소르는

$$R_{ijk}^l = k(P)(\delta_i^l g_{jk} - \delta_j^l g_{ik}) \quad (10)$$

이다. 만일  $k(P) = \text{const}$ 이면 리만다양체  $(M, g, \nabla)$ 는 일정곡률다양체이다.

정리 7 련결인 리만다양체  $(M, g)$  ( $\dim M > 2$ )에서 반대칭재귀계량접속속  $\nabla$ 에 관한 임의의 점에서의 단면곡률이 2차원방향  $E$ 의 선택에 무관계하고

$$\alpha = 1 \quad (11)$$

일 때에만 리만다양체  $(M, g, \nabla)$ 는 일정곡률다양체이다.

증명 리만다양체  $(M, g, \nabla)$ 에서 반대칭재귀계량접속속  $\nabla$ 의 곡률텐소르에 대한 제2종비양끼항등식

$$\nabla_h R_{ijk}^l + \nabla_i R_{jkh}^l + \nabla_j R_{hik}^l = T_{hi}^p R_{jpk}^l + T_{ij}^p R_{hpk}^l + T_{jh}^p R_{ipk}^l$$

에 식 (10)을 대입하고 식 (2)를 리용하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & \nabla_h k(\delta_i^l g_{jk} - \delta_j^l g_{ik}) + \nabla_i k(\delta_j^l g_{hk} - \delta_h^l g_{jk}) + \nabla_j k(\delta_h^l g_{ik} - \delta_i^l g_{hk}) + \\ & + 2\alpha[\pi_h(\delta_i^l g_{jk} - \delta_j^l g_{ik}) + \pi_i(\delta_j^l g_{hk} - \delta_h^l g_{jk}) + \pi_j(\delta_h^l g_{ik} - \delta_i^l g_{hk})] = \\ & = 2k[\pi_h(\delta_i^l g_{jk} - \delta_j^l g_{ik}) + \pi_i(\delta_j^l g_{hk} - \delta_h^l g_{jk}) + \pi_j(\delta_h^l g_{ik} - \delta_i^l g_{hk})] \end{aligned}$$

이 식을  $i, l$ 에 관하여 축약하면

$$(n-2)(g_{jk}\nabla_h k - g_{hk}\nabla_j k) - 2(n-2)\alpha k(g_{jk}\pi_h - g_{hk}\pi_j) = 2k(\pi_h g_{jk} - \pi_j g_{hk})$$

이다. 이 식의 양변에  $g^{jk}$ 를 곱하고 축합을 실시하면

$$(n-1)(n-2)\nabla_h k - 2(n-1)(n-2)k\alpha\pi_h = 2(n-1)(n-2)k\pi_h$$

이다.  $\dim M > 2$ 이므로

$$\nabla_h k - 2(\alpha-1)k\pi_h = 0$$

이다. 식 (11)을 리용하면  $k = \text{const}$ 이다. 결국 리만다양체  $(M, g, \nabla)$ 는 일정곡률다양체이다.(증명끝)

주의 5 정리 7로부터  $\alpha$ -반대칭재귀계량접속속  $\nabla$ 가 일정곡률성을 허용하는것은  $\alpha = 1$ 인 경우뿐이다.  $\alpha = 1$ 이면 반대칭재귀계량접속속

$$\nabla_k g_{ij} = 2\pi_k g_{ij}, \quad T_{ij}^k = \pi_j \delta_i^k - \pi_i \delta_j^k$$

를 만족시키는 접속으로서 접속결수는

$$\Gamma_{ij}^k = \{\pi_j^k\} - \pi_i \delta_j^k$$

이다. 이 접속은 선행연구[1]에서 연구되었으며 선행연구[2]에서는 중력의 스칼라텐소르리론에 대한 기하학적모형으로 제시되었다.

## 참 고 문 헌

- [1] 김일성종합대학학보(자연과학), 49, 3, 3, 주체92(2003).
- [2] K. A. Dunn; Tensor, NS, 29, 214, 1975.
- [3] Han Yanling et al.; IJG, 5, 1, 47, 2016.
- [4] T. Y. Ho et al.; J. of Yanbian University(Natural Sciece), 40, 4, 290, 2014.
- [5] K. Yano; Rev. Roum. Math. Pures et Appl., 15, 1579, 1976.

주체109(2020)년 3월 15일 원고접수

## **On $\alpha$ -Semi-Symmetric Metric Recurrent Connection Family in a Riemannian Manifold**

*Jon Chol Yong, Ho Tal Yun*

In this paper we newly defined  $\alpha$ -semi-symmetric metric recurrent connection family in a Riemannian manifold and we studied the volume flatness, the relation with the Levi-Civita connection, the conjugate symmetry condition and the constant curvature condition of this connection family.

Keywords: metric recurrent connection family, volume flatness, conjugate symmetry condition