

일반콤팩트다양체우의 해밀턴계의 불변모임의 특징짓기

정 우 환

해밀턴방정식의 불변모임은 대상체계의 점근거동을 해석하는데서 기초로 되며 전형적인 불변모임들로서는 평형점, 주기궤도, 불변고리들이 있다.

선행연구[6]에서는 심플렉틱다양체 $(\mathbf{R}^{2n}, \omega_0)$ (여기서 ω_0 은 \mathbf{R}^{2n} 우의 표준심플렉틱크구조)우의 해밀턴방정식에는 르베그측도의 의미에서 거의 모든 콤팩트정칙에너르기곡면우에 주기궤도가 존재한다는것을, 선행연구[2]에서는 정칙에너르기곡면 S 가 유계볼록구역을 둘러싸는 경우에는 S 우에 적어도 2개의 주기궤도가 존재한다는것을 밝혔으며 선행연구[4]에서는 섭동해밀턴계인 경우에, 선행연구[5, 7]에서는 일반적으로는 섭동형이 아닌 해밀턴계인 경우에 불변고리가 존재하기 위한 충분조건을 밝혔다.

한편 선행연구[3]에서는 력학적인 대상체계의 상태공간으로서 자주 제기되는 특수한 콤팩트다양체인 k 차원고리 T^k 의 여접다발우에서 정의된 해밀턴함수에 관한 해밀턴상미분방정식에 대하여 다양체우에서 정의된 주어진 함수의 미분의 그래프가 불변모임이기 위해서는 그 함수가 대응되는 해밀턴-야코비편미분방정식의 풀이일것이 필요하고 충분하다는것을 밝혔으며 선행연구[1]에서는 선행연구[3]에서의 결과를 유클리드공간에 묻혀진 콤팩트다양체의 여접다발우에서 정의된 강압적해밀턴함수에 관한 해밀턴상미분방정식인 경우에 대하여 일반화하였다.

론문에서는 다양체가 유클리드공간에 묻혀있다는 가정[1]을 없애고 일반적인 콤팩트다양체의 여접다발우에서 정의된 해밀턴함수에 관한 해밀턴상미분방정식인 경우로 선행연구[3]의 결과를 일반화한다.

먼저 기호들을 약속하자.

$m \in \mathbf{N}$ 이라고 하고 M 은 하우스돌프공리와 제2셈공리를 만족시키는 m 차원 C^∞ 콤팩트다양체이다. 점 $q \in M$ 에서의 M 의 접공간을 $T_q M$ 으로, 선형공간 $T_q M$ 의 공액공간을 $T_q^* M = L(T_q M, \mathbf{R})$ 로 표시한다. M 의 여접다발 $T^* M = \bigcup_{x \in M} T_x^* M$ 에 대하여 $\tau^*: T^* M \rightarrow M$ 을 $\tau^*(p) = q$ ($\forall p \in T_q^* M$)로 정의한다. M 의 $T^* M$ 우의 점을 $q \in M$ 과 $p \in (\pi^*)^{-1}(q)$ 에 관하여 (q, p) 와 같이 표시한다. M 의 $T^* M$ 우의 자연스러운 심플렉틱크구조를 Ω 로 표시한다.

정의 1 $r \in \mathbf{N} \cup \{\infty\}$: $r \geq 2$ 라고 할 때 C^r 급함수 $H: T^* M \rightarrow \mathbf{R}$, $(q, p) \mapsto H(q, p)$ 를 다양체 M 우의 해밀턴함수라고 부른다.

임의의 $\xi \in T^* M$ 에 대하여 관계식 $d_\xi H(\eta) = \Omega_q(X_H(\xi), \eta)$ ($\forall \eta \in T_\xi(T^* M)$)를 만족시키는 유일한 벡토르 $X_H(\xi) \in T_\xi(T^* M)$ 이 존재하는데 다양체 $T^* M$ 우의 C^1 급벡토르마당 $X_H: T^* M \rightarrow T(T^* M)$ 을 해밀턴함수 $H: T^* M \rightarrow \mathbf{R}$ 에 관한 해밀턴벡토르마당이라고 부른다.

$T^* M$ 우의 상미분방정식

$$\dot{y} = X_H(y) \quad (1)$$

를 H 를 해밀턴함수로 하는 해밀턴방정식이라고 부른다.

초기조건 $y(0)=\xi (\in T^*M)$ 를 만족시키는 해밀턴방정식 (1)의 연장불가능풀이를 $\varphi^H(t, \xi)$, $t \in I(\xi)$ 로 표시한다. 여기서 $I(\xi) \subset \mathbf{R}$ 는 $0 \in I(\xi)$ 인 열린구간이다.

$D_H = \{(t, \xi) \in \mathbf{R} \times T^*M; t \in I(\xi)\}$ 라고 놓으면 C^1 급넘기기 $\varphi: D_H \rightarrow T^*M; (t, \xi) \mapsto \varphi(t, \xi)$ 를 해밀턴미분방정식 (1)의 상흐름이라고 부른다.

임의의 $\xi \in T^*M$ 에 대하여 $I(\xi) = \mathbf{R}$ 가 성립할 때 해밀턴방정식 (1)은 완비이라고 말한다. 이때 $D_H = \mathbf{R} \times T^*M$ 이 성립된다.

정의 2 $q \in M$ 에 관하여 평등적으로 $|H(q, p)| \rightarrow +\infty$ ($\|p\| \rightarrow +\infty$)가 성립될 때 해밀턴함수 $H: T^*M \rightarrow \mathbf{R}$ 는 강압적이라고 말한다.

정리 1 $H: T^*M \rightarrow \mathbf{R}$ 를 다양체 M 위의 강압적해밀턴함수라고 하면 H 를 해밀턴함수로 하는 해밀턴방정식 (1)은 완비이다.

증명 선행연구[1]의 정리 1의 증명에서와 같은 방법으로 증명된다.(증명끝)

정의 3 E 를 심플렉틱선형공간, $\omega: E \times E \rightarrow \mathbf{R}$ 를 E 위의 심플렉틱2-형식이라고 한다.

$F \subset E$ 를 부분선형공간이라고 하고 $\omega(u, v) = 0$ ($\forall u, v \in F$)이 성립된다고 할 때 F 를 심플렉틱선형공간 E 의 라그랑주부분공간이라고 부른다.

보조정리 1 F 를 심플렉틱선형공간 (E, ω) 의 라그랑주부분선형공간이라고 하자.

만일 $u \in E$ 가 임의의 $v \in F$ 에 대하여 $\omega(u, v) = 0$ 을 만족시키면 $u \in F$ 가 성립된다.

정의 4 (S, ω) 를 심플렉틱다양체라고 하고 $N \subset S$ 를 C^1 급부분다양체라고 한다.

임의의 $x \in N$ 에 대하여 $T_x N$ 이 $T_x S$ 의 심플렉틱2-형식 $\omega_x: T_x S \times T_x S \rightarrow \mathbf{R}$ 에 관한 라그랑주부분공간일 때 N 을 심플렉틱다양체 S 의 라그랑주부분다양체라고 부른다.

보조정리 2 σ 를 C^∞ 유한차원다양체 L 위의 C^1 급1차미분형식이라고 한다.

이때 σ 의 그래프 $\text{Graph}(\sigma) := \{(x, \sigma_x) \in T^*L; x \in L\}$ 이 L 의 여접다발 T^*L 의 라그랑주부분다양체이기 위하여서는 σ 가 닫긴미분형식일것이 필요하고 충분하다.

정의 5 $c \in \mathbf{R}$ 일 때 미지함수 $u: M \rightarrow \mathbf{R}$ 에 관한 1계편미분방정식

$$H(q, d_q u) = c \quad (2)$$

를 해밀턴-야코비방정식이라고 부른다.

정리 2 $u: M \rightarrow \mathbf{R}$ 를 C^2 급함수라고 할 때 $x \mapsto (x, d_x u)$ 로 정의되는 넘기기 $du: M \rightarrow T^*M$ 의 그래프 $\text{Graph}(du) = \{(q, d_q u) \in T_q^*M; q \in M\} \subset T^*M$ 이 H 의 해밀턴상흐름 φ^H 에 관하여 불변이기 위하여서는 H 가 $\text{Graph}(du)$ 위에서 상수일것이 필요하고 충분하다. 즉 $\text{Graph}(du)$ 가 H 의 φ^H 에 관하여 불변이기 위하여서는 함수 $u: M \rightarrow \mathbf{R}$ 가 어떤 $c \in \mathbf{R}$ 에 관하여 해밀턴-야코비방정식 (2)의 풀이가 될것이 필요하고 충분하다:

$$H(q, d_q u) = c \quad (\forall q \in M)$$

증명 $N = \text{Graph}(du)$ 라고 하자.

(충분성) H 가 N 위에서 상수이면 $\forall \xi \in N, \forall v \in T_\xi N, d_\xi H(v) = 0$ 이 성립된다.

해밀턴벡토폴라마당의 정의로부터 다음의 식이 성립된다.

$$0 = d_\xi H(v) = \Omega_\xi(X_H(\xi), v) \quad (\forall \xi \in N, v \in T_\xi N)$$

이때 보조정리 1로부터 $X_H(\xi) \in T_\xi N$ ($\xi \in N$) 이 성립된다. 여기서 $Y: N \rightarrow TN$ 을 $Y(\xi) = X_H(\xi) \in T_\xi(T^*M)$ ($\xi \in N$) 으로 정의하면 Y 는 N 우의 C^0 급벡터르마당이 된다.

$\xi_0 \in N$ 을 임의로 취하면 초기조건 $y(0) = \xi_0$ 을 만족시키는 해밀턴방정식 (1)의 연장 불가능풀이는 $\varphi_t^H(\xi_0)$ ($t \in \mathbf{R}$) 로 주어진다.

한편 꼬쉬-빼아노의 정리로부터 초기값문제 $\dot{y} = Y(y)$, $y(0) = \xi_0$ 의 국부적풀이가 존재하며 벡터르마당 X_H 의 완비성으로부터 이 초기값문제의 연장 불가능풀이로서 $(-\infty, +\infty)$ 에서 정의되는것이 존재한다. 이것을 $\psi(t, \xi_0) \in N$ ($t \in (-\infty, +\infty)$) 로 표시하면 벡터르마당 Y 의 정의와 상미분방정식의 초기값문제의 풀이의 유일성으로부터 $\varphi_t^H(\xi_0) = \psi(t, \xi_0) \in N$ ($t \in (-\infty, +\infty)$) 이 성립된다.

따라서 부분모임 $N = \text{Graph}(du) \subset T^*M$ 은 φ^H 에 관하여 불변이다.

(필요성) $N = \text{Graph}(du)$ 가 해밀턴상흐름 φ^H 에 관하여 불변이라고 가정하자.

이때 임의의 $\xi \in N$ 에 대하여 곡선 $t \mapsto \varphi_t^H(\xi) \in N$ 의 $t=0$ 에서의 접선벡터르는 $X_H(\xi)$ 이며 $X_H(\xi) \in T_\xi N$ 이 성립된다.

한편 $d(du) = 0$ 이므로 보조정리 2로부터 $N = \text{Graph}(du)$ 는 T^*M 의 라그랑주부분다양체이다. 따라서 $\forall \xi \in N, \forall v \in T_\xi N, d_\xi H(v) = \Omega_\xi(X_H(\xi), v) = 0$ 이 성립된다.

그러므로 H 는 N 우에서 상수이다.(증명끝)

참 고 문 헌

- [1] 김일성종합대학학보 수학, 66, 1, 74, 주체109(2020).
- [2] I. Ekeland; Convexity Methods in Hamiltonian Mechanics, Springer, 34~56, 1990.
- [3] A. Fathi et al.; Proc. ICM, 3, 597, 2014.
- [4] J. Féjoz; arXiv:1102.0923v2 [math.DS], 1, 2011.
- [5] A. González et al.; J. Differential Equations, 245, 1243, 2008.
- [6] B. Hasselblatt et al.; Handbook of Dynamical Systems, 1, 14, 15, 2002.
- [7] Wu Hwan Jong et al.; Chaos. Solitons & Fractals, 68, 114, 2014.

주체109(2020)년 12월 5일 원고접수

Characterization of Invariant Set of Hamiltonian System on General Compact Manifolds

Jong U Hwan

It was proved that the graph of differentiation of C^2 function $u: M \rightarrow \mathbf{R}$ defined on general compact manifold M which is not embedded in an Euclid space is invariant under the Hamiltonian system with coercive Hamiltonian $H: T^*M \rightarrow \mathbf{R}$ if and only if u is a solution of the Hamilton-Jacobi equation.

Keywords: compact manifold, Hamiltonian system