

적분법에 의한 랑쪽 제한을 가진 혼합0-1다항식함수의 대역적최량풀이를 구하는 한가지 방법

오용범, 최은철

경애하는 최고령도자 김정은동지께서는 다음과 같이 말씀하시였다.

《새 세기 산업혁명의 불길을 세차게 지펴올려 과학기술의 힘으로 경제강국건설의 전
환적국면을 열어놓아야 하겠습니다.》

론문에서는 현실에서 제기되는 랑쪽 제한을 가진 혼합0-1다항식계획법문제의 대역
적최량풀이를 구하는 방법에 대한 연구를 진행하였다.

1. 문 제 설 정

다음의 최소화문제를 보기로 하자.

$$f(x) = \sum_{j \in J} \eta_j x_1^{\beta_{j1}} \cdots x_n^{\beta_{jn}} \Rightarrow \min \quad (1)$$

$$a_i \leq x_i \leq b_i \quad (i = \overline{1, n_1}), \quad x_i \in \{0, 1\} \quad (i = \overline{n_1 + 1, n})$$

여기서 J 는 목적함수 $f(x)$ 의 단항식들의 첨수모임, n 은 변수의 개수, n_1 은 연속변수의
개수, η_j , a_i 는 실수, b_i 는 부아닌 실수, β_{ji} 는 부아닌 옹근수이다.

선행연구[1]에서는 적분법을 리용하여 직립방체우에서 다항식함수의 대역적최량풀이
를 구하는 방법을 제기하였다. 선행연구[2]에서는 우연탐색방법에 기초한 랑쪽 제한을 가
진 혼합옹근수계획법문제의 풀이법을 제기하였으며 선행연구[3]에서는 0-1제한과 랑쪽
제한을 가진 하나의 배낭제한에 의하여 정의된 혼합0-1배낭다면체를 연구하였다.

선행연구[4]에서는 혼합변수들을 가지는 3차다항식최량화문제에 대한 국부 및 대역적
최량성필요조건들을 제기하고 일반적인 최량화문제에 대한 약국부최량화알고리즘 및 그
것과 보조함수를 결합한 3차다항식의 한가지 대역적최량화방법을 제기하였다.

2. 랑쪽 제한을 가진 혼합0-1다항식계획법문제의 변형과 그 풀이법

$$X = \{x = (x_1, \cdots, x_n)^T \mid a_i \leq x_i \leq b_i \quad (i = \overline{1, n_1}), \quad 0 \leq x_i \leq 1 \quad (i = \overline{n_1 + 1, n})\}$$

$$a_i = 0, \quad b_i = 1 \quad (i = \overline{n_1 + 1, n})$$

로 놓자.

문제 (1)을 다음과 같이 변형하자.

$$F(x, r) = \sum_{j \in J} \eta_j x_1^{\beta_{j1}} \cdots x_n^{\beta_{jn}} - r \sum_{i=n_1+1}^n x_i(x_i - 1) \Rightarrow \min \quad (2)$$

$$a_i \leq x_i \leq b_i \quad (i = \overline{1, n})$$

$-\sum_{i=n_1+1}^n x_i(x_i-1)$ 은 구역 X 에서 부아닌 값을 가지며 구역 X 에서의 최소값점은 문제 (1)

의 허용점이다. 그러므로 보상함수 $P(x)$ 를 $-\sum_{i=n_1+1}^n x_i(x_i-1)$ 로 놓으면 $F(x, \gamma) = f(x) + \frac{1}{\gamma} p(x)$

로 된다.

x^k 는 $F(x^k, \gamma_k) = \max F(x, \gamma_k)$ 에 의하여 결정되는 벡토르이며 매개 k 에 대하여 x^k 가 존재한다.

m 은 정의용근수이고 F_{\max} 는 함수 $F(x, r)$ 의 허용구역

$$X = \{x = (x_1, \dots, x_n)^T \mid a_i \leq x_i \leq b_i \ (i = \overline{1, n})\}$$

에서의 어떤 상계값이며 γ 는 $\gamma < F_{\max}$ 인 어떤 보조변수라고 하자.

보조함수를 $h(x, r, \gamma) = \left(\frac{1}{(F_{\max} - \gamma)^2} (2F(x, r) - F_{\max} - \gamma)^2 \right)^m$ 으로 놓자. 이 보조함수는

r 가 주어졌을 때 $\gamma = F(x, r)$ 인 x 에 대하여서는 $h(x, r, \gamma) = 1$ 이고 $\gamma < F(x, r)$ 인 x 에 대하여서는 $h(x, r, \gamma)$ 의 함수값이 1보다 작으면서 0보다 크며 $\gamma > F(x, r)$ 인 x 에 대하여

서는 $h(x, r, \gamma)$ 의 함수값이 1보다 크며 $\left(\frac{F_{\max} - F(x, r)}{F_{\max} - \gamma} \right)^m$ 보다 크다.

정리 1 임의의 정의용근수 m 에 대하여 다음의 부등식

$$\int_X \left(\frac{1}{(F_{\max} - \gamma)^2} (2F(x, r) - F_{\max} - \gamma)^2 \right)^m dx \geq |X| \quad (3)$$

를 만족시키면 구역 X 에는 $F(x, r) \leq \gamma$ 를 만족시키는 점모임 $D_\gamma = \{x \mid F(x, r) < \gamma\}$ 가 존재한다.

따름 모든 $x \in X$ 에 대하여 $f(x) \geq \gamma$ 이면 임의의 정의용근수 m 에 대하여

$$\int_X \left(\frac{1}{(F_{\max} - \gamma)^2} (2F(x, r) - F_{\max} - \gamma)^2 \right)^m dx \leq |X| \quad (4)$$

이다.

정리 2 모든 $x \in X$ 에 대하여 $F(x, r) \geq \gamma$ 이면 임의의 정의용근수 m_1, m_2 ($m_1 < m_2$) 에 대하여

$$\int_X \left(\frac{1}{(F_{\max} - \gamma)^2} (2F(x, r) - F_{\max} - \gamma)^2 \right)^{m_2} dx \leq \int_X \left(\frac{1}{(F_{\max} - \gamma)^2} (2F(x, r) - F_{\max} - \gamma)^2 \right)^{m_1} dx$$

가 성립한다.

정리 3 $f(x) < \gamma$ 인 $x \in X$ 가 존재한다고 하자. 그러면 어떤 정의용근수 k 가 있어서 $m_1 + k < m_2$ 인 임의의 정의용근수 m_1, m_2 에 대하여

$$\int_X \left(\frac{1}{(F_{\max} - \gamma)^2} (2F(x, r) - F_{\max} - \gamma)^2 \right)^{m_1} dx \leq \int_X \left(\frac{1}{(F_{\max} - \gamma)^2} (2F(x, r) - F_{\max} - \gamma)^2 \right)^{m_2} dx$$

가 성립한다.

함수 $F(x, r)$ 에 대하여 $F(x, r) < F_{\max}$, $x \in X$ 라고 하자. 이때 적분

$$\int_X \left(\frac{1}{(F_{\max} - \gamma)^2} (2F(x, r) - F_{\max} - \gamma)^2 \right)^m dx \quad (5)$$

를 론의한다. 이제 구역 X 를 분할하자. 즉

$$X = \bigcup_{i=1}^L X_i, \quad |X_i \cap X_j| = \emptyset \quad (i \neq j) \quad (6)$$

그러면 $|X| = \sum_{i=1}^L |X_i|$ 이다.

정리 4 X_k 를 $F(x, r)$ 의 유일한 최소점이 놓이는 구역이라고 하자. 즉

$$x^* = \arg \min_{x \in X} F(x, r), \quad x^* \in X_k \quad (7)$$

그때 $\forall \gamma (\gamma < F_{\max})$ 에 대하여 어떤 $m > 0$ (정의용근수)이 있어서

$$V_k(\gamma) = \int_{X_k} \left(\frac{1}{(F_{\max} - \gamma)^2} (2F(x, r) - F_{\max} - \gamma)^2 \right)^m dx > V_i(\gamma) \quad (i \neq k) \quad (8)$$

이다. 여기서 $|X_i| = |X_j| \quad (i \neq j)$ 이다.

3. 계 산 방 식

알고리즘

걸음 1 $a_j^1 = a_j \quad (j = \overline{1, n})$, $b_j^1 = b_j \quad (j = \overline{1, n})$ 로 놓는다.

$t=1, s=1, i=1, H=\{1\}$, $\gamma_1 = F(0, r)$ 로 놓고 F_{\max} 를 구한다. 제곱차수 m , 오차 ε , 구역분할개수 d 와 믿음구역개수 e 를 준다.

걸음 2 허용구역을 d 개로 분할하고 $H = H \cup \{2, \dots, d+1\} \setminus \{t\}$ 에 속하는 모든 k 에 대하여 구역 X_k 에 속하는 허용점 x_k 를 구하고 그 점에서 함수값을 γ_k 로 놓는다. 즉

$$\gamma_k = F(x_k, r), \quad k \in H$$

걸음 3 $\gamma_{i_1} \leq \dots \leq \gamma_{i_e}$ 인 첨수모임 $\{i_1, \dots, i_e\} \subset H$ 를 선택한다. 여기서 $\gamma_{i_1} = \min_{i \in H} \gamma_i$ 이다.

걸음 4 $|X_{i_1}| < \varepsilon$ 이면 정지한다. 최량풀이는 $x^{i_1} \in X_{i_1}$ 이고 최량값은 γ_{i_1} 이다.

걸음 5 매 $t \in \{i_1, \dots, i_e\}$ 에 대하여 $(b_l^t - a_l^t) = \max_{0 \leq j \leq n} (b_j^t - a_j^t)$ 인 l 을 구하고 구역을 분할

한다.

$1 \leq l \leq n_1$ 이면

$$X_{s+1} = \left\{ x \in X_1 \mid a_i^t \leq x_i \leq b_i^t, \quad i \neq l, \quad a_l^t \leq x_l \leq a_l^t + \frac{1}{2}(b_l^t - a_l^t) \right\}$$

$$X_{s+2} = \left\{ x \in X_1 \mid a_i^t \leq x_i \leq b_i^t, \quad i \neq l, \quad a_l^t + \frac{1}{2}(b_l^t - a_l^t) \leq x_l \leq b_l^t \right\}$$

$n_1 + 1 \leq l \leq n$ 이면

$$X_{s+1} = \{x \in X_1 \mid a_i^t \leq x_i \leq b_i^t, i \neq l, x_l = a_l^t\}$$

$$X_{s+2} = \{x \in X_1 \mid a_i^t \leq x_i \leq b_i^t, i \neq l, x_l = b_l^t\}$$

구역 X_{s+1} , X_{s+2} 에 속하는 허용점 x_{s+1} , x_{s+2} 를 구하고 그 점에서 함수값을 γ_{s+1} , γ_{s+2} 로 놓는다.

$$\gamma_{s+1} = F(x_{s+1}, r), \gamma_{s+2} = F(x_{s+2}, r)$$

$$H = H \cup \{s+1\} \cup \{s+2\}, s = s+2, H = H \setminus \{t\}$$

걸음 6 $i=i+1$ 로 놓고 걸음 3에로 이행한다.

정리 5 어떤 m 과 임의의 i 에 대하여 $x^* \in \bigcup_{j \in \{i_1, \dots, i_e\}} X_j$ 가 되게 e 를 선택하였다고 하자.

$\{x^{i_1} \in X_{i_1}\}$, $\{\gamma_{i_1}\}$ 이 우의 알고리즘에 의하여 생성된 점렬, 수렬이라고 하면

$$\lim_{i \rightarrow 2^n} x^{i_1} = x^* \quad (9)$$

$$\lim_{i \rightarrow 2^n} \gamma_{i_1} = f(x^*) \quad (10)$$

이다. 여기서 $x^* = \arg \min_{x \in X} f(x)$ 이다.

참 고 문 헌

- [1] 리종욱; 수리계획법, 김일성종합대학출판사, 130~254, 주체98(2009).
- [2] 오용범; 조선민주주의인민공화국 과학원통보, 2, 24, 주체107(2018).
- [3] C. Mohan et al.; Computational Optimization and Applications, 14, 103, 1999.
- [4] J. P. P. Richard et al.; Math. Program., Ser. B 98, 89, 2003.
- [5] Z. Y. Wu et al.; J Optim Theory Appl., 153, 408, 2012.

주체107(2018)년 9월 8일 원고접수

A Method of Finding a Global Optimal Solution of Mixed 0-1 Polynomial Function with Box Constraints by Integral Method

O Yong Bom, Choe Un Chol

In this paper, we study the minimization problem of a mixed 0-1 polynomial function with box constraints using the integral method that is a new method at deterministic global optimization.

We propose a method of finding global minimum value based on integration of an auxiliary function and its algorithm.

Key word: deterministic global optimization, mixed 0-1 polynomial function