

한가지 형태의 비순간임펄스분수계미분방정식의 주기경계값문제에 대한 풀이의 존재성

김 광 혁

위대한 령도자 김정일동지께서는 다음과 같이 교시하시였다.

《과학과 기술이 매우 빨리 발전하고있는 오늘의 현실은 기초과학을 발전시킬것을 더욱 절실하게 요구하고있습니다.》(《김정일선집》 증보판 제11권 138페이지)

임펄스조건하에서 비선형분수계미분방정식의 풀이의 존재성과 풀이법에 대한 연구가 활발히 진행되고있는데 임펄스조건은 두가지 형태[2]로 나타난다. 즉 변화기간이 전 과정의 지속기간보다 상대적으로 짧은 순간임펄스와 임펄스작용이 임의의 점에서 시작되어 유한시간구간에서 작용이 남아있는 비순간임펄스이다.

비순간임펄스문제는 선행연구[3]에서 소개되었으며 그때부터 많은 연구자들이 이 분야에 대한 연구를 심화시켰다. 그 과정에 비순간임펄스미분방정식에 대한 많은 연구결과들이 발표되었다.[3-5]

선행연구[4]에서는 비순간임펄스비선형1계미분방정식의 초기값문제의 상풀이, 하풀이에 의한 단조반복알고리즘을 제시하고 그 풀이들의 극한이 최대풀이와 최소풀이로 된다는것을 증명하였다.

선행연구[3]에서는 앞에서 발표한 결과를 비순간임펄스비선형분수계미분방정식의 초기값문제로 일반화하였다.

주기경계조건을 가지는 임펄스미분방정식의 풀이의 존재성결과는 순간임펄스인 경우 이미 많은 논문들에서 얻어졌으나 비순간임펄스인 경우 존재성결과는 찾아볼수 없으며 선행연구[3]에서 논의한 문제의 풀이의 존재성결과는 현재까지 밝히지 못하였다.

논문에서는 주기경계조건을 가진 비순간임펄스분수계미분방정식의 풀이의 유일존재성을 밝혔다.

다음과 같은 주기경계조건을 가진 비순간임펄스비선형분수계미분방정식에 대하여 고찰하자.

$$\begin{cases} {}^c D^\alpha u(t) = f(t, u(t)), & t \in (t_i, s_i] \quad (i=0, 1, \dots, p+1) \\ u(t) = g_i(t, u(t), u(s_i-0)), & t \in (s_i, t_{i+1}] \quad (i=0, 1, \dots, p) \\ u(0) = u(T) \end{cases} \quad (1)$$

여기서

$$\alpha \in (0, 1), f: \bigcup_{i=0}^{p+1} [t_i, s_i] \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, {}^c g_i: [s_i, t_{i+1}] \times \mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R} \quad (i=0, 1, \dots, p)$$

$$0 = t_0 < s_0 < t_1 < s_1 < \dots < t_{p+1} < s_{p+1} = T$$

$$u(s_i-0) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} u(s_i - \varepsilon), \quad u(s_i+0) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} u(s_i + \varepsilon)$$

이고 ${}^c D^\alpha$ 는 α 계케푸토미분연산자이다.

주의 $(s_i, t_{i+1}]$ ($i=0, 1, 2, \dots, p$) 을 비순간임펄스구간, $g_i(t, x, y)$ ($i=0, 1, 2, \dots, p$) 를 비순간 임펄스함수라고 부른다.

다음과 같은 공간을 생각하자.

$$PC^1([0, T]) = \left\{ u : [0, T] \rightarrow \mathbf{R} \left| \begin{array}{l} u \in C^1 \left(\bigcup_{i=0}^{p+1} [t_i, s_i], \mathbf{R} \right), u \in C \left(\bigcup_{i=0}^{p+1} [t_i, s_i], \mathbf{R} \right), \\ u(s_i) = u(s_i - 0) < +\infty, u'(s_i) = u'(s_i - 0) < +\infty, u(s_i + 0) < +\infty, \\ u(t_i + 0) < +\infty \quad (i=0, 1, \dots, p+1) \end{array} \right. \right\}$$

$$\|u\|_{PC^1} := \sup_{t \in [0, T]} |u(t)|$$

이때 공간 $PC^1([0, T])$ 는 바나흐공간이다.

정의 1 [1] $\alpha > 0$, 1계케푸토도함수는 다음과 같이 정의한다.

$${}^c D^\alpha u(t) = \int_0^t \frac{(t-s)^{n-\alpha-1}}{\Gamma(n-\alpha)} u^{(n)}(s) ds, \quad n=[\alpha]+1, \quad 0 < t < T$$

여기서 $\Gamma(s)$ 는 보통의 감마함수이다.

정의 2 만일 $u \in PC^1([0, T])$ 가 다음의 조건을 만족시킨다고 하자.

① $\forall t \in (t_i, s_i]$ ($i=0, 1, \dots, p+1$) 에 대하여 $u(t) = u_i^*(t)$ 이고 여기서 $u_i^*(t)$ 는 $u_i^*(t) \in C^1([t_i, s_i], \mathbf{R})$ 이고 ${}^c D_{t_i}^\alpha u_i^*(t) = f(t, u_i^*(t))$ 가 성립한다.

그리고 $u_0^*(t_0) = u_{p+1}^*(s_{p+1})$ ($i=1, \dots, p+1$) 일 때 $u_i^*(t_i) = \tilde{u}_i(t_i)$ 이다.

② $\forall t \in (s_i, t_{i+1}]$ ($i=0, 1, \dots, p$) 에 대하여 $u(t) = \tilde{u}_i(t)$ 이고 여기서 $\tilde{u}_i(t) : [s_i, t_{i+1}] \rightarrow \mathbf{R}$ 에 대하여 $\tilde{u}_i(t_i) = g_i(t, \tilde{u}_i(t), u_i^*(s_i - 0))$ 이 성립한다.

이때 $u(t)$ 를 주어진 문제 (1)의 풀이라고 부른다.

보조정리 1 [3] 다음의 초기조건을 가지는 비선형분수계미분방정식

$$\begin{cases} {}^c D_\tau^\alpha u(t) = f(t, u(t)), \quad t \in [\tau, s_i), \quad \tau \in [t_i, s_i) \quad (i=0, 1, \dots, p+1) \\ u(\tau) = u_\tau, \quad u_\tau \in \mathbf{R} \end{cases}$$

는 적분방정식

$$u(t) = u_\tau + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_\tau^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, u(s)) ds, \quad t \in (\tau, s_i) \quad (i=0, 1, \dots, p+1)$$

와 동등하다.

보조정리 1로부터 보조정리 2를 얻을수 있다.

보조정리 2 문제 (1)과 동등한 적분방정식은 다음과 같다.

$$u(t) = g_p(t_{p+1}, u(t_{p+1}), u(s_p - 0)) + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{t_{p+1}}^T (T-s)^{\alpha-1} f(s, u(s)) ds +$$

$$+ \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, u(s)) ds, \quad t \in [0, s_0]$$

$$u(t) = g_{i-1}(t_i, u(t_i), u(s_{i-1}-0)) + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{t_i}^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, u(s)) ds \quad (2)$$

$$t \in (t_i, s_i] \quad (i=1, 2, \dots, p+1)$$

$$u(t) = g_i(t, u(t), u(s_i-0)), \quad t \in (s_i, t_{i+1}] \quad (k=0, 1, 2, \dots, p)$$

가정 1 $f: \bigcup_{i=0}^{p+1} (t_i, s_i] \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 가 연속이며 다음의 조건을 만족시킨다.

$$\textcircled{1} \quad \exists L_f > 0; \forall x, y \in \mathbf{R} \quad |f(t, x) - f(t, y)| \leq L_f |x - y|$$

$$\textcircled{2} \quad \exists C_f, M_f > 0; |f(t, x)| < C_f + M_f |x|$$

가정 2 $g_i: [s_i, t_{i+1}] \times \mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 가 연속이며 다음의 조건을 만족시킨다.

$$\textcircled{1} \quad \exists L_g, K_g > 0; \forall x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbf{R},$$

$$|g_i(t, x_1, y_1) - g_i(t, x_2, y_2)| \leq L_g |x_1 - x_2| + K_g |y_1 - y_2|$$

$$\textcircled{2} \quad \exists M_g > 0; |g_i(t, x, y)| \leq M_g, \quad \forall t \in [s_i, t_{i+1}] \quad (i=0, 1, 2, \dots, p)$$

$$\text{가정 3} \quad L_T := \left(L_g + K_g + \frac{2L_f T^\alpha}{T(\alpha+1)} \right) \leq 1$$

정리 문제 (1)의 함수들이 가정 1-3을 만족시키면 설정한 문제 (1)은 $PC^1([0, T])$ 에서 유일풀이를 가진다.

실례 다음의 문제를 고찰하자.

$$\alpha = 1/2, \quad 0 = t_0 < s_0 = 0.3 < t_1 = 0.7 < s_1 = 1$$

$${}^c D^{1/2} u(t) = \frac{2+|u(t)|}{40e^{t^2+2}(1+|u(t)|)}, \quad t \in (0, 0.3] \cup (0.7, 1]$$

$$u(t) = \frac{\sin u(t) + t \left(\frac{1}{|u(s_0-0)|+1} \right)}{10}, \quad t \in (0.3, 0.7]$$

$$u(0) = u(1)$$

이때

$$L_f = 1/(40e^2), \quad T = 1, \quad \Gamma(3/2) \approx 0.886 \ 227, \quad L_g = 1/10$$

$$K_g = 0.7/10, \quad M_g = 0.17, \quad C_f = 1/(40e^2) + 1, \quad M_f = 1/(40e^2)$$

이다. 계산결과는 $L_T \approx 0.177 \ 635 < 1$ 이다.

따라서 주어진 방정식의 풀이가 유일존재한다.

참 고 문 헌

- [1] A. A. Kilbas et al.; Theory and Applications of Fractional Differential Equations, Elsevier, 37~123, 2006.
- [2] E. Hernandez et al.; Proc. Amer. Math. Soc., 141, 1641, 2013.

- [3] R. Agarwal et al.; Applied Mathematics and Computation, 334, 407, 2018.
- [4] R. Agarwal et al.; Applied Mathematics and Computation, 298, 45, 2017.
- [5] S. Asawasamrit et al.; Boundary Value Problems, 122, 1, 2016.

주체108(2019)년 12월 15일 원고접수

Existence of Solutions for a Class of Non-Instantaneous Impulsive Fractional Differential Equations with Periodic Boundary Condition

Kim Kwang Hyok

In this paper, we study of existence of unique solution for a non-instantaneous impulsive fractional differential equation with periodic boundary condition using Banach fixed point theorem.

Keyword: fractional differential equation