

$E(s^2)$ 최량초포화계획을 리용한 불완전 2차 2수준 유효초포화계획구성법

김철옥, 김철호

최근에 실험회수를 줄이기 위한 실험계획적연구가 심화되면서 2차초포화계획에 대한 연구가 많이 진행되고있다.

선행연구[2]에서는 완전2차회귀모형에 대한 한가지 3수준계획으로서 합리적인 초포화계획의 구성법을, 선행연구[3]에서는 불완전2차회귀모형에 대한 합리적인 초포화계획으로서 2수준홀더브계획의 구성법들을, 선행연구[4, 5]에서는 같은 모형에서 주효과와 얹힘효과를 추정하기 위한 합리적인 초포화계획의 구성법들을, 선행연구[1]에서는 몇가지 2수준초포화계획들의 구성법을 연구하였다.

론문에서는 $E(s^2)$ 최량초포화계획의 구성법과 그것의 성질을 리용하여 불완전2차회귀모형에 대한 2수준유효초포화계획의 구성법을 연구하였다.

불완전2차회귀모형

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i x_i + \sum_{j < i} \beta_{ij} x_i x_j + \varepsilon, \quad \varepsilon: N(0, \sigma^2) \quad (1)$$

에 대하여 계획구역

$$\Lambda = \{(x_1, x_2, \dots, x_k) : x_i \in \{+1, -1\}, i = 1, 2, \dots, k\} \quad (2)$$

에서의 합리적인 초포화계획을 구성하는 방법을 보기로 하자.

$$D(N) = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{21} & \dots & x_{k1} \\ x_{12} & x_{22} & \dots & x_{k2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1N} & x_{2N} & \dots & x_{kN} \end{pmatrix} \quad (3)$$

을 모형 (1)에 대한 계획(행렬)이라고 하면 불완전2차회귀모형에 대한 미지파라미터개수는 $m = 1 + [(k+1)k]/2$ 이다. 그리고 인자 $x_{i\alpha}$ 들이 가지는 동일한 수준수가 2이므로 $N < m$ 이면 계획 (3)은 모형 (1)에 대한 구역 (2)에서의 초포화계획이다.

이제 계획행렬의 합리성을 위한 유효성기준에 대하여 보기로 하자.

모형 (1)에 대한 독립변수행렬은 $\tilde{D} = (D: D_1)$ 이다. 여기서 $D = (1: D_1)$ 은 $(N \times (k+1))$ 형행렬이고 D_1 은 차모형의 얹힘항에 대응되는 $(N \times k(k-1)/2)$ 형행렬이다.

모형 (1)을 행렬모형으로 바꾸어쓰면

$$y = D\theta_1 + D_1\theta_2 + \varepsilon \quad (4)$$

으로 된다. 여기서 $\theta_1 = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)^T$, $\theta_2 = (\beta_{12}, \beta_{13}, \dots, \beta_{k-1,k})^T$ 이다.

1차주효과모형 $y = D\theta_1 + \varepsilon$ 에서 θ_1 의 최소두계급추정량을 구하면 $\hat{\theta}_1 = (D^T D)^{-1} D^T y$ 이며 모형 (4)를 리용하면 $E\hat{\theta}_1 = \theta_1 + A\theta_2$ 로 된다. 여기서 $A = (D^T D)^{-1} D^T D_1$ 이다.

이때 θ_1 에 대한 불편추정량을 구하자면 $A=0$ 이여야 한다. $A=0$ 이려면 계획행렬 D 와 D_1 에 대하여 $D^T D_1 = 0$ 이면 충분하다.

한편 1차주효과추정에서 정확도를 높이자면 계획행렬 $D(N)$ 에 관하여 D -최량성기준으로서 $\det(D_0^T D_0)$ 을 최대로 하여야 한다.

정의 1 완전2차회귀모형 (1)에 대한 계획 (2)에 대하여 다음의 조건들을 만족시키는 계획을 2차유효초포화계획이라고 부른다.

① $A=0$

② D -최량계획 D_{0*} 에 관하여 $[\det(D_0^T D_0)/\det(D_{0*}^T D_{0*})]^{1/p} \Rightarrow \max$ ($p=k+1$)이다.

정의 1에서 조건 ①은 2차유효초포화계획이 불완전2차회귀모형에서 1차주효과들의 추정을 얹힘효과들과 독립적으로 추정할수 있게 한다는것이며 조건 ②는 2차유효초포화계획이 1차주효과들에 관하여 D -최량성기준의 의미에서 좋은 계획이라는것이다.

정의 2 [1] 0, 1을 원소로 가지는 $(n \times m)$ 형행렬 $B = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{21} & \cdots & x_{m1} \\ x_{12} & x_{22} & \cdots & x_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1n} & x_{2n} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix}$ 이 조건

$$\begin{cases} \sum_{\alpha=1}^n x_{i\alpha} = k, & (i=1, 2, \dots, m) \\ \sum_{i=1}^m x_{i\alpha} = r, & (\alpha=1, 2, \dots, n) \\ \sum_{i=1}^m x_{i\alpha} x_{i\beta} = \lambda & (\alpha \neq \beta, \alpha, \beta=1, 2, \dots, n) \end{cases}$$

를 만족시킬 때 B 를 파라메터 n, m, k, r, λ 를

가지는 BIBD 계획이라고 부르고 $\text{BIBD}(n, m, k, r, \lambda)$ 로 표시한다.

정의 3 [1] 시초블록의 순환에 의하여 만들어지는 0, 1을 원소로 가지는 n 차행렬

$$N = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{21} & \cdots & x_{n1} \\ x_{12} & x_{22} & \cdots & x_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1n} & x_{2n} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

이 조건 $\begin{cases} \sum_{\alpha=1}^n x_{i\alpha} = k & (i=1, 2, \dots, m) \\ \sum_{i=1}^n x_{i\alpha} = k & (\alpha=1, 2, \dots, n) \end{cases}$ 를 만족시킬 때 N 을 (n, k, k)

형순환계획행렬이라고 부른다.

보조정리[1] $(n, m) = (2k+2, t(2k+1))$ 인 경우에 $E(s^2)$ 최량초포화계획의 존재성과 $\text{BIBD}(2k+2, t(2k+1), k-1, t(k-1), t(k-2)/2)$ 의 존재성은 서로 동등하며 이러한 BIBD 는 존재한다. 여기서 $k \geq 3$ 이고 t 는 짝수이다.

$(n, m) = (2k+2, t(2k+1))$ 일 때 $(n \times m)$ 형초포화계획 X 가 $E(s^2)$ 최량이기 위해서는

$$XX^T = \begin{pmatrix} m & -t & \cdots & -t \\ -t & m & \cdots & -t \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -t & -t & \cdots & m \end{pmatrix}$$

일것이 필요하고 충분하다.

정리 X 가 $t < (k+1)/2 + 1/k$ 을 만족시키는 짝수 t 에 관한 다음과 같은 $(k \times t(k-1))$ 형 $E(s^2)$ 최량초포화계획이라고 하자.

$$D = \begin{pmatrix} X^T \\ Y \end{pmatrix} \quad (5)$$

여기서 Y 는 $t/2$ 개 행은 $+1$, 나머지 $t/2$ 개 행은 -1 을 원소로 가지는 $(t \times k)$ 형행렬이다.

그러면 계획 (5)는 모형 (1)에 대한 구역 (2)에서의 2수준유효초포화계획이다.

증명 먼저 계획 (5)의 초포화성을 보자.

계획 (5)의 실험점개수 N 은 $N = t(k-1) + t = tk$ 이며 모형 (1)의 파라미터개수는 $m = k(k+1)/2 + 1$ 이므로 조건 $t < (k+1)/2 + 1/k$ 로부터 $N > m$ 은 성립된다.

다음 계획 (5)가 직교계획이라는것을 보자.

X 가 $E(s^2)$ 최량초포화계획이므로 보조정리로부터

$$XX^T = \begin{pmatrix} t(k-1) & -t & \cdots & -t \\ -t & t(k-1) & \cdots & -t \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -t & -t & \cdots & t(k-1) \end{pmatrix}$$

이며 행렬 Y 의 표시를 고려하면

$$D^T D = \begin{pmatrix} X^T \\ Y \end{pmatrix}^T (X^T : Y) = (XX^T) + (Y^T Y) = \begin{pmatrix} tk & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & tk & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & tk \end{pmatrix} \quad (6)$$

임을 알수 있다. 이것은 계획 (5)에 대하여

$$\sum_{\alpha=1}^{tk} x_{i\alpha} x_{j\alpha} = 0, \quad i \neq j, \quad \sum_{\alpha=1}^{tk} x_{i\alpha}^2 = tk \quad (7)$$

이며 이때 계획 X 의 BIBD 의 성질로부터 계획 (5)의 렬들에 관하여 다음과 같다.

$$\sum_{\alpha=1}^{tk} x_{i\alpha} = 0 \quad (i=1, 2, \dots, k) \quad (8)$$

한편 식 (7), (8)에 의하여 $A = D^T D_1 = 0$ 이 얻어지며 식 (6)으로부터

$$[\det(D_0^T D_0) / \det(D_{0*}^T D_{0*})]^{1/p} = 1$$

이므로 D -최량성도 나온다.(증명끝)

[[참 1 2수준직교표 $L_k(2^r)$ 에서 수준 1을 $(+1, -1)$ 로, 수준 2를 $(-1, +1)$ 로 바꾸어 놓은 $(k \times 2r)$ 형행렬을 X 라고 하자.

그러면 계획 $D = \begin{pmatrix} X^T \\ +I_k \\ -I_k \end{pmatrix}$ 는 실험회수가 $N = 2r$ 인 모형 (1)에 대한 구역 (2)에서 2수준

유효초포화계획이다. 여기서 $+I_k, -I_k$ 는 k 차원행벡토르 즉

$$+I_k = (+1, +1, \dots, +1), \quad -I_k = (-1, -1, \dots, -1).$$

따름 2 N_j ($I=1, 2, \dots, t$) 를 순환계획행렬들이라고 하면 $N=(N_1, N_2, \dots, N_t)$ 는 BIBD($2k+1, t(2k+1), tk, t(k-1)/2$) 이며 $X=\begin{pmatrix} I_m \\ N \end{pmatrix}$ 은 $(2k+2, t(k+1))$ 형 $E(s^2)$ 최량초포화계획으로 된다. 여기서 I_m 은 모든 원소가 +1인 $m=t(2k+1)$ 차행벡토르이다. 이때 $D=\begin{pmatrix} X^T \\ Y \end{pmatrix}$ 에서 첫렬을 제외한 $(tk \times (k-1))$ 형행렬 \bar{D} 는 실험회수가 $N=tk$ 이고 인자의 개수가 $(k-1)$ 인 모형 (1)에 대한 구역 (2)에서 2수준유효초포화계획이다. 여기서 Y 는 $t/2$ 개 행은 +1, 나머지 $t/2$ 개 행은 -1을 원소로 가지는 $(t \times k)$ 형행렬이다.

참 고 문 헌

- [1] M. Liua et al.; Journal of Statistical Planning and Inference, 91, 139, 2000.
- [2] J. Bradley et al.; Technometrics, 43, 1, 2011.
- [3] J. Bradley et al.; Technometrics, 59, 48, 2017.
- [4] T. E. Pieter et al.; Technometrics, 59, 69, 2017.
- [5] B. Jones et al.; Journal of Quality Technology, 45, 121, 2013.

주체108(2019)년 6월 10일 원고접수

Construction of Incomplete Second-Order Two-Level Efficient Supersaturated Design using $E(s^2)$ Optimal Supersaturated Design

Kim Chol Ok, Kim Chol Ho

We establish an efficient supersaturated design for the incomplete second-order regression in two-level design sphere and study the construction method and the property of the incomplete second-order two-level efficient supersaturated design using $E(s^2)$ optimal supersaturated design.

Key words: incomplete second-order regression, efficient supersaturated design