


From VAE to Normalizing Flows, the new GAN

Seobin Park

Variational Auto-Encoder

$$\log p_{\theta}(\mathbf{x}^{(i)}) \geq \mathcal{L}(\theta, \phi; \mathbf{x}^{(i)}) = \mathbb{E}_{q_{\phi}(\mathbf{z}|\mathbf{x})} [-\log q_{\phi}(\mathbf{z}|\mathbf{x}) + \log p_{\theta}(\mathbf{x}, \mathbf{z})]$$

$$\mathcal{L}(\theta, \phi; \mathbf{x}^{(i)}) = \underbrace{-D_{KL}(q_{\phi}(\mathbf{z}|\mathbf{x}^{(i)})||p_{\theta}(\mathbf{z}))}_{\text{Regularizing term}} + \underbrace{\mathbb{E}_{q_{\phi}(\mathbf{z}|\mathbf{x}^{(i)})} [\log p_{\theta}(\mathbf{x}^{(i)}|\mathbf{z})]}_{\text{Reconstruction term}}$$



Normalizing Flows

$z' = f(z)$ 일 때 역함수가 존재하는 f 와 임의의 확률분포 $q(z)$ 에 대해 다음 공식이 성립한다고 합니다.


$$q(z') = q(z) \left| \det \frac{\partial f^{-1}}{\partial z'} \right| = q(z) \left| \det \frac{\partial f}{\partial z} \right|^{-1}$$

따라서 f 를 K 번 적용한 z_K 의 로그확률 $q_K(z_K)$ 값을 다음과 같이 표현할 수 있다고 합니다.

$$\log q_K(z_K) = \log q_0(z_0) - \sum_{k=1}^K \log \det \left| \frac{\partial f_k}{\partial z_k} \right|$$

Glow

Description	Function	Reverse Function	Log-determinant
Actnorm. See Section 3.1.	$\forall i, j : \mathbf{y}_{i,j} = \mathbf{s} \odot \mathbf{x}_{i,j} + \mathbf{b}$	$\forall i, j : \mathbf{x}_{i,j} = (\mathbf{y}_{i,j} - \mathbf{b})/\mathbf{s}$	$h \cdot w \cdot \text{sum}(\log \mathbf{s})$
Invertible 1×1 convolution. $\mathbf{W} : [c \times c]$. See Section 3.2.	$\forall i, j : \mathbf{y}_{i,j} = \mathbf{W}\mathbf{x}_{i,j}$	$\forall i, j : \mathbf{x}_{i,j} = \mathbf{W}^{-1}\mathbf{y}_{i,j}$	$h \cdot w \cdot \log \det(\mathbf{W}) $ or $h \cdot w \cdot \text{sum}(\log \mathbf{s})$ (see eq. (10))
Affine coupling layer. See Section 3.3 and (Dinh et al., 2014)	$\mathbf{x}_a, \mathbf{x}_b = \text{split}(\mathbf{x})$ $(\log \mathbf{s}, \mathbf{t}) = \text{NN}(\mathbf{x}_b)$ $\mathbf{s} = \exp(\log \mathbf{s})$ $\mathbf{y}_a = \mathbf{s} \odot \mathbf{x}_a + \mathbf{t}$ $\mathbf{y}_b = \mathbf{x}_b$ $\mathbf{y} = \text{concat}(\mathbf{y}_a, \mathbf{y}_b)$	$\mathbf{y}_a, \mathbf{y}_b = \text{split}(\mathbf{y})$ $(\log \mathbf{s}, \mathbf{t}) = \text{NN}(\mathbf{y}_b)$ $\mathbf{s} = \exp(\log \mathbf{s})$ $\mathbf{x}_a = (\mathbf{y}_a - \mathbf{t})/\mathbf{s}$ $\mathbf{x}_b = \mathbf{y}_b$ $\mathbf{x} = \text{concat}(\mathbf{x}_a, \mathbf{x}_b)$	$\text{sum}(\log(\mathbf{s}))$



Glow



Glow



Figure 5: Linear interpolation in latent space between real images