

第十四周作业参考答案

习题 6.1

2.

- (1) 收敛域 $(0, +\infty)$, 绝对收敛域 $(0, +\infty)$
- (2) 收敛域 (e^{-3}, e^3) , 绝对收敛域 (e^{-3}, e^3)
- (3) 收敛域 \emptyset
- (4) 收敛域 $(-2, 2)$, 绝对收敛域 $(-2, 2)$
- (5) 收敛域 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 绝对收敛域 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$
- (6) 收敛域 $(-2, 2)$, 绝对收敛域 $(-2, 2)$
- (7) 收敛域 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 绝对收敛域 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$
- (8) 收敛域 $\{x \in \mathbb{R} | x \neq \pm 1\}$, 绝对收敛域 $\{x \in \mathbb{R} | x \neq \pm 1\}$
- (9) 收敛域 \mathbb{R} , 条件收敛域 \mathbb{R}
- (10) 收敛域 $\left(-\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right) \cup \left(\frac{3}{5}, \frac{6}{5}\right)$, 绝对收敛域 $\left(-\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right) \cup \left(\frac{3}{5}, \frac{6}{5}\right)$

3. 各题在收敛域内均为一致收敛

6. 对 $x \in [0, 1]$, $x^{n-1}(x-1)^2$ 在 $x = \frac{n-1}{n+1}$ 处取得最大值:

$$\left(1 - \frac{2}{n+1}\right)^{n-1} \frac{4}{(n+1)^2} \leq \frac{4}{(n+1)^2},$$

由 Weierstrass 判别法, $\sum_{n=2}^{\infty} x^{n-1}(x-1)^2$ 在 $x \in [0, 1]$ 一致收敛.

9. e^{-nx} 对任意固定的 $x \in [0, +\infty]$ 单调, 且 $|e^{-nx}| \leq 1$, 又 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,

由 Abel 判别法, 知 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n e^{-nx}$ 一致收敛.

10. 提示: $|u_n(x)| \leq \max\{|u_n(a)|, |u_n(b)|\} \leq |u_n(a)| + |u_n(b)|$

习题 6.2

2. 因为对 $x \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$, $n \geq 1$, $\frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n} \leq \frac{1}{2^n} \tan \frac{\pi}{6}$, 所以由 Weierstrass 判别法,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n}$ 在 $x \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ 一致收敛, 可以逐项求积分,

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \tan \frac{x}{2^n} dx = \sum_{n=1}^{\infty} -\ln \left| \cos \frac{x}{2^n} \right| \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \ln \frac{2}{\sqrt{3}}$$

3. 见第十三次习题课第 6 题.

4. 提示: 证得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{x^n}$ 在 $x \in [a, b]$, (其中 $b > a > 1$) 一致收敛, 所以 $f(x)$

在 $x \in [a, b]$ 连续, 再由 a, b 任意性可得在 $(1, +\infty)$ 连续.

5. 提示: 由根值判敛法证得绝对收敛, 和函数在 $x = 0$ 处不连续知非一致收敛.

7. $\left(\frac{e^{-nx}}{n^2}\right)' = -\frac{e^{-nx}}{n} \in C(0, +\infty)$. 对任意 $b > a > 0$, 有

$$\left|\frac{e^{-nx}}{n^2}\right| \leq \frac{e^{-na}}{n^2}, \left|-\frac{e^{-nx}}{n}\right| \leq \frac{e^{-na}}{n}, \forall x \in [a, b].$$

于是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx}}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{e^{-nx}}{n^2}\right)'$ 均在 $[a, b]$ 上一致收敛 (Weierstrass),

由一致收敛函数项级数的逐项可微性以及和函数的连续性, 有

$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{e^{-nx}}{n^2}\right)' \in C[a, b]$, 再由 a, b 任意性, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续可微.