Lineare Funktionen

Gerade zeichnen · Gleichung ablesen · Gleichung aus zwei Punkten · Nullstelle gesucht · Punkt auf der Geraden prüfen · Gleichung aus Text · Gemischt: Gerade und Parabel

---


Gerade zeichnen 26 · 25 · 24 · 23 | 21 · 16


Wo steht die Gleichung der linearen Funktion mit m und n? Formelsammlung, Seite _____


1. Welche Funktionen sind linear? Kreuze an. Wähl eine lineare aus und gib ihr m und n an: $m =$ _____, $n =$ _____.


a) $f(x) = 3 - 2x$ ☐ linear
b) $f(x) = x^2 + 1$ ☐ linear
c) $f(x) = 0{,}5x$ ☐ linear

'25 · 1f **2.** Kreuze das Bild an, das den Graphen einer linearen Funktion zeigt. Basis



A ☐


B ☐


C ☐


D ☐


'24 · 1i **3.** Gegeben ist die Gerade $y = 1{,}5x + 1$. Zeichne den Punkt ein, an dem sie die y-Achse trifft. Basis



1: a) und c) | 2: A | 3: Punkt (0|1)

nach P10 ’24 · 3a

4. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = 2x + 3$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.




Gleichung ablesen | 19

5. In einem Koordinatensystem sind die Graphen f, g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet.

nach P10 ’19 · 2b

a) Schreib zu jeder Eigenschaft den Graphen (f, g oder h), der sie hat: „Der Graph hat die Steigung -3.“ „Der Graph liegt parallel zur x-Achse.“



Steigung -3: _____

parallel zur x-Achse: _____

nach P10 ’19 · 2c

b) Ordne jedem Graphen f, g und h eine Gleichung aus dieser Liste zu: $y = -3x + 3$, $y = -\frac{1}{3}x + 3$, $y = -1$, $y = x + 3$, $y = -3x$, $y = x - 3$.

f: _____

g: _____


h: _____

4: Gerade durch (0|3) und (1|5) | 5: a) h; b) −1

Gleichung aus zwei Punkten 25 | 17 · 15

nach P10 '25 · 5a

6. Der Graph einer linearen Funktion f geht durch die Punkte $A(-2\,|\,5)$ und $B(3\,|\,-2{,}5)$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



(1) Der Graph von f steigt monoton. wahr ☐ falsch ☐

(2) Der Graph von f schneidet die y-Achse in $(0\,|\,2)$ wahr ☐ falsch ☐


Gib eine Gleichung von f an.

y = _____

Nullstelle gesucht 22 | 19

nach P10 '22 · 3a

7. Gegeben ist die lineare Funktion $f(x) = -2x + 5$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Gib die Nullstelle von f an.



x = _____

6: Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; −1,5x + 2 | 7: Gerade durch (0|5) und (1|3); 2,5

Punkt auf der Geraden prüfen 26 · 23 | 17

’23 · 1i **8.** Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = -5x + 2$. Einer dieser Punkte liegt nicht auf f. Kreuze ihn an: Basis

A ☐ $(-2\,|\,12)$ B ☐ $(3\,|\,-12)$ C ☐ $(4\,|\,-18)$.

nach P10 ’26 · 5b **9.** Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-2\,|\,7)$ auf dem Graphen von $f(x) = -3x + 1$ liegt.

Gleichung aus Text 23 · 22 | 21 · 16

10. Welche Zahl ist m, welche n? Rechne nicht.

a) Handytarif: 8 € im Monat und 0,09 € je Minute

b) Kerze: 25 cm hoch, brennt je Stunde 2 cm ab

11. Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 360 € und spart 24 € im Monat. Paula beginnt mit 820 € und spart 65 € im Monat.

nach P10 ’22 · 6a **a)** Nach einem Jahr hat Paula 1 600 € gespart. Berechne, wie viel Geld Maxi nach einem Jahr hat.

nach P10 ’22 · 6b **b)** Stelle eine Gleichung für Paulas Guthaben auf (y: Guthaben in €, x: Zahl der Monate). Für Fahrschule und Prüfung braucht Paula 1 800 €. Bestimme, wie viele Monate sie mindestens sparen muss. FOR

8: B | 9: P liegt auf dem Graphen | 10: a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m | 11: a) 1648 €; b) 65x + 820; 16 Monate

12. Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 25 € Miete je Tag, 320 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,35 €. Angebot 2: einmalig 115 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,08 €.

nach P10 ’23 · 3a

a) Die Kosten für einen Miettag sollen für beide Angebote in einem Diagramm dargestellt werden. Gib zu jedem Angebot das passende Diagramm an.



A **B** **C** **D**

Angebot 1 = _____

Angebot 2 = _____

nach P10 ’23 · 3b


b) Herr Mert mietet den Transporter von Montag bis Freitag und fährt insgesamt 450 km. Berechne die Kosten für beide Angebote. Gib an, welches billiger ist. Stelle für Angebot 2 eine Gleichung auf, mit der man die Kosten einer Woche für jede Kilometerzahl berechnen kann. FOR

Gemischt: Gerade und Parabel 26 · 25 · 24 · 23 · 22

’25 · 1h **13.** Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x+4) = -3$. Kreuze ihn an: Basis

A ☐ $x = 1$
B ☐ $x = 3$
C ☐ $x = -2$
D ☐ $x = -3$.

nach P10 ’26 · 5a **14.** Im Koordinatensystem ist die Normalparabel p mit $p(x) = (x-3)^2 - 1$ gezeichnet. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -3x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem. FOR



12: a) C; B; b) 170,50 €; 151,00 €; Angebot 2 günstiger; 0,08x + 115 | 13: D | 14: Gerade durch (0|1) und (1|−2)

15. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$.


nach P10 '24 · 3c **a)** Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-3\,|\,5)$ auf der Parabel p liegt.

nach P10 '24 · 3d **b)** Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten. FOR

S_1: _____

S_2: _____

nach P10 '23 · 4a **16.** Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel p gezeichnet. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = 3x - 2$. Zeichne f in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden: $S(\quad|\quad)$. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



(1) Die Steigung von f ist negativ. wahr ☐ falsch ☐

(2) Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte. wahr ☐ falsch ☐

(3) f schneidet die y-Achse in $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

nach P10 '22 · 3c **17.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 4)^2 - 6$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade f die Parabel p schneidet. FOR

S_1: _____

S_2: _____

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
5a 5b	1f 1h 5a	1i 3a 3c 3d	1i 3a 3b 4a	3a 3c 6a 6b	2a 2b 6a 6c 6d 7a		2a 2b 2c		5a 5b	1c 6a 6b 6c

► Lineare Funktionen

15: a) Nein; b) $S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$ | 16: Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|1)$; $S(2|4)$; Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch | 17: $S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$