Grenzverhalten und Symmetrie

Grenzverhalten gesucht · Grenzverhalten mit e-Funktion · Symmetrie begründen

Grenzverhalten gesucht ●○○○●

GK '22 B2.2a **1.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -\frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{3}x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Gib das Verhalten der Funktionswerte von f für $x \to +\infty$ und für $x \to -\infty$ an.

GK '26 B2.1a **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{2}{3}x^4 + \frac{4}{3}x^3 + 2$ und ihrer Ableitung $f'(x) = \frac{8}{3}x^3 + 4x^2$. Gib das Verhalten von f' für $x \to -\infty$ und für $x \to +\infty$ an.

Grenzverhalten mit e-Funktion ○●○●●

GK '22 B2.1b **3.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = -(x+2) \cdot e^{-x}$. Gib den Grenzwert von f für $x \to +\infty$ an. Beschreibe, wie der Graph von f für große x verläuft.

GK '23 B2.1a **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; ihr Graph ist G. Gib das Verhalten der Funktionswerte von f für $x \to +\infty$ und für $x \to -\infty$ an.

1: für $x \to +\infty$: $f(x) \to -\infty$; für $x \to -\infty$: $f(x) \to +\infty$ | 2: für $x \to -\infty$: $f' \to -\infty$; für $x \to +\infty$: $f' \to +\infty$ | 3: Grenzwert 0; der Graph nähert sich für große x der x-Achse von oben | 4: $f(x) \to +\infty$; $f(x) \to 0$

GK '25 B2.2a **5.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (3 - x) \cdot e^x$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Gib das Verhalten von f für $x \to -\infty$ und für $x \to +\infty$ an.



Symmetrie begründen ○●●○○

GK '24 A1.1a **6.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = x^3 - 9x$. Begründe, dass der Graph von f symmetrisch bezüglich des Koordinatenursprungs ist. ~~TR~~

GK '24 B2.2a **7.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist G_f. Weise nach, dass G_f achsensymmetrisch zur y-Achse ist.

GK '25 B2.1a **8.** Für ein Windrad wird die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{18}x^3 - \frac{3}{2}x$ betrachtet; ihr Graph ist G_f. Weise nach, dass G_f punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung ist.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
B2.1a	B2.1a B2.2a	A1.1a B2.2a	B2.1a	B2.1b B2.2a	B2.2b	B2.1b B2.2b	B2.2a	B1.2a	

▸ Grenzverhalten und Symmetrie
Weiter: Nullstellen · Extrempunkte

5: f(x) → 0; f(x) → −∞ | 6: punktsymmetrisch zum Ursprung | 7: achsensymmetrisch zur y-Achse | 8: punktsymmetrisch zum Ursprung