Lösungen · Wahrscheinlichkeit

1. 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44

2. P(2) = 50 % ..... $P(2) = \frac{3}{6}$

3. P(Staubsaugen) = $\frac{1}{6}$ ≈ 16,7 %

4. $\frac{5}{8}$

5. a) gerade 2/6, ungerade $\frac{4}{6}$ ..... A ungerade $\frac{2}{6}$
b) P(beide ungerade) = $\frac{2}{9}$ ≈ 0,222 ..... $P(\text{beide ungerade}) = \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{6}$

6. a) kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$ ..... 1. Woche: kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$
b) P(Joker, Joker) = $\frac{1}{36}$ ≈ 0,028 ..... $P(\text{Joker, Joker}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$

7. a) mal
b) mal, dann +

8. a) P(34) = 0,125 ..... $P(34) = \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4}$
b) falsch ..... falsch, $P(24) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}$

b) P(24 oder 33) = 18,75 % ..... $P(\text{24 oder 33}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4}$

9. a) Gegenereignis „beide gerade“
b) P(E) = $\frac{7}{9}$ ≈ 0,778 ..... $P(E) = 1 - \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{6}$

10. 4 Kugeln, 2 rote

11. a) P(B ohne Joker) = $\frac{5}{6}$
b) P(Klara Joker) = $\frac{1}{6}$ ≈ 0,167 ..... $P(\text{Klara Joker}) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5}$

12. 3 und 1

13. a) z. B. links 4, 4, 2, 3 und rechts 2, 3, 4, 3
b) P(42) = 12,5 % ..... $P(42) = \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4}$

14. a) z. B. B neu 1, 1, 3, 4, 5, 6 (eine 3 durch 1 ersetzt)
b) P(Summe 3) = $\frac{1}{6}$ ≈ 0,167 ..... $P(\text{Summe 3}) = \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6}$