Bernoulli-Kette mehr

Term deuten · Bernoulli-Kette erkennen

nach GK '17 B3.1f **1.** In einem Werk sind 3 % der hergestellten Smartphones fehlerhaft. Gegeben ist der Term $150 \cdot 0{,}97^s \cdot 0{,}03 + 0{,}97^{150}$. Gib einen Wert von s an, für den der Term im Sachzusammenhang die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses angibt, und beschreibe dieses Ereignis.

GK '19 B4.2e **2.** Zwei Geschwister würfeln jeden Tag einmal mit je einem fairen Würfel. Ist die Augenzahl des älteren kleiner als die des jüngeren, bringt der ältere den Müll hinunter; das geschieht mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{5}{12}$. X ist die Anzahl der Tage, an denen der ältere den Müll hinunterbringt, in 24 Tagen. Gib die Bedeutung des Terms
$\binom{24}{8} \cdot \left(\frac{5}{12}\right)^8 \cdot \left(\frac{7}{12}\right)^{16} + \binom{24}{9} \cdot \left(\frac{5}{12}\right)^9 \cdot \left(\frac{7}{12}\right)^{15} + \binom{24}{10} \cdot \left(\frac{5}{12}\right)^{10} \cdot \left(\frac{7}{12}\right)^{14}$ im Sachzusammenhang an.

GK '20 B4.2b **3.** In einem großen Unternehmen ist ein Drittel der Beschäftigten weiblich. Es werden 40 Beschäftigte zufällig ausgewählt; X ist die Anzahl der weiblichen darunter. Gib die Bedeutung der Aussage $\binom{40}{12} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{12} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{28} + \binom{40}{13} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{13} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{27} \approx 0{,}256$ im Sachzusammenhang an.

GK '18 B3.2g **4.** Von 30 geprüften Bildschirmen sind 5 fehlerhaft. Aus diesen 30 werden nacheinander 8 zufällig ausgewählt, ohne sie zurückzulegen. Beurteile, ob die Anzahl der fehlerhaften Bildschirme unter den 8 ausgewählten binomialverteilt ist.

1: 149; Ereignis: unter 150 zufällig ausgewählten Geräten ist höchstens eines fehlerhaft |
2: 0,436; der ältere bringt in 24 Tagen mindestens 8-mal und höchstens 10-mal den Müll hinunter |
3: 0,256; Die Wahrscheinlichkeit, dass unter den 40 genau 12 oder genau 13 weiblich sind, beträgt etwa 25,6 % |
4: keine Bernoulli-Kette

IQB '23 B2.1a **5.** Ein Würfel trägt auf zwei Seitenflächen die Zahl 5 und auf den übrigen vier Seitenflächen die Zahl 1. Er wird 24-mal geworfen; X ist die Anzahl der Würfe mit einer 5. Begründe, dass X binomialverteilt ist mit $p = \frac{1}{3}$.

IQB '20 B2.1a **6.** Ein Postunternehmen befördert jährlich etwa 50 Millionen Briefe und stellt 92 % davon am ersten Werktag nach der Einlieferung zu. Für 1500 zufällig ausgewählte Briefe wird untersucht, ob sie am ersten Werktag zugestellt werden. Begründe, dass man die Anzahl der am ersten Werktag zugestellten Briefe mit der Binomialverteilung beschreiben kann.

IQB ’21 A2a **7.** Die Zufallsgröße X ist binomialverteilt mit $p = \frac{1}{3}$. Vervollständige die Gleichung $P(X = \square) = \binom{\square}{4} \cdot (\square)^3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4$.

IQB ’24 A12a **8.** Ein Glücksrad hat gleich große Sektoren, 20 % davon sind grün. Es wird zweimal gedreht. Weise nach, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, genau einmal Grün zu erzielen, 32 % beträgt.

IQB ’26 B2.1d **9.** In einer Musik-Sammlung sind 28 % der Lieder Hip-Hop-Songs. Es werden 25 Lieder zufällig ausgewählt; X ist die Anzahl der Hip-Hop-Songs darunter. Gib die Bedeutung der Aussage $\sum_{k=0}^{9} \binom{25}{k} \cdot 0{,}28^k \cdot 0{,}72^{25-k} \approx 0{,}866$ im Sachzusammenhang an.

7: Kästchen der Reihe nach 4, 7 und $\frac{2}{3}$ | 8: 0,32 |
9: 0,866; Mit etwa 86,6 % Wahrscheinlichkeit sind unter den 25 Liedern höchstens 9 Hip-Hop-Songs

IQB '20 A2b

10. Die Zufallsgröße X ist binomialverteilt mit unbekanntem n und $p = 0{,}25$. Formuliere eine Aufgabenstellung im Sachzusammenhang, die mit dem Ansatz $1 - 0{,}75^n < 0{,}5$ gelöst wird, und gib die Lösung an.

10: z. B. Glücksrad mit Gewinn 25 %: Wie oft darf man höchstens drehen, damit die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Gewinn unter 50 %