Nullstellen und Achsenschnittpunkte berechnen Lösungen · mehr

1.	**beide Stellen sind Nullstellen**	p(0,6) = −0,36 + 2,28 − 1,92 = 0; p(3,2) = −10,24 + 12,16 − 1,92 = 0 ⇒ beide Stellen sind Nullstellen
2.	**h(2) = 116,8 cm; h(5) = 625 cm**	h(2) = −3,2 + 120 = 116,8 cm; h(5) = −125 + 750 = 625 cm
3.	**Nullstellen 6 und −2, wobei −2 doppelt**	Produkt null ⇒ ein Faktor null ⇒ Nullstellen 6 und −2, wobei −2 doppelt
4.	**Nullstellen 0 und 4, wobei 4 doppelt**	$x \cdot (\frac{1}{8}x^2 - x + 2) = 0$ ⇒ x = 0 oder $x^2 - 8x + 16 = 0$ ⇒ Nullstellen 0 und 4, wobei 4 doppelt
5.	**Schnittpunkte (0,25|0) und (0|−2)**	8x − 2 = 0 ⇒ x = 0,25; f(0) = −2 ⇒ Schnittpunkte (0,25|0) und (0|−2)
6.	**Schnittpunkte (0|0) und (15|0)**	e-Faktor nie 0 ⇒ x · (−0,2x + 3) = 0 ⇒ x = 0 oder x = 15 ⇒ Schnittpunkte (0|0) und (15|0)
7.	**Schnittpunkte (0|4) und (2|0)**	f(0) = 4; $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 = 0$ ⇒ x = 2 ⇒ Schnittpunkte (0|4) und (2|0)
8.	**Nullstellen 0 und 3**	$x^2 \cdot (x - 3) = 0$ ⇒ Nullstellen 0 und 3
9.	**g(0) = 500 ppm**	g(0) = −450 + 950 = 500 ppm
10.	**Nullstelle 0**	kein Summand ohne x ⇒ f(0) = 0 ⇒ Nullstelle 0