Extrempunkte Lösungen

Extremstelle nachweisen · Extrempunkte gesucht · Hochpunkt mit e-Funktion gesucht

Extremstelle nachweisen ○○○●●

1. **$h'' = \frac{3}{4}\ t - 18$; Maximum; $h(12) = 864$ m**

$h'(t) = \frac{3}{8}\ t^2 - 18t + 162$; $h''(t) = \frac{3}{4}\ t - 18$; $h'(12) = 54 - 216 + 162 = 0$ und $h''(12) = -9 < 0 \Rightarrow$ Maximum; $h(12) = 216 - 1296 + 1944 = 864$ m

2. **waagerechte Tangente; $f(-1 + \sqrt{10}) \approx -18{,}79$**

$(-1 + \sqrt{10})^2 = 11 - 2\sqrt{10} \Rightarrow 0{,}5 \cdot (11 - 2\sqrt{10}) + (-1 + \sqrt{10}) - 4{,}5 = 0 \Rightarrow f'(-1 + \sqrt{10}) = 0 \Rightarrow$ waagerechte Tangente; $f(-1 + \sqrt{10}) = 0{,}5 \cdot (2 - 2\sqrt{10}) \cdot e^{-1+\sqrt{10}} = (1 - \sqrt{10}) \cdot e^{\sqrt{10}-1} \approx -18{,}79$

3. **$f' = -2$; Hochpunkt $(-2|e^2) \approx (-2|7{,}39)$**

$e^{-x} > 0 \Rightarrow f'(x) = 0$ nur für $x = -2$; $f'(-3) = e^3 > 0$, $f'(-1) = -e < 0 \Rightarrow$ Vorzeichenwechsel von + nach − $\Rightarrow$ Hochpunkt $(-2|e^2) \approx (-2|7{,}39)$

Extrempunkte gesucht ○●●●●

4. **Extremstellen -2 und 0**

$f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x \cdot (x + 2) = 0 \Rightarrow$ Extremstellen -2 und 0

5. **$x = 2$; Tiefpunkt $(0|0)$; Hochpunkt $(2|\frac{4}{3})$**

$f'(x) = -x^2 + 2x = -x(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0$ oder $x = 2$; $f''(x) = -2x + 2$: $f''(0) = 2 > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkt $(0|0)$; $f''(2) = -2 < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt $(2|\frac{4}{3})$

6. **$x = 4$; Hochpunkt $(2|4)$; Tiefpunkt $(4|0)$**

$f'(x) = 3x^2 - 18x + 24 = 3(x - 2)(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 2$ oder $x = 4$; $f''(x) = 6x - 18$: $f''(2) = -6 < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt $(2|4)$; $f''(4) = 6 > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkt $(4|0)$

7. **$x = \pm\sqrt{3}$; Hochpunkt $(0|2{,}5)$; Tiefpunkte $(-\sqrt{3}|-2)$ und $(\sqrt{3}|-2)$**

$f'(x) = 2x^3 - 6x = 2x(x^2 - 3) = 0 \Rightarrow x = 0$ oder $x = \pm\sqrt{3}$; $f''(x) = 6x^2 - 6$: $f''(0) = -6 < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt $(0|2{,}5)$; $f''(\pm\sqrt{3}) = 12 > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkte $(-\sqrt{3}|-2)$ und $(\sqrt{3}|-2)$

8. **$x = 3$; Hochpunkt $(-3|3)$, Tiefpunkt $(3|-3)$; $y = -x$, Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten**

$f'(x) = \frac{1}{6}\ x^2 - \frac{3}{2} = 0 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = -3$ oder $x = 3$; $f(-3) = 3$, $f(3) = -3$; $f''(x) = \frac{1}{3}\ x \Rightarrow$ Hochpunkt $(-3|3)$, Tiefpunkt $(3|-3)$; Steigung $(-3 - 3)/(3 + 3) = -1$, durch den Ursprung $\Rightarrow y = -x$, Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten

Hochpunkt mit e-Funktion gesucht ○●●○○

9. **$f' = (2 - x) \cdot e^x$; $x = 2$; Hochpunkt $(2|e^2) \approx (2|7{,}39)$**

$f'(x) = -e^x + (3 - x) \cdot e^x = (2 - x) \cdot e^x$; $e^x > 0 \Rightarrow 2 - x = 0 \Rightarrow x = 2$; $f(2) = e^2 \Rightarrow$ Hochpunkt $(2|e^2) \approx (2|7{,}39)$

10.	**x = 6; f′ wechselt bei 6 das Vorzeichen von + nach −; Hochpunkt (6|3)**	$e^{-\frac{x}{3}+2} > 0 \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - x/3 = 0 \Rightarrow x = 6$; f′ wechselt bei 6 das Vorzeichen von + nach −; $f(6) = 3 \cdot e^0 = 3 \Rightarrow$ Hochpunkt (6|3)