

Notes M18

Mehdi Ben Ahmed

December 7, 2023

Contents

1	Nombres Complexes	2
1.1	Definition	2
1.2	Module et argument	2
1.2.1	Définition	2
1.3	Racine carrée	2
1.3.1	Racine énième	2
1.4	Les Polynomes	3
1.4.1	La formule de Taylor	4
2	Integrales et primitives	5
2.1	Definition	5

1 Nombres Complexes

1.1 Définition

Soit z un nombre complexe. l'écriture $z = a + bi$ est dite la forme algébrique de z .

- a est la partie réelle de z , notée $Re(z)$, si $a = 0$, on dit que z est un imaginaire pur.

- b est la partie imaginaire de z , notée $Im(z)$, si $b = 0$, z est un réel

1.2 Module et argument

1.2.1 Définition

1.3 Racine carrée

Soit z un complexe non nul, on cherche à résoudre l'équation $w^2 = z$ on peut écrire w et z sous forme cartésienne et identifier:

si $z = a + ib, (a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $w = \alpha + i\beta, (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, on obtient: On obtient aussi, d'après l'égalité des modules, $\alpha^2 + \beta^2 = \sqrt{a^2 + b^2}$

1.3.1 Racine énième

Soient w et z deux nombre complexes, on cherche à résoudre l'équation $w^n = z$ avec $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $n > 2$, on utilisera le plus souvent la forme exponentielle.

Définition 1.3.1 *racine n-ième de l'unité* Résolvons $w^n = 1$

1. on emploie la forme polaire, $w = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$
2. n est un entier positif, donc le nombre complexe a n racines
3. la formule pour obtenir un nombre complexe est

$$\sqrt[n]{r}(\cos \alpha + i \sin \alpha)$$
$$\alpha = \frac{\theta + 2k\pi}{n}$$

on obtient donc, pour $w = 4i$:

$$4i = 4(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$$
$$k = 0, \alpha = \frac{\frac{\pi}{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$$
$$w_1 = 2(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$$
$$\Rightarrow w_1 = 2(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}) = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$$

1.4 Les Polynomes

Un polynome est défini comme suit

$$P(x) = 0 + 0_1X + 0_2X^2 + 0_3X^3 + \dots + 0_nX^n$$

polynome comme objet abstrait P

Exemple 1 $p(x) = x^2$ comme polynome

Exemple 2 En Particulier $P = 0$ comme polynome

Définition 1.4.1 on dit que z_0 est une racine de P tel que $P(z_0) = 0$
On utilise le mot racine dans les deux sens

- racine (n -ième) d'un nombre complexe tel que $z_0^n = w$
- racine d'un polynome tel que $P(z_0) = 0$

Définition 1.4.2 Soit P un polynôme
on appelle degré en polynôme
la puissance la plus grande pour laquelle $n \neq 0$

Exemple 3

$$P(x) = 1 + x^2 + x^{27}$$
$$\deg = 27$$

Définition 1.4.3 Question Soit P un polynôme de degré n combien de racine admet-t-il, (complexe et réel)?

Exemple 4

$$P(z) = z^n - 1$$

2 racines réels, et 2 racines complexes

$$z_0 \text{ racines} \iff z_0^2 = 0$$

donc

$$z_0 \text{ est la racine}$$

Définition 1.4.4 Division des polynomes

Théoreme 1 Soit F et G des polynômes, ($\deg F \leq \deg G$)
alors ils existent Q et R tels que $\deg R < \deg G$

$$F = QG + R$$

Si $R = 0$, on dit que F est divisible par G
c'est le principe de la division euclidienne

$x^5 + x^5 + 0x^3 + 3x^2 + x + 1$	$x^3 + 2x + 1$
$x^5 + 2x^3 + x^2$	$x^2 + x - 2$

Exemple 5 Voici un exemple de division polynomial

Définition 1.4.5 Racine d'un polynome P Racine d'un Polynome P , $P(z_0) = 0$
la multiplicité de la racine z_0 es k

ce qui veut dire $(z - z_0)$ divise P

mais $(z - z_0)^k$ ne divise pas P

cette équivalence est vrai a cause de la formule de Taylor

$$P(Z) = P(Z_0) + P'(Z_0)(Z - Z_0) + \frac{P''(Z_0)}{2!}(Z - Z_0)^2 + \frac{P'''(Z_0)}{3!}(Z - Z_0)^3 + \dots$$

1.4.1 La formule de Taylor

soit P un Polynome de degré n , $n \in \mathbb{R}^+$ $\forall x, x_0 \in \mathbb{C}$ la formule de Taylor de ce polynome est

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \quad (1)$$

Définition 1.4.6

2 Integrales et primitives

2.1 Définition

Définition 2.1.1 *interprétation geo* Je veux calculer l'air de la courbe d'une fonction

Définition 2.1.2 *interprétation dynamique* Si t est le temps et $f(y) = y(t)$ est la vitesse

Définition 2.1.3 *ce qu'on appellera integrale* On considere la fonction suivante $x \in q$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in Q \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R}/Q \end{cases}$$

Définition 2.1.4 *Definition de Riemann* on définit une portion comme suit:

$$P = (x_n$$

l'aire de l'intégrale est:

$$I(P, f) = \sum_{j=0}^{n-1} m_j \Delta x_j$$
$$m_j = \min_{x \in [x_j, x_{j+1}]} f(x), \quad \Delta x_j = x_{j+1} - x_j$$