

สูงวัย ห่างไกลกระดูกพรุน



ผู้สูงอายุควรได้รับแคลเซียม 1,000 มก./วัน



นม โยเกิร์ต ชีส



ปลาตัวเล็กตัวน้อย
ปลาแซลมอล




เต้าหู้ งาดำ
ถั่วเหลือง



ผักสีเขียวเข้ม

ควรเติมแหล่งวิตามินดี เพื่อช่วยดูดซึมแคลเซียม



รับแสงแดด
ช่วงเช้า 06.00 - 09.00 น.




เห็ด ไข่แดง
ปลาแซลมอล



นมเสริม
วิตามินดี

อาหารที่ควรเลี่ยง เพิ่มเสี่ยงทำลายกระดูก



อาหารโซเดียมสูง
เช่น อาหารแปรรูป



คาเฟอีนสูงเกิน
2 แก้ว/วัน



น้ำอัดลม น้ำหวาน
ฟอสเฟตสูง



แอลกอฮอล์
การสร้างกระดูกลดลง

สื่อการให้ความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของแบบคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยนางสาวพรนัชชา บุนนาค นักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกโภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล