

**HSE FCS SE**  
**Calculus-1 2023-2024**

Lecturer: Ivan Erlikh  
File edited by: vova kormilitsyn

ver. 1.2.0

## Теоремы и определения

### Definition: Высказывания и n-местные предикаты

Высказывание - это упрощённая модель повествования предложения, такая что каждое высказывание либо истинно, либо ложно, но не одновременно

n-местный предикат (n-арный предикат) - это выражение, которое превращается в высказывание, если в нём заменить  $x_1, x_2, \dots, x_n$  на подходящие имена, где  $x_1, x_2, \dots, x_n$  - переменные в предикате

### Definition: Логические операции

- |                  |  |
|------------------|--|
| Отрицание:       | • $\neg A$ (также обозначают $\bar{A}$ ) означает "не $A$ "                    |
| Логическое и:    | • $A \wedge B$ означает "верно $A$ и верно $B$ "                               |
| Логическое или:  | • $A \vee B$ означает "верно $A$ , или верно $B$ , или верны $A$ и $B$ вместе" |
| Исключающее или: | • $A \oplus B$ означает "верно ровно одно из высказываний $A, B$ "             |
| Импликация:      | • $A \implies B$ означает "если верно $A$ , то верно $B$ "                     |
| Эквивалентность: | • $A \iff B$ означает " $A$ верно тогда и только тогда, когда верно $B$ "      |

#### Note

Пусть  $A \implies B$

Если  $A$  верно, то  $B$  тоже верно, но если  $A$  ложно, то  $B$  может быть и истинным, и ложным

Пусть  $A \iff B$

Если  $A$  ложно, то ложно  $B$ . Если  $B$  верно, то верно  $A$

#### Note

Логические операции можно выражать через другие логические операции, например,

$$(A \implies B) \iff (\neg A \vee B)$$

### Definition: Кванторы

Квантор всеобщности обозначается как  $\forall$  и означает "для любого"

Квантор существования обозначается как  $\exists$  и означает "существует"

Квантор единственности обозначается как  $!$  и означает "единственный, такой что ..."

#### Example

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Всеобщность:    | • $\forall x \in \mathbb{R} : \phi(x)$ означает<br>"Для любого $x$ из $\mathbb{R}$ выполняется предикат $\phi(x)$ "   |
| Существование:  | • $\exists x (x \in \mathbb{Q} \implies \psi(x))$ означает<br>"Существует $x$ , такой что если $x$ из $\mathbb{Q}$ , то выполняется предикат $\psi(x)$ "  |
| Единственность: | • $\forall n \in \mathbb{N} \exists! k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : 2^k \leq n < 2^{k+1}$ означает<br>"Для любого натурального числа существует и единственно такое целое неотрицательное число $k$ , что $2^k \leq n < 2^{k+1}$ " |

#### Note

На практике квантор единственности часто используется вместе с квантором существования т.е. часто используют связку  $\exists!$ , "существует и единственно"

#### Note

Вместо " $\neg \exists$ " пишут " $\nexists$ "

#### Claim Правило обращения кванторов

При обращении кванторов квантор существования меняется на квантор всеобщности, квантор

всеобщности меняется на квантор существования, а утверждение под кванторами меняется на противоположное

### Example

Пусть дано высказывание:

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists m_1 \in \mathbb{Z} \exists m_2 > m_1 \forall q \in \mathbb{Q} : |m_1| > n \wedge \neg \psi(q \cdot m_1 \cdot m_2 - n)$$

Тогда отрицание к этому высказыванию будет:

$$\exists n \in \mathbb{N} \forall m_1 \in \mathbb{Z} \forall m_2 > m_1 \exists q \in \mathbb{Q} : |m_1| \leq n \vee \psi(q \cdot m_1 \cdot m_2 - n)$$

### Claim Метод математической индукции

Пусть есть предикат  $\phi(n)$ , который выполняется или не выполняется при различных  $n \in \mathbb{N}$ . Тогда, если  $\exists k \in \mathbb{N} : \phi(k)$  и  $\forall n \geq k : (\phi(n) \implies \phi(n+1))$ , то по методу математической индукции получаем  $\forall n \geq k : \phi(n)$ .

Этапы доказательства:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| База индукции:          | • Проверка истинности $\phi(k)$   |
| Предположение индукции: | • Пусть для некоторого $n \in \mathbb{N} \wedge n \geq k$ верно $\phi(n)$ |
| Шаг индукции:           | • Докажем, что $\phi(n+1)$ , используя предположение индукции             |
| Вывод:                  | • $\forall n \geq k : \phi(n)$  |

### Theorem Неравенство Бернулли

Если  $n \in \mathbb{N}$  и  $x \geq -1$ , то  $(1+x)^n \geq 1+nx$

*Proof:*

Докажем неравенство при помощи метода математической индукции

1. База индукции:

$$\text{Пусть } n = 1 \implies (1+x)^1 = 1+x \geq 1+x$$

2. Предположение индукции:

$$\text{Пусть для некоторого } n \geq 1 \text{ верно, что } (1+x)^n \geq 1+nx$$

3. Шаг индукции: Рассмотрим неравенство, подставив в него  $n+1$ :

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n \cdot (1+x)$$

$$1+x \geq 0 \implies (1+x)^n \cdot (1+x) \geq (1+nx) \cdot (1+x) = 1+nx+x+n \cdot x^2 \geq 1+nx+x = 1+n(x+1)$$

$$\text{Следовательно, } (1+x)^{n+1} \geq 1+n(x+1)$$

4. Обозначим доказываемое высказывание как предикат  $\phi(n)$ , тогда получаем:

$$\phi(1) \wedge \forall n \in \mathbb{N} : (\phi(n) \implies \phi(n+1))$$

Тогда по принципу математической индукции  $\forall n \in \mathbb{N} : \phi(n)$

■

### Definition: Перестановки, размещения и сочетания

Пусть дано множество из  $n$  элементов

- Если все элементы попарно различны (т.е. при решении задачи мы считаем, что два любых элемента множества различны), то количество попарно различных перестановок этого множества обозначается как  $P_n$  и равно  $n!$

Пусть зафиксировано  $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ , такое что  $k \leq n$ , тогда:

- Количество количество способов, которыми мы можем выбрать  $k$ -элементное подмножество данного множества, считая, что элементы попарно различны, обозначается как  $A_n^k$  и равно  $\frac{n!}{(n-k)!}$
- Количество количество способов, которыми мы можем выбрать  $k$ -элементное подмножество данного множества, считая, элементы равны, обозначается как  $C_n^k$  и равно  $\frac{n!}{k!(n-k)!}$

### Theorem Бином Ньютона

$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$  (формально, перед равенством необходимо написать  $\forall a, b \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}$ )

**Proof:**

Докажем это утверждение при помощи метода математической индукции

1. База индукции:  $n = 1 \implies (a + b)^n = a + b = \sum_{k=0}^1 C_n^k a^k b^{n-k}$

2. Предположение индукции: пусть для некоторого  $n \geq 1 : (a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$

3. Рассмотрим равенство и докажем, что оно верно при подстановке  $n + 1$  :

$$\begin{aligned} (a + b)^{n+1} &= (a + b)(a + b)^n = (a + b) \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} = \\ &= a \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} + b \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n+1-k} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} C_n^{k-1} a^k b^{n-(k-1)} + \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n+1-k} = C_n^n a^{n+1} b^0 + \sum_{k=1}^n C_n^{k-1} a^k b^{n+1-k} + C_n^0 a^0 b^{n+1} + \sum_{k=1}^n C_n^k a^k b^{n+1-k} = \\ &= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n (C_n^{k-1} + C_n^k) a^k b^{n+1-k} = C_{n+1}^{n+1} a^{n+1} + C_{n+1}^0 b^{n+1} + \sum_{k=1}^n C_{n+1}^k a^k b^{n+1-k} = \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k a^k b^{n+1-k} \end{aligned}$$

4. Получили:

Равенство верно при  $n = 1$ , а из верности равенства для  $n$  следует верность равенства для  $n + 1$  (при  $n \geq 1$ ), тогда по методу математической индукции получим, что равенство верно  $\forall n \in \mathbb{N}$

■

### Definition: Числовая последовательность

Числовая последовательность - это счётно бесконечный проиндексированный набор чисел

**Definition: Ограниченная сверху числовая последовательность**

Числовая последовательность  $\{a_n\}$  называется ограниченной сверху, если  
 $\exists C \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : a_n < C$

**Definition: Ограниченная снизу числовая последовательность**

Числовая последовательность  $\{a_n\}$  называется ограниченной снизу, если  
 $\exists C \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : a_n > -C$

**Definition: Ограниченная числовая последовательность**

Числовая последовательность  $\{a_n\}$  называется ограниченной, если  
 $\exists C > 0 \forall n \in \mathbb{N} : |a_n| < C$

**Note**

Числовая последовательность ограничена  $\iff$  она ограничена сверху и ограничена снизу

**Definition: Неограниченная числовая последовательность**

Числовая последовательность  $\{a_n\}$  называется неограниченной, если она не является ограниченной, то есть  
 $\forall C > 0 \exists n \in \mathbb{N} : |a_n| \geq C$

**Definition: Отделимая от нуля числовая последовательность**

Числовая последовательность  $\{a_n\}$  называется отделимой от нуля, если  
 $\exists \epsilon > 0 \forall n \in \mathbb{N} : |a_n| > \epsilon$

**Definition: Эпсилон окрестность**

Эпсилон окрестностью вещественного числа  $x_0$  (элемента поля вещественных чисел) называется множество  $(x_0 - \epsilon; x_0 + \epsilon)$  и обозначается  $U_\epsilon(x_0)$ .  
 Обычно говорят "Эпсилон окрестность точки  $x_0$ "

**Example**

$$U_1(\pi) = (\pi - 1; \pi + 1)$$

$$U_\epsilon(e) = (0; 2e)$$

**Definition: Проколотаая эпсилон окрестность**

Проколотаая эпсилон окрестностью вещественного числа  $x_0$  (элемента поля вещественных чисел) называется множество  $(x_0 - \epsilon; x_0 + \epsilon) \setminus \{x_0\}$  и обозначается  $\dot{U}_\epsilon(x_0)$ .  
 Обычно говорят "Проколотаая эпсилон окрестность точки  $x_0$ "

**Example**

$$\dot{U}_1(e) = (e - 1; e + 1) \setminus \{e\} = (e - 1; e) \cup (e; e + 1)$$

**Definition: Сходящаяся числовая последовательность**

Числовая последовательность называется сходящейся, если она имеет конечный предел при  $n \rightarrow +\infty$ , т.е. ч.п.  $\{a_n\}$  называется сходящейся, если  $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = A \in \mathbb{R}$ , то есть по определению

$$\exists A \in \mathbb{R} \forall \epsilon > 0 \exists N = N(\epsilon) \forall n > N : |a_n - A| < \epsilon$$

**Note**

Сходящаяся ч.п. является ограниченной

**Note**

Неравенство  $|a_n - A| < \epsilon$  равносильно тому, что  $a_n \in U_\epsilon(A)$

**Definition: Бесконечно большая числовая последовательность**

Числовая последовательность  $\{a_n\}$  называется бесконечно большой, если она стремится к  $+\infty$ , к  $-\infty$  или к  $\infty$  при  $n \rightarrow +\infty$ , т.е.

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty \iff \forall M > 0 \exists N = N(M) \forall n > N : a_n > M$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty \iff \forall M > 0 \exists N = N(M) \forall n > N : a_n < -M$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty \iff \forall M > 0 \exists N = N(M) \forall n > N : |a_n| > M$

**Definition: Бесконечно малая числовая последовательность**

Числовая последовательность  $\{a_n\}$  называется бесконечно малой, если она стремится к 0 при  $n \rightarrow +\infty$ , т.е.

$$\forall \epsilon > 0 \exists N = N(\epsilon) \forall n > N : |a_n| < \epsilon$$

**Note**

Связи числовых последовательностей:

- $\frac{1}{\text{б.б.}} = \text{б.м.}$
- $\frac{1}{\text{б.м.}} = \text{б.б.}$
- $\frac{1}{\text{ограниченная}} = \text{отделимая от нуля}$
- $\frac{1}{\text{отделимая от нуля}} = \text{ограниченная}$

**Note**

Если ч.п. сходится или является б.б., то предел единственный

**Proposition** Докажите по определению, что

(ограниченная ч.п.) + (ограниченная ч.п.) = ограниченная ч.п.

б.м. + б.м. = б.м.

б.м. · (ограниченная ч.п.) = б.м.

$\frac{\text{отделимая от нуля ч.п.}}{\text{ограниченная ч.п.}} = \text{ограничена ч.п.}$

**Proposition** Приведите пример, когда

(отделимая от нуля ч.п.) + (отделимая от нуля ч.п.) = отделимая от нуля ч.п.

(отделимая от нуля ч.п.) + (отделимая от нуля ч.п.) = б.м.

б.б. + б.б. = б.б.

б.б. + б.б. = б.м.

б.б. + б.б. = (ограниченная ч.п.)

б.б. + б.б. = (отделимая от нуля ч.п.)

**Theorem** Теорема: свойство предельного перехода в неравенствах

$$(\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : c_n > A) \wedge (\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = C) \implies C \geq A$$

**Proof:**

1. Распишем, что дано, по определению:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_1(\epsilon) \forall n > N_1(\epsilon) : |c_n - C| < \epsilon$$

$$\text{Это равносильно } \forall \epsilon > 0 \exists N_1(\epsilon) \forall n > N_1(\epsilon) : C - \epsilon < c_n < C + \epsilon$$

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : c_n > A$$

2. Для любого  $\epsilon$  рассмотрим  $M(\epsilon) = \max(N_1(\epsilon), N) + 1$

$$\text{Тогда } \forall \epsilon > 0 \exists M(\epsilon) = \max(N_1(\epsilon), N) + 1 \forall n > M : (C - \epsilon < c_n < C + \epsilon \wedge c_n > A)$$

$$\text{Следовательно, } \forall \epsilon > 0 \exists M(\epsilon) \forall n > M : C + \epsilon > A$$

$$\text{Выражение под кванторами не зависит от } M \text{ и } n \implies \forall \epsilon > 0 : C + \epsilon > A$$

3. Предположим от противного, что  $C < A$

$$\text{Положим } \epsilon := \frac{A - C}{2} > 0 \implies C + \epsilon = C + \frac{A - C}{2} = \frac{A + C}{2} < A$$

$$\text{Получили, что } \exists \epsilon > 0 : C + \epsilon < A \implies \textcircled{W} \implies \text{предположение, что } C < A, \text{ неверно} \implies C \geq A$$

■

**Theorem** Теорема о зажатой последовательности (о 2 миллионерах / 2 полицейских / гамбургерах)

$$\left. \begin{array}{l} a_n, b_n, c_n - \text{числовые последовательности} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = X \\ \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = X \\ \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : a_n \leq c_n \leq b_n \end{array} \right\} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = X$$

**Proof:**

Докажем для случая, когда  $X \in \mathbb{R}$ . При  $X \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \mathbb{R}$  доказательство проводится аналогично

1. Распишем по определению пределы.

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_1(\epsilon) \forall n > N_1(\epsilon) : X - \epsilon < a_n < X + \epsilon$$

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_2(\epsilon) \forall n > N_2(\epsilon) : X - \epsilon < b_n < X + \epsilon$$

Рассмотрим  $N_3(\epsilon) = \max(N_1(\epsilon), N_2(\epsilon), N)$ , тогда

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_3(\epsilon) \forall n > N_3(\epsilon) : X - \epsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < X + \epsilon$$

$$\implies \forall \epsilon > 0 \exists N_3(\epsilon) \forall n > N_3(\epsilon) : X - \epsilon < c_n < X + \epsilon$$

■

**Theorem** Теорема о свойстве предела б.м. ч.п.

если  $a \in \mathbb{R}$ , то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff a_n = a + \alpha_n, \text{ где } \alpha_n - \text{б.м. ч.п.}$$

**Proof:**

"  $\implies$  "

Распишем по определению, что дано:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon) \forall n > N(\epsilon) : |a_n - a| < \epsilon$$

Обозначим ч.п.  $\alpha_n = a_n - a$ , тогда  $a_n = a + \alpha_n$

Тогда:  $\forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon) \forall n > N(\epsilon) : |\alpha_n| < \epsilon$

Доказали, что  $a_n = a + \alpha_n$ , где  $\alpha_n$  - б.м. ч.п.

"  $\Leftarrow$  "

Распишем то, что  $\alpha_n$  - б.м., по определению:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon) \forall n > N(\epsilon) : |\alpha_n| < \epsilon$$

По условию  $a_n = a + \alpha_n$ , тогда  $a_n - a = \alpha_n$ , подставим в выражение под кванторами:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon) \forall n > N(\epsilon) : |a_n - a| < \epsilon$$

Доказали по определению, что  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$

■

#### Definition: Монотонность ч.п.

Ч.п.  $\{a_n\}$  называется строго возрастающей, если  $\forall n \in \mathbb{N} : a_{n+1} > a_n$

Ч.п.  $\{a_n\}$  называется строго убывающей, если  $\forall n \in \mathbb{N} : a_{n+1} < a_n$

Ч.п.  $\{a_n\}$  называется неубывающей, если  $\forall n \in \mathbb{N} : a_{n+1} \geq a_n$

Ч.п.  $\{a_n\}$  называется невозрастающей, если  $\forall n \in \mathbb{N} : a_{n+1} \leq a_n$

**Claim** Аксиома непрерывности действительных чисел (принцип полноты)

$$\left. \begin{array}{l} A \subseteq \mathbb{R} \\ A \neq \emptyset \\ B \subseteq \mathbb{R} \\ B \neq \emptyset \\ \forall a \in A \forall b \in B : a \leq b \end{array} \right\} \implies \exists c \in \mathbb{R} \forall a \in A \forall b \in B : a \leq c \leq b$$

#### Definition: Ограниченное сверху множество

Подмножество  $A \subseteq \mathbb{R}$  называется ограниченным сверху, если  $\exists C \in \mathbb{R} \forall a \in A : a \leq C$

#### Definition: Ограниченное снизу множество

Подмножество  $A \subseteq \mathbb{R}$  называется ограниченным снизу, если  $\exists C \in \mathbb{R} \forall a \in A : a \geq C$

#### Definition: Ограниченное множество

Подмножество  $A \subseteq \mathbb{R}$  называется ограниченным, если  $\exists C > 0 \forall a \in A : |a| \leq C$

#### Definition: Определение верхней грани множества

Пусть дано множество  $A \subset \mathbb{R} \wedge A \neq \emptyset$ . Тогда верхней гранью множества  $A$  называют число  $c \in \mathbb{R}$ , такое что  $\forall a \in A : a \leq c$



**Definition: Определение нижней грани множества**

Пусть дано множество  $A \subset \mathbb{R} \wedge A \neq \emptyset$ . Тогда нижней гранью множества  $A$  называют число  $c \in \mathbb{R}$ , такое что  $\forall a \in A : a \geq c$

**Definition: Определение точной верхней грани множества**

Пусть дано множество  $A \subset \mathbb{R} \wedge A \neq \emptyset$ . Тогда точной верхней гранью множества  $A$  называют наименьший элемента множества всех верхних граней множества  $A$  и обозначают  $\sup A$

**Definition: Определение точной нижней грани множества**

Пусть дано множество  $A \subset \mathbb{R} \wedge A \neq \emptyset$ . Тогда точной нижней гранью множества  $A$  называют наибольший элемента множества всех нижней граней множества  $A$  и обозначают  $\inf A$

**Note**

Вообще говоря, наименьший и наибольший элементы множества не всегда существуют. Например, у множества  $(0; 1)$  нет ни наименьшего, ни наибольшего элементов, при этом  $\sup(0; 1) = 1 \notin (0; 1)$ ,  $\inf(0; 1) = 0 \notin (0; 1)$

**Theorem Теорема о существовании точной грани множества**

Если множество  $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$  ограничено сверху, то  $\exists \sup A$

Если множество  $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$  ограничено снизу, то  $\exists \inf A$

**Proof:** Докажем для верхней грани, для нижней грани доказательство аналогично

$$A \subset \mathbb{R} \wedge A \neq \emptyset \wedge (\exists C > 0 \forall a \in A \Rightarrow a < C) \Rightarrow \exists \sup A$$

1. Обозначим  $S_A = \{c \in \mathbb{R} | \forall a \in A \Rightarrow a \leq c\} \neq \emptyset$  - множество верхних граней

Это множество не пусто, т.к.  $A$  ограничено по условию, т.е.  $\exists C > 0 \forall a \in A \Rightarrow a \leq C$

2. По построению множества  $A$  и  $S_A$  удовлетворяют аксиоме непрерывности

действительных чисел, тогда  $\exists b \in \mathbb{R} \forall a \in A \forall c \in S_A \Rightarrow a \leq b \leq c$

Но из  $b \leq c \Rightarrow b \in S_A$ , при этом  $(\forall c \in S_A \Rightarrow b \leq c)$ , следовательно,  $b$  является наименьшим элементом множества верхних граней множества  $A$ , тогда по определению точной верхней грани  $b = \sup A$

■

**Theorem Теорема Вейерштрасса (о существовании предела ч.п.)**

Если ч.п.  $\{a_n\}$  неубывает и ограничена сверху, то она сходится

Если ч.п.  $\{a_n\}$  невозрастает и ограничена снизу, то она сходится

**Proof:** Докажем для неубывающей ч.п., для невозрастающей ч.п. доказательство аналогично

1. Обозначим множество значений ч.п.  $A = \{a_n\}$

Т.к.  $a_n$  - числовая последовательность, то множество  $A$  счётно или конечно (т.е. существует инъекция между  $A$  и  $\mathbb{N}, A \lesssim \mathbb{N}$ )

Также  $A \neq \emptyset$  и множество  $A$  ограничено сверху  $\Rightarrow$  по теореме о существовании точной верхней грани  $\exists \sup A = a$

2. Докажем, что  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$ , т.е.  $\forall \epsilon \exists N = N(\epsilon) \forall n > N(\epsilon) : |a_n - a| < \epsilon$

$a_n$  неубывает и ограничена сверху  $a \Rightarrow |a_n - a| = a - a_n$ , тогда

$$|a_n - a| < \epsilon \iff a - a_n < \epsilon \iff a_n > a - \epsilon$$

Т.к. последовательность  $a_n$  неубывает, то следующие 2 высказывания равносильны:

$$\forall \epsilon \exists N = N(\epsilon) \forall n > N(\epsilon) : a_n > a - \epsilon \quad (\#)$$

$\forall \epsilon \exists N = N(\epsilon) : a_N > a - \epsilon$  (\*)

3. Докажем второе высказывание (\*) методом от противного.

Предположим, что  $\exists \epsilon_0 \forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq a - \epsilon_0$

Тогда число  $a - \epsilon_0$  - верхняя грань множества  $A$ , но  $a$  само является точной

верхней гранью, но  $a - \epsilon_0 < a \implies \perp \implies$  неверно предположение, что

высказывание (\*) неверно  $\implies$  высказывание (#) верно ■

### Definition: Число e

Рассмотрим ч.п.  $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$

Докажем, что у ч.п. есть конечный предел и обозначим его  $e$

**Proof:** 1. Докажем, что  $a_n$  ограничена сверху числом 3

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=0}^n C_n^k \left(\frac{1}{n}\right)^k = 1 + C_n^1 \cdot \frac{1}{n} + C_n^2 \cdot \frac{1}{n^2} + \dots + C_n^n \frac{1}{n^n} = \\ &= 1 + \frac{n}{1!} \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \frac{1}{n^3} + \dots + \frac{n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1)n} \frac{1}{n^n} = \\ &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \leq \\ &\leq 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{(n-1) \cdot n} = \\ &= 2 + \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = 2 + \frac{1}{1} - \frac{1}{n} = 3 - \frac{1}{n} < 3 \end{aligned}$$

2. Докажем, что  $a_n$  - возрастающая ч.п.

Рассмотрим  $a_{n+1}$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) + \dots \\ &+ \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) + \\ &+ \frac{1}{(n+1)!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) \end{aligned}$$

Т.к.  $\forall m \in \{1, \dots, n\} 1 - \frac{m}{n} < 1 - \frac{m}{n+1}$ , то

$$a_{n+1} \geq a_n + \frac{1}{(n+1)!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) > a_n$$

3.  $\{a_n\}$  ограничена сверху и возрастает  $\implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}$  ■

### Definition: Подпоследовательность

Пусть дана ч.п.  $\{a_n\}$ , тогда подпоследовательностью называется ч.п., полученная *последовательным* выбором некоторых членов исходной ч.п. и обозначается  $\{a_{n_k}\}$

### Note

Если  $\{a_{n_k}\}$  - подпоследовательность ч.п.  $\{a_n\}$ , то  $\forall k \in \mathbb{N} : n_k \geq k$

### Definition: Частичный предел

Частичный предел ч.п.  $\{a_n\}$  - число, являющееся пределом какой-либо сходящейся подпоследовательности данной последовательности  $\{a_n\}$

**Definition: Верхний предел ч.п.**

Верхним пределом ч.п.  $\{a_n\}$  называется предел

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{k \rightarrow +\infty} \sup\{a_n\}_{n \geq k}$$

**Definition: Нижний предел ч.п.**

Нижним пределом ч.п.  $\{a_n\}$  называется предел

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{k \rightarrow +\infty} \inf\{a_n\}_{n \geq k}$$

**Definition: Предельная точка ч.п.**

Предельной точкой ч.п.  $\{a_n\}$  называется число  $a$ , такое что в любой окрестности точки  $a$  находится бесконечно много членов ч.п.  $\{a_n\}$

**Theorem** Определение предельной точки ч.п. эквивалентно определению частичного предела ч.п.

*Proof:*

1.  $a$  - частичный предел  $\implies a$  - предельная точка  $\{a_n\}$

$$\forall \epsilon > 0 \exists N = N(k) \forall k > N : |a_{n_k} - a| < \epsilon$$

$\iff$

$$\forall \epsilon > 0 \exists N = N(k) \forall k > N : a_{n_k} \in U_\epsilon(a)$$

Следовательно,  $\forall \epsilon$  в  $U_\epsilon(a)$  попадает бесконечно много членов  $\{a_n\}$

2.  $a$  - предельная точка  $\{a_n\} \implies a$  - ч.п.  $\{a_n\}$

По определению предельной точки  $\forall \epsilon$  в  $U_\epsilon(a)$  попадает бесконечно много членов  $\{a_n\}$

Предъявим ч.п.  $\{a_{n_k}\} \subseteq \{a_n\}$ , такую что  $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$

$$\text{Обозначим } \epsilon_k = \frac{1}{k}$$

Рассмотрим  $\epsilon_1$ , в  $U_{\epsilon_1}(a)$  попадает бесконечно много членов  $\{a_n\}$ , выберем какой-то член  $a_{n_1}$

Рассмотрим  $\epsilon_2$ , в  $U_{\epsilon_2}(a)$  попадает бесконечно много членов  $\{a_n\}$ , поэтому  $\exists n_2 > n_1 : a_{n_2} \in U_{\epsilon_2}(a)$

Рассмотрим  $\epsilon_k$ , в  $U_{\epsilon_k}(a)$  попадает бесконечно много членов  $\{a_n\}$ , поэтому  $\exists n_k > n_{k-1} : a_{n_k} \in U_{\epsilon_k}(a)$

Таким образом, построена ч.п.  $\{a_{n_k}\}$ , такая что  $\forall k \in \mathbb{N} : a - \frac{1}{k} < a_{n_k} < a + \frac{1}{k} \implies$

$\implies$  по теореме о зажатой последовательности  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$

■

**Note**

Свойства частичных пределов ч.п.

$$\{a_n\} \text{ сходится } \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup\{\text{множества предельных точек } \{a_n\}\}$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf\{\text{множества предельных точек } \{a_n\}\}$$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$  и  $\underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n$  - частичные пределы

**Theorem Система вложенных отрезков**

Системой вложенных отрезков называют счётно бесконечное множество отрезков, каждый из

которых содержит следующий отрезок как подмножество  
 Обозначение:  $\{I_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ , где  $\forall k \in \mathbb{N} : I_{k+1} \subseteq I_k$

### Example

Рассмотрим  $S = \{[1 - \frac{1}{k}; 2 + \frac{1}{k}]\}_{k \in \mathbb{N}}$ , тогда  
 $S = \{[0; 3], [0.5; 2.5], [\frac{2}{3}; 2\frac{1}{3}], \dots\}$   
 Рассмотрим  $S = \{[\pi; \pi - \frac{1}{k}]\}_{k \in \mathbb{N}}$ , тогда  
 $S = \{[\pi; \pi - 1], [\pi; \pi - \frac{1}{4}], [\pi; \pi - \frac{1}{27}], \dots\}$

### Theorem Теорема Больцано-Вейерштрасса

Из любой ограниченной ч.п. можно выделить сходящуюся подпоследовательность

#### Proof:

По определению ограниченной ч.п.  $\exists C \forall n \in \mathbb{N} |a_n| < C$   
 Построим искомую подпоследовательность при помощи системы вложенных отрезков  
 $I_1 = [-c; c], \forall n \in \mathbb{N} a_n \in I_1$ , выберем какой-то член ч.п.  $a_{n_1} \in I_1$   
 Т.к.  $\{a_n\}$  - ч.п., то в какой-то половине точно есть бесконечно много членов  $\{a_n\}$   
 Выберем эту половину и обозначим  $I_2$ , выберем в нём какой-то член ч.п.  $a_{n_2} \in I_2$   
 Пусть построен  $I_k$  и  $a_{n_k}$ . Делим  $I_k$  пополам и выбираем половину,  
 в которой бесконечно много членов  $\{a_n\}$ , обозначим эту половину как  $I_{k+1}$   
 и выберем  $a_{n_{k+1}} : n_{k+1} > n_k$   
 Построили последовательность  $\{I_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ , где  $I_k = [b_k; d_k]$   
 $\forall k \in \mathbb{N} : I_{k+1} \subset I_k \implies \{b_k\}$  неубывает и ограничена сверху  $C$   
 $\implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_k = b, b \geq b_k$   
 $\forall k \in \mathbb{N} : I_{k+1} \subset I_k \implies \{d_k\}$  невозрастает и ограничена снизу  $-C$   
 $\implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} d_k = d, d \leq d_k$   
 При этом  $|d_k - b_k| = \frac{2 \cdot C}{2^{k-1}} \rightarrow 0$  при  $k \rightarrow \infty$   
 $ADDPROOF[d \geq b]$  (пока что см. консультацию 2)  
 $d - b \leq d_k - b_k \rightarrow 0$  при  $k \rightarrow \infty \implies d \leq b \implies d = b$

■

### Definition: Фундаментальная ч.п.

Ч.п.  $\{a_n\}$  называется фундаментальной, если

$$\forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon) \forall n, m > N(\epsilon) : |a_n - a_m| < \epsilon$$

### Theorem Критерий сходимости ч.п. по Коши

Ч.п.  $\{a_n\}$  сходится  $\iff \{a_n\}$  - Фундаментальная ч.п.

**Proof:**

"  $\implies$  "

Распишем, что дано:  $\exists A \in \mathbb{R} \forall \epsilon > 0 \exists N_1(\epsilon) \forall n > N_1 : |a_n - A| < \epsilon$

Хотим доказать:  $\forall \epsilon > 0 \exists N_2(\epsilon) \forall n, m > N_2 : |a_n - a_m| < \epsilon$

$$|a_n - a_m| < \epsilon \iff |a_n - a + a - a_m| < \epsilon \iff |a_n - a| + |a - a_m| < \epsilon \iff |a_n - a| + |a_m - a| < \epsilon$$

Положим  $N_2(\epsilon) := N_1(\frac{\epsilon}{2}) \implies$

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_2(\epsilon) \forall n, m > N_2 : |a_n - a| + |a_m - a| < \epsilon \implies$$

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_2(\epsilon) \forall n, m > N_2 : |a_n - a_m| < \epsilon$$

"  $\impliedby$  "

Распишем, что дано:  $\forall \epsilon > 0 \exists N_2(\epsilon) \forall n, m > N_2(\epsilon) : |a_n - a_m| < \epsilon$

Покажем, что  $\{a_n\}$  ограничена: положим  $\epsilon = 1 \implies$

$$\exists N_2(1) \forall n, m > N_2 : |a_n - a_m| < 1 \implies$$

$$\exists N_2(1) \forall n > N_2 : |a_n - a_{N_2(1)+1}| < 1 \implies$$

$$\exists N_2(1) \forall n > N_2 : a_{N_2(1)+1} - 1 < a_n < a_{N_2(1)+1} + 1$$

Положим  $C := \max(|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{N_2(1)}|, |a_{N_2(1)+1}|) + 1 \implies$

$$\forall n \in \mathbb{N} |a_n| \leq C$$

Тогда по теореме Больцано-Вейерштрасса

$$\exists a \in \mathbb{R} \exists \{a_{n_k}\} : \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{n_k} = a$$

Докажем, что  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$

Перепишем, что дано:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_2(\epsilon) \forall n, m > N_2(\epsilon) : |a_n - a_m| < \epsilon$$

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_3(\epsilon) \forall k > N_3(\epsilon) : |a_{n_k} - a| < \epsilon$$

Распишем, что хотим доказать:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_1(\epsilon) \forall n > N_1(\epsilon) : |a_n - a| < \epsilon$$

$$|a_n - a| < \epsilon \iff |a_n - a_{n_k} + a_{n_k} - a| < \epsilon \iff |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \epsilon$$

Т.к. при выборе членов в подпоследовательности  $n_k \geq k$ , то при  $k > N_3(\epsilon) \implies n_k > N_3(\epsilon)$

Положим  $N_1(\epsilon) = \max(N_2(\frac{\epsilon}{2}), N_3(\frac{\epsilon}{2})) \implies$

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_1(\epsilon) \forall n > N_1(\epsilon) : |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \epsilon \implies$$

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_1(\epsilon) \forall n > N_1(\epsilon) : |a_n - a| < \epsilon$$

■

### Definition: Определение функции

Множество пар  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \in D_f \wedge y \in E_f\}$  называется функцией  $f$  с областью определения  $D_f$  и областью значения  $E_f$ , если  $\forall x \in D_f \exists! y \in E_f : (x, y) \in f$  (для удобства  $(x, y) \in f$  обозначают как  $f(x) = y$ )

Обозначение функции:  $f : X \rightarrow Y$

В данном обозначении подразумевают, что  $D_f = X, E_f \subseteq Y$

### Example

$$f : \mathbb{N} \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : f(n) = (-1)^{n+1} \cdot \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil, \text{ в данном случае } D_f = \mathbb{N} \cup \{0\}, E_f = \mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$$

Т.к. несложно установить, что  $E_f = \mathbb{Z}$ , то можно написать  $f : \mathbb{N} \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}$

### Definition: Определение инъективной функции

Функция  $f$  называется инъективной, если  $\forall y \in E_f \exists! x \in D_f : f(x) = y$   
Это эквивалентно тому, что  $\forall x_1, x_2 \in D_f : (x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2))$   
(говорят, что  $f$  - инъекция)

### Example

$\forall n \in \mathbb{N}$  функция  $f(x) = x^{2n-1}$  является инъективной  
 $\forall n \in \mathbb{N}$  функция  $f(x) = x^{2n}$  не является инъективной

### Definition: Определение сюръективной функции

Функция  $f : X \rightarrow Y$  называется сюръективной для множества  $Y$ , если  $E_f = Y$   
(говорят, что  $f$  - сюръекция)  
Когда говорят, что  $f$  сюръективна, не уточняя множество, то подразумевают, что  $f$  сюръективна для  $Y$

### Example

Функция  $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  не сюръективна для  $\mathbb{R}$ , но сюръективна для  $[-1; 1]$

### Definition: Определение биективной функции

Функция  $f : X \rightarrow Y$  называется биективной, если она инъективна и сюръективна  
(говорят, что  $f$  - биекция)

### Example

Функция  $f : \mathbb{N} \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}$ , такая что  
 $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : f(n) = (-1)^{n+1} \cdot \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$  - биекция между  $\mathbb{N} \cup \{0\}$  и  $\mathbb{Z}$   
(как следствие, показали, что  $\mathbb{N} \cup \{0\} \sim \mathbb{Z}$ , т.е. множества равномощны)

### Definition: Определение обратной функции

Функция  $y = f^{-1}(x)$  называется обратной функцией к функции  $y = f(x)$ , если множество пар функции  $f^{-1}$  является симметрией множества пар  $f$

### Note

Функция обратима *iff* она инъективна

**Definition: Постоянная Эйлера**

Рассмотрим ч.п.  $\gamma_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$

Докажем, что у ч.п. есть конечный предел и обозначим его  $\gamma$

**Proof:**

$$\gamma_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$$

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n = \gamma$$

$\gamma_n$  убывает

$$\begin{aligned} \gamma_{n+1} - \gamma_n &= \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n+1} (1 - (n+1) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)) = \\ &= \frac{1}{n+1} (1 - \ln\left((1 + \frac{1}{n})^{n+1}\right)) \end{aligned}$$

$b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$  сходится к  $e$  и убывает. Докажем убывание

$$\begin{aligned} \frac{b_n}{b_{n+1}} &= \frac{(1 + \frac{1}{n})^{n+1}}{(1 + \frac{1}{n+1})^{n+2}} = \left(\frac{n+1}{n(n+2)}\right)^{n+1} \cdot \left(\frac{n+1}{n+2}\right) = \left(1 + \frac{1}{n^2 + 2n}\right)^{n+1} \left(\frac{n+1}{n+2}\right) \\ &\geq \left(1 + \frac{n+1}{n^2 + 2n}\right) \left(\frac{n+1}{n+2}\right) = \frac{(n+1)(n^2 + 3n + 1)}{n^3 + 4n^2 + 4n} = \frac{n^3 + 4n^2 + 4n + 1}{n^3 + 4n^2 + 4n} > 1 \end{aligned}$$

$$\gamma_{n+1} - \gamma_n = \frac{1}{n+1} (1 - \ln b_n)$$

$$b_n \text{ убывает к } e \implies b_n > e \implies \ln b_n > 1 \implies \gamma_{n+1} - \gamma_n < 0$$

Докажем ограниченность  $\gamma_n$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e \implies n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 \implies \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n} \implies \frac{1}{n} > \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$$

$$\begin{aligned} \gamma_n &= 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n > \ln \frac{2}{1} + \ln \frac{3}{2} + \ln \frac{4}{3} + \dots + \ln \frac{n+1}{n} - \ln n = \\ &= \ln 2 - \ln 1 + \ln 3 - \ln 2 + \ln 4 - \ln 3 + \dots + \ln(n+1) - \ln n - \ln n = \\ &= -\ln 1 + \ln(n+1) - \ln n = \ln \frac{n+1}{n} > \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

■

**Definition: Определение предела функции по Коши**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta = \delta(\epsilon) \forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) : f(x) \in U_\epsilon(A)$$

**Note**

При этом  $\dot{U}_\delta(+\infty) = (\delta; +\infty)$ ,  $\dot{U}_\delta(-\infty) = (-\infty; \delta)$ ,  $\dot{U}_\delta(\infty) = (-\infty; \delta) \cup (\delta; +\infty)$

**Definition: Определение предела функции по Гейне**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \{x_n\} : (x_n \neq x_0 \wedge \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = A)$$

**Definition: Односторонний предел функции**

Левосторонним пределом функции называют предел функции по Коши  $f$  при  $x \rightarrow x_0$  слева, то есть

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A \iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta = \delta(\epsilon) \forall x \in (x_0 - \delta; x_0) : f(x) \in U_\epsilon(A)$$

Правосторонним пределом функции называют предел функции по Коши  $f$  при  $x \rightarrow x_0$  справа, то есть

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A \iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta = \delta(\epsilon) \forall x \in (x_0; x_0 + \delta) : f(x) \in U_\epsilon(A)$$

**Theorem** Свойство предела функции при  $x \rightarrow x_0, x_0 \in \mathbb{R}$ 

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A, \text{ где } A \in \overline{\mathbb{R}}$$

*Proof:*

”  $\implies$  ”

Дано:  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0 \forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) : f(x) \in U_\epsilon(A)$

Тогда:

$\forall \epsilon > 0 \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0 \forall x \in (x_0; x_0 + \delta) : f(x) \in U_\epsilon(A)$

$\forall \epsilon > 0 \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0 \forall x \in (x_0 - \delta; x_0) : f(x) \in U_\epsilon(A)$

”  $\impliedby$  ”

Дано:

$\forall \epsilon > 0 \exists \delta_1 = \delta_1(\epsilon) > 0 \forall x \in (x_0; x_0 + \delta_1) : f(x) \in U_\epsilon(A)$

$\forall \epsilon > 0 \exists \delta_2 = \delta_2(\epsilon) > 0 \forall x \in (x_0 - \delta_2; x_0) : f(x) \in U_\epsilon(A)$

Положим  $\delta(\epsilon) = \min(\delta_1(\epsilon), \delta_2(\epsilon))$ , тогда:

$\forall \epsilon > 0 \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0 \forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) \subseteq (x_0 - \delta_2; x_0) \cup (x_0; x_0 + \delta_1) : f(x) \in U_\epsilon(A)$

■

**Definition: Бесконечные пределы**

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \iff \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 \forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) : f(x) > M$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \iff \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 \forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) : f(x) < -M$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \iff \forall M > 0 \exists \delta(M) > 0 \forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) : |f(x)| > M$

**Definition: Бесконечно малая функция**

Функция называется б.м. при  $x \rightarrow x_0$ , если  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ , при этом  $x_0 \in \mathbb{R}$

Функция называется б.м. при  $x \rightarrow +\infty$ , если  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

Функция называется б.м. при  $x \rightarrow -\infty$ , если  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

**Definition: Бесконечно большая функция**

Функция называется б.б. при  $x \rightarrow x_0$ , если  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ , при этом  $x_0 \in \mathbb{R}$

Функция называется б.б. при  $x \rightarrow +\infty$ , если  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$

Функция называется б.б. при  $x \rightarrow -\infty$ , если  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$



**Definition: Ограниченная функция**

Функция называется ограниченной при  $x \rightarrow x_0$ , если  $\exists \delta > 0 \exists C > 0 \forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) : |f(x)| < C$

**Definition: отделимая от нуля функция**

Функция называется отделимой от нуля при  $x \rightarrow x_0$ , если  $\exists \delta > 0 \exists \epsilon_0 > 0 \forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) : |f(x)| > \epsilon_0$

**Note**

Связь функций при  $x \rightarrow x_0$ , где  $x$  - аргумент обеих функций,  $x_0$  - число, которому стремится аргумент обеих функций:

- $\frac{1}{\text{б.п.}} = \text{б.м.}$
- $\frac{1}{\text{б.м.}} = \text{б.п.}$
- $\frac{1}{\text{ограниченная}} = \text{отделимая от нуля}$
- $\frac{1}{\text{отделимая от нуля}} = \text{ограниченная}$

**Theorem** Теорема о зажатой функции

$$\left. \begin{array}{l} f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \\ \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A \\ \exists \delta > 0 \forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) : f(x) \leq g(x) \leq h(x) \end{array} \right\} \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$$

**Definition: Первый замечательный предел**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 1$$

**Definition: Второй замечательный предел**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

**Theorem** Теорема о пределе сложной функции

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0 \\ \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = g(y_0) \end{array} \right\} \implies \lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(y_0)$$

**Proof:**

Распишем, что дано, по определению:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta_1(\epsilon) \forall x \in \dot{U}_{\delta_1(\epsilon)}(x_0) : |f(x) - y_0| < \epsilon \quad (1)$$

$$\forall \lambda > 0 \exists \delta_2(\lambda) \forall y \in \dot{U}_{\delta_2(\lambda)}(y_0) : |g(y) - g(y_0)| < \lambda \quad (2)$$

Распишем, что хотим доказать:

$$\forall \eta > 0 \exists \delta_3 = \delta(\eta) \forall x \in \dot{U}_{\delta_3(\eta)}(x_0) : |g(f(x)) - g(y_0)| < \eta$$

Положим  $\delta_3(\eta) = \delta_1(\delta_2(\eta))$ , тогда :

$$x \in \dot{U}_{\delta_3(\eta)}(x_0) \iff x \in \dot{U}_{\delta_1(\delta_2(\eta))}(x_0) \implies \text{по (1)} |f(x) - y_0| < \delta_2(\eta)$$

$$|f(x) - y_0| < \delta_2(\eta) \iff f(x) \in \dot{U}_{\delta_2(\eta)}(y_0)$$

По (2) знаем, что если  $f(x) \in \dot{U}_{\delta_2(\eta)}(y_0)$ , то  $|g(f(x)) - g(y_0)| < \eta$

Если  $f(x) = y_0$ , то  $|g(f(x)) - g(y_0)| = 0 < \eta$

Иначе, если  $f(x) \neq y_0 \iff f(x) \in \dot{U}_{\delta_2(\eta)}(y_0)$ , то  $|g(f(x)) - g(y_0)| < \eta$

Получили:  $\forall \eta > 0 \exists \delta_3 = \delta_1(\delta_2(\eta)) \forall x \in \dot{U}_{\delta_3(\eta)}(x_0) : |g(f(x)) - g(y_0)| < \eta$

■

**Definition: Асимптоты**

Вертикальная асимптота: • Прямая  $x = a$  называется вертикальной асимптотой для графика функции  $y = f(x)$ , если

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \pm\infty \vee \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \pm\infty$$

Горизонтальная асимптота: • Прямая  $y = b$  называется горизонтальной асимптотой для графика функции  $y = f(x)$  на  $\pm\infty$ , если

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$$

Вообще говоря, горизонтальные асимптоты на  $+\infty$  и  $-\infty$  могут быть разными

Наклонная асимптота: • Прямая  $y = kx + b$  называется наклонной асимптотой для графика функции  $y = f(x)$  при  $x \rightarrow \pm\infty$ , если

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - (kx + b) = 0$$

Вообще говоря, наклонные асимптоты на  $+\infty$  и  $-\infty$  могут быть разными

**Theorem** Признак наклонной асимптоты

Прямая  $y = kx + b$  - наклонная асимптота графика функции  $y = f(x)$  при  $x \rightarrow +\infty \iff$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - kx = b \end{cases}$$

**Proof:**

"  $\Rightarrow$  "

1. Распишем определение наклонной асимптоты:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (kx + b) = 0$

Вынесем  $b$  из предела:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - kx = b$

$f(x) - kx - b$  - б.м. при  $x \rightarrow +\infty$

Т.к.  $x \rightarrow +\infty$ , то можно поделить на  $x$  :

$$\frac{f(x)}{x} - k = \frac{b}{x} + \frac{\text{б.м.}}{x}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{b}{x} \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow +\infty \\ \frac{\text{б.м.}}{x} \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{f(x)}{x} - k \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow +\infty$$

"  $\Leftarrow$  "

Т.к.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - kx = b$ , то  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (kx + b) = 0$

■

#### Definition: O - символика

- о-малое: •  $f(x) = \overline{o}(g(x))$  при  $x \rightarrow x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ , если  $\frac{f(x)}{g(x)}$  - б.м. при  $x \rightarrow x_0$   
О-большое: •  $f(x) = \underline{O}(g(x))$  при  $x \rightarrow x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ , если  $\frac{f(x)}{g(x)}$  - ограниченная при  $x \rightarrow x_0$

#### Definition: Непрерывность функции в точке

Функция называется непрерывной в точке  $x_0$ , если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

#### Clarification

Если  $x_0$  - граница области определения, то рассматривается односторонний предел

#### Note

Свойства непрерывных функций:

- Сумма, произведение и частное непрерывных функций - непрерывные функции (по арифметике пределов функции)
- Композиция непрерывных функций - непрерывная функция (по теореме о пределе сложной функции)

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0) = y_0 \\ \lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = f(y_0) \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(g(x_0))$$

#### Claim Правило замены переменных в пределе

Пусть дана сложная функция  $f(g(x))$ , тогда, если для некоторой точки  $x_0$  :  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0) = y_0$  и  $\lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = A \in \mathbb{R}$ , то  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(g(x_0))$

**Example** (Пример использования правила замены переменной в пределе)

Пусть надо найти  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi x)}{x}$

Преобразуем выражение:  $\frac{\sin(\pi x)}{x} = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} \cdot \pi$

В данном случае в обозначения из утверждения выше:

$$f(y) = \frac{\sin(y)}{y}$$

$$g(x) = \pi x$$

$g(x)$  непрерывна в точке  $x_0 = 0$ ,  $y_0 = g(x_0) = 0$ , и при этом  $\lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = 1 = A$

Тогда по правилу замены переменной в пределе:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} \cdot \pi = \lim_{x \rightarrow 0} A \cdot \pi = \lim_{x \rightarrow 0} 1 \cdot \pi = \pi$$

### Definition: Непрерывность функции на множестве

Функция называется непрерывной на множестве  $E$ , если она непрерывна в каждой точке множества  $E$

/\* Когда говорят, что функция непрерывна, имеют в виду, что она непрерывна на  $D_f$  \*/

### Note

В частности, функция непрерывна на отрезке  $[a; b]$ , если она непрерывна в каждой точке отрезка  $[a; b]$ . При этом, в точках  $a$  и  $b$  рассматриваются односторонние пределы

### Theorem Теорема о функции, непрерывной на отрезке (иногда называют теоремой Вейерштрасса)

Функция, непрерывная на отрезке, ограничена на этом отрезке и достигает наибольшее и наименьшее значения на этом отрезке

Докажем, что функция ограничена сверху и достигает наибольшее значение. Для второго случая доказательство проводится аналогично

**Proof:**

1.  $E_f$  — мно-во значений  $f(x)$  на  $[a; b]$

Обозначим  $M = \sup E_f = \sup_{x \in [a; b]} f(x) \in \overline{\mathbb{R}}$

Построим некоторую строго возрастающую ч.п.  $a_n \rightarrow M$  при  $n \rightarrow +\infty$

2. Докажем, что  $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a; b] : a_n < f(x_n)$

Предположим от противного, то есть  $\exists n_0 \forall x \in [a; b] : a_{n_0} \geq f(x)$

Тогда  $a_{n_0}$  — верхняя грань множества  $E_f$

Однако, т.к.  $a_n$  — возрастающая ч.п. и  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = M$ , то  $\forall n \in \mathbb{N} : a_n < M$

В частности,  $a_{n_0} < M$ , т.е.  $a_{n_0}$  — верхняя грань, которая меньше точной верхней грани  $\implies$

$\implies \textcircled{W} \implies \forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a; b] : a_n < f(x_n)$

3. По построению  $\forall x \in [a; b] : f(x) \leq M$

Тогда  $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a; b] : a_n < f(x_n) \leq M$

Следовательно, по теореме о зажатой последовательности  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = M$

4. Докажем, что  $M = f(x_0)$

Т.к.  $x_n$  — ограниченная ч.п., то по теореме Больцано-Вейерштрасса из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность  $\{x_{n_k}\} \rightarrow x_0 \in [a; b]$

Т.к.  $f$  непрерывна на отрезке, то она непрерывна в  $x_0$ , следовательно

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$$

$$(\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = M) \wedge (\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)) \implies M = f(x_0) < \infty$$

Таким образом, на отрезке  $[a; b]$  функция  $f$  ограничена сверху числом  $M = f(x_0)$

■

**Theorem** Теорема (2) о функции, непрерывной на отрезке

Непрерывная на отрезке  $[a; b]$  принимает все промежуточные значения

Пусть  $f(x)$  непрерывна на  $[a; b]$ ,  $f(x_1) = A$ ,  $f(x_2) = B$ ,  $x_1 < x_2$ , БОО  $A < B$ , тогда

$\forall c \in (A; B) \exists x_0 \in (x_1; x_2) : f(x_0) = c$

**Proof:**

1. Построим последовательность вложенных отрезков:

/\* Если Вам так будет удобнее, то докажем существование  $x_0$  бинпоиском по ответу \*/

$$[a_1; b_1] := [x_1; x_2]$$

$$x_3 := \frac{a_1 + b_1}{2}, \text{ рассмотрим } f(x_3)$$

$$1) f(x_3) = c \implies q.e.d.$$

$$2) f(x_3) < c \implies [a_2; b_2] := [x_3; b_1]$$

$$3) f(x_3) > c \implies [a_2; b_2] := [a_1; x_3]$$

Применяя это правило, продолжим строить последовательность отрезков

Если ни на какой итерации не произойдёт случай 1), то получим счётно бесконечную

последовательность отрезков  $\{[a_n; b_n]\}_{n \in \mathbb{N}}$

По построению ч.п.  $\{a_n\}$  неубывает и ограничена сверху  $b \implies \exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \leq b$

По построению ч.п.  $\{b_n\}$  невозрастает и ограничена снизу  $a \implies \exists \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n \geq a$

$$b_n - a_n = \frac{b - a}{2^{n-1}} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = x_0$$

$$x_0 \in [a; b] \implies f(x) \text{ непрерывна в } x_0 \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \implies$$

$$\implies \text{по определению по Гейне } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(b_n) = f(x_0)$$

$$\text{По построению } f(a_n) < c \wedge f(b_n) > c \implies c \leq f(x_0) \leq c \implies f(x_0) = c$$

■

**Corollary Следствие из теоремы:**

$$f(x) \text{ непрерывна на } [a; b] \implies E_f = [\inf E_f; \sup E_f]$$

**Corollary Следствие**

$$f(x) = x^2 \wedge X \geq 2 \wedge D_f = [0; X] \wedge E_f = [0; X^2] \implies \exists x_0 \in \mathbb{R} : x_0^2 = 2$$

**Corollary Следствие**

$$f(x) \text{ непрерывна на } [a; b] \wedge f(a) < 0 \wedge f(b) > 0 \implies \exists c \in (a; b) : f(c) = 0$$

**Definition: Достаточное условие обратимости**

Если функция  $f(x)$  строго монотонна на  $X$ , то  $f(x)$  обратима

**Proof:**

Предположим от противного, что  $f(x)$  не инъективна, то есть

$$\exists x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2)$$

$$x_1 \neq x_2 \implies \min(x_1, x_2) < \max(x_1, x_2) \implies \textcircled{W} \text{ с определением строгой монотонности}$$

■

### Definition: Критерий обратимости функции

Пусть функция  $f(x)$  непрерывна на  $[a; b]$ . Тогда  $f(x)$  обратима *iff*  $f(x)$  строго монотонна

**Proof:**

"  $\Leftarrow$  "Смотри достаточное условие обратимости

"  $\Rightarrow$  "

Докажем для случая, когда  $f(x)$  строго монотонно возрастает, для убывания аналогично

Предположим от противного, тогда БОО

$\exists x_1 < x_2 < x_3 \in [a; b] : f(x_1) < f(x_2) \geq f(x_3)$

Если  $f(x_2) = f(x_3)$ , то  $f$  не инъективна  $\Rightarrow f$  не обратима  $\Rightarrow \textcircled{W}$

Иначе, положим  $c := \frac{\max(f(x_1), f(x_3)) + f(x_2)}{2} \Rightarrow f(x_1) < c < f(x_2) \wedge f(x_3) < c < f(x_2)$

$f$  непрерывна на  $[a; b] \Rightarrow f$  непрерывна на  $[x_1; x_2]$  и  $[x_2; x_3]$

$f$  непрерывна на  $[x_1; x_2] \Rightarrow \exists x'_0 \in (x_1; x_2) : f(x'_0) = c$

$f$  непрерывна на  $[x_2; x_3] \Rightarrow \exists x''_0 \in (x_2; x_3) : f(x''_0) = c$

Получили:  $\exists x'_0 < x''_0 \in [a; b] : f(x'_0) = f(x''_0) \Rightarrow f$  не инъективна  $\Rightarrow f$  не обратима  $\Rightarrow \textcircled{W}$

■

### Theorem

Если функция  $f(x)$  непрерывна и строго монотонна на  $[a; b]$ , то функция  $f^{-1}(y)$  :

- 1) определена на  $[\min(f(a), f(b)); \max(f(a), f(b))]$
- 2) монотонна (и имеет ту же монотонность)  $[\min(f(a), f(b)); \max(f(a), f(b))]$
- 3) непрерывна на  $[\min(f(a), f(b)); \max(f(a), f(b))]$

**Proof:**

1. Доказано по критерию обратимости функции

2. БОО  $f$  возрастает на  $[a; b]$

Предположим от противного

$f^{-1}(y)$  не возрастает на  $[a; b] \implies \exists y_1 < y_2 \in [f(a); f(b)] : f^{-1}(y_1) \geq f^{-1}(y_2)$

По определению обратной функции  $f^{-1}(y_1), f^{-1}(y_2) \in [a; b]$ , обозначим  $x_1 = f^{-1}(y_1), x_2 = f^{-1}(y_2)$

$x_1 \geq x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$ . При этом,  $f(x_1) = y_1 \wedge f(x_2) = y_2$

$x_1 \geq x_2 \implies y_1 \geq y_2 \implies \textcircled{\text{W}}$

3. Докажем непрерывность по определению

Дано:  $x = f^{-1}(y)$  - определённая монотонная на  $[a; b]$  функция

Докажем, что  $f^{-1}$  непрерывна в любой точке  $y_0 \in (f(a); f(b))$

Для  $y_0 \in \{f(a), f(b)\}$  доказательство аналогично (нужно рассмотреть односторонние пределы)

По определению непрерывности в точке  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in \dot{U}_\delta(y_0) : |f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| < \epsilon$

Обозначим  $f^{-1}(y_0) = x_0$

БОО докажем для таких  $\epsilon$ , что  $U_\epsilon(x_0) \subset (a; b)$ . Для *больших*  $\epsilon$  неравенство также будет выполняться  $a < x_0 - \epsilon < x_0 + \epsilon < b$

Обозначим  $y_1 = f(x_0 - \epsilon), y_2 = f(x_0 + \epsilon)$ , тогда  $y_1 < y_0 < y_2$

Положим  $\delta := \min(y_2 - y_0, y_0 - y_1)$ , тогда  $U_\delta(y_0) \in (y_1; y_2)$

Докажем, что при выбранном  $\delta$  выполняется неравенство под знаками кванторов:

$y \in U_\delta(y_0) \implies y \in (y_1; y_2) \implies f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y) < f^{-1}(y_2) \implies x_0 - \epsilon < f^{-1}(y) < x_0 + \epsilon \implies$   
 $\implies |f^{-1}(y) - x_0| < \epsilon \implies$  неравенство под кванторами верно и определение выполняется

■

**Corollary Следствие (без доказательства)**

Если функция  $f(x)$  непрерывна и строго монотонна на  $[a; b], a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ , то функция  $f^{-1}(y)$  :

- 1) определена на  $(\min(f(a), f(b)); \max(f(a), f(b)))$
- 2) монотонна (и имеет ту же монотонность)  $[\min(f(a), f(b)); \max(f(a), f(b))]$
- 3) непрерывна на  $(\min(f(a), f(b)); \max(f(a), f(b)))$

Идея доказательства: рассмотрим  $[c; d] \cup (a; b)$ , для него верна теорема выше, а далее перейти к пределу при границах, стремящихся к  $a$  и  $b$

**Corollary**

Т.к.  $f(x) = x^n$  непрерывна и строго монотонно возрастает на  $D_f = n \stackrel{?}{:} 2 [0; +\infty) : \mathbb{R}$ , то

$g(x) = \sqrt[n]{x}$  непрерывна и строго монотонно возрастает на  $D_g = E_f = n \stackrel{?}{:} 2 [0; +\infty) : \mathbb{R}$

**Definition: Обратные тригонометрические функции**

$y = \sin x$  непрерывна и возрастает на  $D_f = [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \implies$

$\implies \exists \arcsin := \sin^{-1} : y = \arcsin x$  непрерывна и возрастает на  $D_f = [-1; 1], E_f = [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$

Аналогично

- $y = \arccos x$  непрерывна и убывает на  $D_f = [-1; 1], E_f = [0; \pi]$
- $y = \arctan x$  непрерывна и возрастает на  $D_f = \mathbb{R}, E_f = (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$
- $y = \operatorname{arctg} x$  непрерывна и убывает на  $D_f = \mathbb{R}, E_f = (0; \pi)$



### Definition: Показательная функция

(теорема без доказательства) функция  $y = a^x, a > 0$

- 1) определена на  $D_f = \mathbb{R}, E_f = (0; +\infty)$
- 2) возрастает при  $a > 1$  и убывает при  $0 < a < 1$
- 3) непрерывна на  $\mathbb{R}$
- 4)  $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$

/\* Следствие:  $\phi(x) = a^x$  является изоморфизмом между  $(\mathbb{R}, +)$  и  $(\mathbb{R}_+, \cdot)$  \*/  
 $(a^x)^y = a^{xy}$

### Definition: Логарифмическая функция

Функция, обратная к  $y = a^x, a \in (0; 1) \cup (1; +\infty)$  обозначается  $y = \log_a x$

- 1) определена на  $D_f = (0; +\infty), E_f = \mathbb{R}$
- 2) возрастает при  $a > 1$  и убывает при  $0 < a < 1$
- 3) непрерывна на  $(0; +\infty)$
- 4)  $\log_a x + \log_a y = \log_a xy$

/\* Следствие:  $\psi(x) = \log_a x$  является изоморфизмом между  $(\mathbb{R}_+, \cdot)$  и  $(\mathbb{R}, +)$  \*/  
 $\log_a x^\alpha = \alpha \log_a x$

### Corollary Следствия из 2 замечательного предела

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

**Proof:**

$$\frac{\ln(x+1)}{x} = \frac{1}{x} \ln(x+1) = \ln(x+1)^{\frac{1}{x}}$$

Функция  $\ln x$  непрерывна, тогда по теореме о пределе сложной функции

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(x+1)^{\frac{1}{x}} = 1$$

■

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

**Proof:**

$$t = e^x - 1 \implies x = \ln(t+1)$$

$$x \rightarrow 0 \implies t \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(t+1)} = 1$$

■

### Corollary Показательная функция с вещественным показателем

$$y = x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}, D_f = (0; +\infty)$$

$$y = e^{\alpha \ln x}$$

$\ln x$  непрерывна и возрастает на  $(0; +\infty)$

$\alpha \ln x$  непрерывна и возрастает при  $\alpha > 0$  и убывает при  $\alpha < 0$

$e^{\alpha \ln x}$  непрерывна и возрастает при  $\alpha > 0$  и убывает при  $\alpha < 0$

### Corollary

$\lim_{x \rightarrow +\infty} a(x) = a \wedge \lim_{x \rightarrow +\infty} b(x) = b \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} a(x)^{b(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{b(x) \ln a(x)} = e^{b \ln a} = a^b$   
Для ч.п.  $\{a_n\}$  и  $\{b_n\}$  построим кусочно-линейные функции  $a(x)$  и  $b(x)$ , такие что  $\forall n \in \mathbb{N} : a(n) = a_n \wedge b(n) = b_n$

### Definition: Производная

Производная функции  $f$  в точке  $x_0$  - это предел

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

### Note

$\forall x \in \mathbb{R} : (\sin x)' = \cos x$

**Proof:**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2 \sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right) \cos\left(\frac{x+x_0}{2}\right)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \cos\left(\frac{x+x_0}{2}\right) = \cos x_0$$

### Note

$\forall x \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : (x^n)' = nx^{n-1}$

**Proof:**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(x - x_0) \sum_{k=0}^{n-1} x^{n-1-k} x_0^k}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=0}^{n-1} x^{n-1-k} x_0^k = nx_0^{n-1}$$

### Note

$(a^x)' = a^x \ln a$

**Proof:**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a^x - a^{x_0}}{x - x_0} &= a^{x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a^{x-x_0} - 1}{x - x_0} = a^{x_0} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{a^t - 1}{t} = \\ &= a^{x_0} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{t \ln a} - 1}{t} = a^{x_0} \lim_{s \rightarrow 0} \frac{e^s - 1}{s} \cdot \ln a = a^{x_0} \ln a \end{aligned}$$

### Claim Правила подсчёта производных

Если  $\exists f'(x), \exists g'(x), \alpha \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{R}$ , то

- $(\alpha f(x) + \beta g(x))' = \alpha f'(x) + \beta g'(x)$
- $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
- $g(x) \neq 0 \implies \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$

При нахождении опечаток просьба написать [https://t.me/i8088\\_t](https://t.me/i8088_t), на момент компиляции ник в тг: vova kormilitsyn