

高等数学

零基础

1.	符号	名称	符号	名称
	$\cup$	并集 (或)	$\vee$	析取
	$\cap$	交集 (且)	$\wedge$	合取

2. 逆否命题: 若 $A \rightarrow B$, 则 $\bar{B} \rightarrow \bar{A}$

德摩根律: 短的并/交变成长 的交/并

◦ $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

◦ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

3. 数学归纳法: 设 $T(n)$ 是关于自然数 n 的命题, 若

1. $T(1)$ 成立

2. 设 $T(k)(k \geq 1)$ 成立

3. 证得 $T(k+1)$

则 $T(n)$ 成立

4. 有理式的运算 // TODO

5. 无理式的运算

◦ $(\sqrt[n]{a})^k = \sqrt[n]{a^k}$

◦ 只要根号下为偶数次方, 化简出来就必须要加绝对值

6. 均值不等式: $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

三角不等式: $||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$

◦ 第一个小于等于号: 当且仅当 $ab \leq 0$, 即 a, b 异号时取等

◦ 第二个小于等于号: 当且仅当 $ab \geq 0$, 即 a, b 同号时取等

柯西不等式: $(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^2$

◦ 常考 $(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2)^2$

◦ 可化为 $\|\alpha\| \cdot \|\beta\| \geq \|\alpha\| \|\beta\| \cos \theta$

7. 多次相乘、相除、开方、乘方的式子, 取对数可以化简

8.	函数	定义域	值域
	$\arcsin x$	$x \in [-1, 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
	$\arccos x$	$x \in [-1, 1]$	$[0, \pi]$
	$\arctan x$	$x \in \mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

9. 图形变换

◦ 函数上加下减, 自变量左加右减

◦ 函数乘 k 垂直伸长 k 倍, 自变量乘 k 水平伸长 $\frac{1}{k}$ 倍

10. 三角万能公式: $a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2 + b^2}\sin x + \phi$, 其中 $\tan\phi = \frac{b}{a}$

第 1 讲 函数极限与连续

// TODO

第 2 讲 数列极限

// TODO

第 3 讲 一元函数微分学的概念

// TODO

第 4 讲 一元函数微分学的计算

// TODO

第 5 讲 一元函数微分学的应用——几何应用

[P190] 极值第三充分条件

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0 (m = 1, 2, \dots, n-1), f^{(n)}(x_0) \neq 0 (n \geq 2)$, 则

1. 当 n 为偶数且 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处取得 **极大值**
2. 当 n 为偶数且 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处取得 **极小值**

[P195] 拐点第三充分条件

设 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0 (m = 2, \dots, n-1), f^{(n)}(x_0) \neq 0 (n \geq 3)$, 则当 n 为奇数时, 点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的 **拐点**。

[P196] 极值点与拐点的重要结论

1. 曲线的可导点不可同时为极值点和拐点; 曲线的不可导点可同时为极值点和拐点
 - P196 例 5.6
2. 设多项式函数 $f(x) = (x-a)^n g(x) (n > 1)$, 且 $g(a) \neq 0$, 则
 - 当 n 为 **偶数** 时, $x = a$ 是 $f(x)$ 的极值点
 - 当 n 为 **奇数** 时, 点 $(a, 0)$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点
 - P197 例 5.7, 需注意 $n > 1$ 条件
3. 设多项式函数 $f(x) = (x-a_1)^{n_1}(x-a_2)^{n_2}\dots(x-a_k)^{n_k}$, 其中 n_i 为正整数, a_i 是实数且 a_i 两两不等, $i = 1, 2, \dots, k$
 - 记 k_1 为 $n_i = 1$ 的个数, k_2 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为偶数的个数, k_3 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为奇数的个数, 则 $f(x)$ 的 **极值点** 个数为 $k_1 + 2k_2 + k_3 - 1$, **拐点** 个数为 $k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2$

[P198] 渐近线

1. 寻找渐近线的程序
 - 先找函数的 **无定义点**, **定义区间的端点** 或 **分段函数的分段点**
 - 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, 则 $x = x_0$ 为一条铅直渐近线

- 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = C$, 则存在水平渐近线
- 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, 则判断若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a \neq 0$, 求出 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$, 当 a, b 都存在时, 则存在斜渐近线, 否则没有斜渐近线

[P206] 曲率及曲率半径

1. 设 $f(x)$ 二阶可导, 则曲线 $y = y(x)$ 在点 $(x, y(x))$ 处的曲率 $k = \frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$
2. 曲率半径 $R = \frac{1}{k} (y'' \neq 0)$

杂项

1. $f(x)'' > 0$ 凹
 $f(x)'' < 0$ 凸

第 6 讲 一元函数微分学的应用 (二) ——中值定理、微分等式与微分不等式

// TODO

第 7 讲 一元函数微分学的应用 (三) ——物理应用与经济应用

// TODO

第 8 讲 一元函数积分学的概念与性质

[P244] 原函数存在定理 (不定积分存在定理)

1. 连续函数 $f(x)$ 必有原函数 $F(x)$
2. 含有 **第一类间断点** 和 **无穷间断点** 的函数没有原函数

[P253] 定积分存在定理

1. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且只有 **有限个** 间断点, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 存在 (黎曼积分)

[P261] 变限积分性质

1. 若 $f(x)$ 在 I 上连续, 则 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 I 上可导, 且 $F'(x) = f(x)$
2. 若 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 在 I 上唯一跳跃间断点, 则 $F(x)$ 不可导, 且
$$\begin{cases} F'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \\ F'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \end{cases}$$
3. 若 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 在 I 上唯一可去间断点, 则 $F(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

第 9 讲 一元函数积分学的计算

[P285] $e^{ax} \sin bx$ 和 $a^{ax} \cos bx$ 的积分

$$\int e^{ax} \sin bx = \frac{1}{a^2 + b^2} \left| \begin{array}{cc} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{array} \right| + C$$
$$\int e^{ax} \cos bx = \frac{1}{a^2 + b^2} \left| \begin{array}{cc} (e^{ax})' & (\cos bx)' \\ e^{ax} & \cos bx \end{array} \right| + C$$

[P286] 有理函数的积分

// TODO

[P292] 区间再现公式

1. 设 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$

[P292] 华里士公式

$$\bullet \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots 1, n \text{ 为大于 1 的奇数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2}, n \text{ 为正偶数} \end{cases}$$
$$\bullet \int_0^{\pi} \sin^n x dx = \begin{cases} 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots 1, n \text{ 为大于 1 的奇数} \\ 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2}, n \text{ 为正偶数} \end{cases};$$
$$\int_0^{\pi} \cos^n x dx = \begin{cases} 0, n \text{ 为正奇数} \\ 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2}, n \text{ 为正偶数} \end{cases}$$
$$\bullet \int_0^{2\pi} \sin^n x dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x dx = \begin{cases} 0, n \text{ 为正奇数} \\ 4 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2}, n \text{ 为正偶数} \end{cases}$$

[P301] Γ 函数

$$1. \Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = 2 \int_0^{+\infty} t^{2\alpha-1} e^{-t^2} dt$$

$$2. \Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$$

$$3. \Gamma(1) = 1, \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \Gamma(n+1) = n!, \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}$$

第 10 讲 一元函数积分学的应用 (一) ——几何应用

// TODO

第 11 讲 一元函数积分学的应用 (二) ——积分等式与积分不等式

[P330] 积分等式

1. 用 中值定理

设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 有

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$$

2. 用夹逼准则

例 11.5: 设函数 $f(x) = x - [x]$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = ?$

解答: 当 $n \leq x \leq n+1$ 时, $\frac{n}{2} \leq \int_0^x f(t)dt \leq \frac{n+1}{2}$.

从而有 $\frac{n}{2(n+1)} \leq \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt \leq \frac{n+1}{2n}$. 由夹逼准则得到原式的值为 $\frac{1}{2}$

3. 用积分法

[P334] 积分不等式

1. 用函数单调性: 见 $f(x)$ 单调想到它, 积分上限变量化

2. 用拉格朗日中值定理: 见 $f(x)$ 一阶可导想到它

3. 用泰勒公式: 见 $f(x)$ 二阶可导想到它

4. 用积分法

5. 用牛顿-莱布尼茨公式

例 11.11: 设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, 证明: $|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(t)|dt$

解答: 由 $f(x) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t)dt$, $-f(x) = f(b) - f(x) = \int_x^b f'(t)dt$ 得 $|f(x)| + |f(x)| = 2|f(x)| \leq \int_a^x |f'(t)|dt + \int_x^b |f'(t)|dt = \int_a^b |f'(t)|dt$, 将 2 除到右边得证。

第 12 讲 一元函数积分学的应用 (三) ——物理应用与经济应用

// TODO

第 13 讲 多元函数微分学

[P357] 可微的必要条件

1. 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微, 则该函数在该点处 **偏导数必存在**。

[P358] 可微的充分条件

1. 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处 **偏导数存在且连续**, 则函数在点 (x, y) 处可微。

2. 定义法判断某点可微, 可联系一元函数 P160

1. 写出全增量 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$

2. 写出线性增量 $A\Delta x + B\Delta y$, 其中 $A = f'_x(x_0, y_0)$, $B = f'_y(x_0, y_0)$

3. 求极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta z - (A\Delta x + B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$, 若为 0 则可微。

[P364] 隐函数存在定理

例 13.14: 设 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 某邻域内有连续的偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0$, 则 $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ 是 $F(x, y) = 0$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内能确定一个连续函数 $y = y(x)$, 且满足 $y_0 = y(x_0)$, 并有连续导数的 () 条件.

解答: 充分不必要. $\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_y}$ 可以推出 $F'_y \neq 0$ 时为充分条件. 反之不一定, 如 $F(x, y) = x^3 - xy, F(0, 0) = 0, F'_y(0, 0) = -x|_{x=0} = 0$, 但 $F(x, y) = 0$ 可确定函数 $y = x^2$.

[P370] 多元函数无条件极值

1. 二元函数取极值的充分条件: 记 $\begin{cases} f''_{xx}(x_0, y_0) = A, \\ f''_{xy}(x_0, y_0) = B, \\ f''_{yy}(x_0, y_0) = C, \end{cases}$ 则

$$\Delta = AC - B^2 \begin{cases} > 0 \Rightarrow \text{极值} \\ < 0 \Rightarrow \text{非极值} \\ = 0 \Rightarrow \text{方法失效} \end{cases} \begin{cases} A < 0 \Rightarrow \text{极大值} \\ A > 0 \Rightarrow \text{极小值} \end{cases}$$

[P371] 条件最值与拉格朗日乘数法

// TODO

第 14 讲 二重积分

[P384] 二重积分中值定理

1. 设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上 **连续**, A 为 D 的面积, 则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) 使得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) A.$$

2. **例 14.2:** 设

$$D_t = \{(x, y) | 2x^2 + 3y^2 \leq 6t\} (t \geq 0), f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt[3]{1 - (x^2 + y^2)} - 1}{e^{x^2 + y^2} - 1}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ a, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

为连续函数, 令 $F(t) = \iint_{D_t} f(x, y) dx dy$, 则 $F'_+(0) = ?$

解答: 由连续可得 $a = -\frac{1}{3}$; 根据中值定理, 有 $F(t) = \iint_{D_t} f(x, y) dx dy = f(\xi, \eta) \sqrt{6\pi} t$,

$$\text{于是 } F'_+(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t) - F(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi, \eta) \sqrt{6\pi} t}{t} = -\frac{\sqrt{6\pi}}{3}$$

[P387] 轮换对称性

// TODO

[P400] 换元法

1. 雅可比行列式: $\iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{uv}} f[x(u, v), y(u, v)] \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$, 其中

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

- $f(x, y) \rightarrow f[x(u, v), y(u, v)]$
- $\iint_{D_{xy}} \rightarrow \iint_{D_{uv}}$
- $dxdy \rightarrow \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$ (雅可比行列式的绝对值)

第 15 讲 微分方程

[P422] 可分离变量型微分方程

// TODO

[P424] 齐次型微分方程

// TODO

[P424] 一阶线性微分方程

1. $y' + p(x)y = q(x)$ 通解为 (推导: 两边乘以 $e^{\int p(x)dx}$)

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left[\int e^{\int p(x)dx} \cdot q(x)dx + C \right]$$

2. 亦可写成

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt} \left[\int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^t p(s)ds} \cdot q(t)dt + C \right]$$

3. 特别地, 若 $\int p(x)dx = \ln |\phi(x)|$, 这里的绝对值可不加

[P427] 伯努利方程

1. $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n (n \neq 0, 1)$ 解法:

- 同乘 y^{-n} , $y^{-n} \frac{dy}{dx} + p(x)y^{1-n} = q(x)$
- 令 $z = y^{1-n}$

[P428] 二阶可降阶微分方程

// TODO

[P430] 二阶常系数齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

- 解的结构: $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$, 其中 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \neq C$
- 通解: 对于特征方程 $r^2 + pr + q = 0$
 - 若 $p^2 - 4q > 0$, 设 r_1, r_2 为两个不等实根, 则通解为 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
 - 若 $p^2 - 4q = 0$, 则通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
 - 若 $p^2 - 4q < 0$, 设 $\alpha \pm \beta i$ 是一对共轭复根, 则通解为 $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

复数根通解推导: [常系数二阶线性齐次微分方程的求解 - 知乎](#)

[P432] 二阶常系数非齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = f(x) (f(x) \neq 0)$$

• 解的结构:

- 若 $y_1^*(x), y_2^*(x)$ 分别是 $y'' + py' + qy = f_1(x), y'' + py' + qy = f_2(x)$ 的解, 则 $y_1^*(x) + y_2^*(x)$ 是 $y'' + py' + qy = f_1(x) + f_2(x)$ 的解。
- 若 $y_1^*(x), y_2^*(x)$ 都是 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的特解, 则 $y_1^*(x) - y_2^*(x)$ 是对应齐次方程 (导出方程) 的解。

• 特解:

1. 当 $f(x) = P_n(x)e^{\alpha x}$ 时, 特解为 $y^* = e^{\alpha x}Q_n(x)x^k$, 其中 $k = \begin{cases} 0, \alpha \text{不是特征根} \\ 1, \alpha \text{是单特征根} \\ 2, \alpha \text{是二重特征根} \end{cases}$
2. 当 $f(x) = e^{\alpha x}[P_m(x)\cos\beta x + P_n(x)\sin\beta x]$ 时, 特解为 $y^* = e^{\alpha x}[Q_l^{(1)}(x)\cos\beta x + Q_l^{(2)}(x)\sin\beta x]x^k$, 其中 $l = \max(m, n); k = \begin{cases} 0, \alpha \pm \beta i \text{不是特征根} \\ 1, \alpha \pm \beta i \text{是特征根} \end{cases}$

例 15.19: 已知某四阶常系数齐次线性微分方程有特解 $y_1(x) = e^x \cos 2x, y_2(x) = x$, 且方程中 $y^{(4)}$ 前系数为 1, 该方程为__

解答: 特征根分别为 $1 \pm 2i, 0, 0$. ($(C_1 + C_2x)e^{rx}$ 知 0 为二重根) 故方程为 $y^{(4)} - 2y^{(3)} + 5y'' = 0$.

[P433] 微分算子法

将微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 写成 $(D^2 + pD + q)y = f(x)$, 记 $D^2 + pD + q = F(D)$, 即 $y^* = \frac{1}{F(D)}f(x)$.

1. $\frac{1}{F(D)}e^{\alpha x}$ 型

若 $F(D)|_{D=\alpha} \neq 0$, 则 $y^* = \frac{1}{F(D)|_{D=\alpha}}e^{\alpha x}$.

若 $F(D)|_{D=\alpha} = 0, F'(D)|_{D=\alpha} \neq 0$, 则 $y^* = x \frac{1}{F'(D)|_{D=\alpha}}e^{\alpha x}$

2. $\frac{1}{D^2 + q} \cos \beta x$ ($\sin \beta x$ 同理)

若 $(D^2 + q)|_{D=\beta i} \neq 0$, 则 $y^* = \frac{1}{(D^2 + q)|_{D=\beta i}} \cos \beta x$

若 $(D^2 + q)|_{D=\beta i} = 0$, 则 $y^* = x \frac{1}{(D^2 + q)'} \cos \beta x$

3. $\frac{1}{F(D)} \cos \beta x$ ($\sin \beta x$ 同理)

优先把 $D^2 = (\beta i)^2$ 代进去

4. $\frac{1}{F(D)}(x^k + a_1x^{k-1} + \cdots + a_{k-1}x + a_k)$

将 $\frac{1}{F(D)}$ 展开为 k 次泰勒多项式。

5. $\frac{1}{F(D)}e^{\alpha x}v(x)$

$y^* = e^{\alpha x} \frac{1}{F(D + \alpha)}v(x)$, 即 $e^{\alpha x}$ 提到前面, D 换成 $D + \alpha$.

[P439] 欧拉方程

$$x^2 y'' + pxy' + qy = f(x)$$

1. 当 $x > 0$ 时, 令 $x = e^t$

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dt} \frac{dt}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2}$$

$$\text{方程化为: } -\frac{d^2 y}{dt^2} + (p-1) \frac{dy}{dt} + qy = f(e^t)$$

2. 当 $x < 0$ 时, 令 $x = -e^t$, 同理

杂项

1. 微分方程表达了函数及其各阶导数的关系
2. 微分方程任意阶可导
3. 微分方程解题步骤: 辨别出形式, 使用对应方法求解

附录: 杂项

点到直线距离: 点 (x_0, y_0) 到直线 $Ax + By + C = 0$ 距离 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

极值点 是 **横坐标**, **拐点** 是 **点**

截距 有正负

$$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{\begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{vmatrix}}{a^2 + b^2} + C$$

斯特林公式: $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$

重要展开式:

1. $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, -\infty < x < +\infty$
2. $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, -\infty < x < +\infty$
3. $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, -\infty < x < +\infty$
4. $\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, -\infty < x < +\infty$
5. $\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, -\infty < x < +\infty$
6. $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, -1 < x < 1$
7. $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, -1 < x < 1$
8. $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, -1 < x \leq 1$

$$9. (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \cdots.$$

$$10. \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, -1 \leq x \leq 1$$

常用幂级数:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), -1 \leq x < 1$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, -1 < x < 1$$

常用等价无穷小:

$$1. (1+x)^{\alpha(x)} - 1 \sim \alpha(x)x \quad (\text{成立条件: } \alpha(x)x \rightarrow 0)$$

2.

常用高阶导数:

$$1. (e^{ax+b})^{(n)} = a^n e^{ax+b}$$

$$2. [\sin(ax+b)]^{(n)} = a^n \sin\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$3. [\cos(ax+b)]^{(n)} = a^n \cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$4. [\ln(ax+b)]^{(n)} = (-1)^{n-1} a^n \frac{(n-1)!}{(ax+b)^n}$$

$$5. \left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}$$

常用积分:

$$1. \int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C, \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$2. \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C, \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

$$3. \int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C, \int \frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$4. \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$5. \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$6. \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

$$7. \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

常用和差化积、积化和差:

$$1. \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$2. \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$3. \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$4. \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$5. \cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$6. \sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$7. \sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$8. \sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$9. \cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$10. \cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\text{曲率: } k = \frac{|y''|}{[1 + y'^2]^{\frac{3}{2}}}, \text{ 曲率半径: } R = \frac{1}{k}$$

组合数:

$$1. n \cdot C_m^n = m \cdot C_{m-1}^{n-1}$$

放缩总结

$$1. x + A > x$$

$$a > b \Rightarrow A * a > A * b$$

$$2. (1 + x)^n \geq 1 + nx$$

3.

线性代数

零基础

// TODO

第 1 讲 行列式

[P11] 三阶行列式的计算

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{32}a_{21} + a_{31}a_{23}a_{12} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

1. 画线法只是巧合而已

[P11] 几何意义

1. 行列式不为 0，说明对应的测度不为 0（二阶对应平行四边形的面积，三阶对应平行六面体的体积，以此类推）
 - 行列式为 0，向量组线性相关
 - 行列式不为 0，向量组线性无关

[P12] 行列式的性质

1. $|A| = |A^T|$
2. 若行列式中某行（列）全为 0，则行列式为 0
3. **倍乘**：若行列式中某行（列）元素有公因子 $k(k \neq 0)$ ，则 k 可以提到行列式外面
4. 行列式中某行（列）元素均是两个数之和，则可拆成两个行列式之和
5. **互换**：行列式中两行（列）互换，行列式变号
6. 行列式中的两行（列）元素相等或对应成比例，则行列式为 0
7. **倍加**：行列式中某行（列）的 k 倍加到另一行（列），行列式不变

[P18] 行列式展开公式

按行展开： $|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij}$

按列展开： $|A| = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij}$

代数余子式： $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$

余子式 M_{ij} ： n 阶行列式中，去掉 a_{ij} 所在的第 i 行、第 j 列元素，由剩下的元素按原来的位置与顺序组成的 $n-1$ 阶行列式称为元素 a_{ij} 的余子式，记作 M_{ij}

1. 计算行列式的思路：使用性质化简行列式，画到某一行（列）只有一个元素非 0，然后使用展开定理只需计算一项
2. **不同行（列）的代数余子式与元素点积恒为 0**

[P19] 几个重要的行列式

1. 主对角线：这个形状 $\backslash$

- $\prod_{i=1}^n a_{ii}$

2. 副对角线：这个形状 $/$

- $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \dots a_{n1}$

- 前面的因子实际上是后面排列的 **逆序数** 项,

$$\tau(n, n-1, n-2, \dots, 1) = (n-1) + (n-2) + \dots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$$

- 后面的因子是 **副对角线累乘**

[P35] 克拉默法则

1. 非齐次线性方程组 // TODO

2. 齐次线性方程组：若 $D \neq 0$ ，只有零解；若 $D = 0$ ，有无穷非零解

杂项

1. 行列式行列地位等价

第 2 讲 矩阵

// TODO

第 3 讲 向量组

// TODO

第 4 讲 线性方程组

// TODO

第 5 讲 特征值与特征向量

// TODO

第 6 讲 二次型

// TODO

附录：杂项

// TODO

高等数学——提高

// TODO

线性代数——提高

// TODO