



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
FACULTAD DE SISTEMAS

ALUMNO: RICARDO GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ
MATRICULA: 17001433

MODELOS COMPUTACIONALES

TAREA 1

PROFESORA: VALERIA SOTO MENDOZA

09 DE FEBRERO DE 2022

Tarea 1

Ricardo Gabriel Rodríguez González

2/2/2022

Ejercicio 1.- Se tiene el caso de tirar un dado no cargado. Define lo siguiente:

- a) ¿Cuál es la variable aleatoria que representa la cara del dado que sale hacia arriba?

```
w <- c(1:6)
print(w)

## [1] 1 2 3 4 5 6
```

- b) ¿Cual es la fdp?

```
fdp <- 1/6
print(fdp)

## [1] 0.1666667
```

- c) ¿Y cual es la FDA?

```
FDA <- function(x){
  sum(x*fdp)
}
print(FDA)

## function(x){
##   sum(x*fdp)
## }
```

- d) Calcule la media y la varianza.

#La media se calcula como sigue:

```
media <- sum(w)/length(w)
print(media)

## [1] 3.5

varianza <- ((w - media)^2)/length(w)
print(varianza)

## [1] 1.04166667 0.37500000 0.04166667 0.04166667 0.37500000 1.04166667
```

Se resolvió con uniforme discreta

Ejercicio 2.- Una aguja de longitud l tiene un pivote en el centro de un círculo, cuyo diámetro es igual a l . Defina lo siguiente: a) ¿Cuál es la variable aleatoria que representa la posición de la aguja?

x es la variable aleatoria continua que representa la posición de la aguja, $0 \leq x \leq \pi$

```
x <- 1*pi
print(x)

## [1] 3.141593
```

b) ¿Cuál es la fdp?

```
fdp <- 1/(2*pi)
print(fdp)

## [1] 0.1591549
```

c) ¿Y cuál es la FDA?

```
FDA <- x/(2*pi)
print(FDA)

## [1] 0.5
```

d) Calcule la media y la varianza

```
#media <- l*pi

#varianza <- (x - l*pi)^2 * 1/(2*pi) dx
#x^2 - 2*x*l*pi + l^2*pi^2

#[x^3/3 - x^2*l*pi + l^2*pi^2*x][1/(2*pi)]
#[(8*pi^3)/3 - 4*pi^2*l*pi + l^2*pi^2*2*pi]
#[(4*pi^2)/3 - 2*(pi^2)*l + (l^2)*pi^2]
```

Ejercicio 3.- Las labores diarias de John Doe requieren hacer 10 viajes redondos por automóvil entre dos ciudades. Una vez que realiza los 10 viajes, el señor Doe puede descansar el resto del día, una motivación suficientemente buena para exceder el límite de velocidad. La Experiencia muestra que hay un 40% de probabilidad de ser multado por exceso de velocidad en cualquier viaje redondo.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el día termine sin una multa por exceso de velocidad?

P = probabilidad de multa

10 = numero de pruebas

x = no hay multas

```
dbinom(0,10,0.4)

## [1] 0.006046618
```

- b) Si cada multa por exceso de velocidad es de \$80, ¿cuál es la multa diaria promedio?

```
x<-10*0.4*80  
print(x)
```

```
## [1] 320
```

Se resolvió con distribución Binomial

Ejercicio 4.-

A un taller de reparación de motores pequeños llegan, trabajos de reparación a razón de 10 por día. a) ¿Cual es el numero promedio de trabajos que se reciben a diario en el taller?

x = Trabajos (discreta)

λ = llegadas

Formulamos λ

```
lambda= (10*1)/8  
print(lambda)
```

```
## [1] 1.25
```

- b) ¿Cuál es la probabilidad de que no lleguen trabajos durante cualquier hora, suponiendo que el taller está abierto 8 horas al día?

Teniendo el valor de λ , la probabilidad de que no lleguen trabajos durante cualquier hora es:

```
dpois(0,1.25,log = FALSE)
```

```
## [1] 0.2865048
```

Se resolvió con distribución Poisson

Ejercicio 5.- Los automóviles llegan al azar a una gasolinera. El tiempo promedio entre llegadas es de 2 minutos. Determine la probabilidad de que el tiempo entre llegadas no exceda de 1 minuto

```
x<-pexp(1,1/2)  
print(x)
```

```
## [1] 0.3934693
```


Se resolvió con Exponencial continua

Ejercicio 6.- Los datos siguientes representan el periodo (en segundos) necesarios para transmitir un mensaje. Construya un histograma de frecuencia adecuado para los datos.

```
x <- c(25.8,47.9,17.8,48.2,5.8, 77.4,5.6,89.3,
      89.5,38.7,67.3,94.8,34.7,35.8,70.9,66.1,36.4,39.2,58.6,
      71.3,35.2,61.3,56.4,65.3,88.9,23.9,93.5,78.7,12.8,21.1,
      36.4,59.3,22.1,30.1,76.4,23.8,36.4,51.9,28.6, 35.9,58.7,
      93.4,48.1,72.5,17.3,36.8,76.7,63.6,82.7,29.2)
```

```
hist(x, breaks = "Sturges")
```

```
hist(x, col = "green", main = "Transmitir Mensaje",
     xlab = "Segundos", ylab = "Frecuencia")
```



Ejercicio 7.- Si la probabilidad de acertar en un blanco es 1/5 y se hacen 10 disparos de forma independiente

Es variable Binomial Discreta.

$x = n$ de aciertos en el blanco $x \rightarrow binomial(n = 10, p = 0.2) \Rightarrow q = 0.8$
`#dbinom(x,n,p)`

¿Cual es la probabilidad de acertar por lo menos dos veces?

La probabilidad de que acerté al menos 2 veces es:

```
x<-c(2:10)
sum(dbinom(x,10,0.2))
```

```
## [1] 0.6241904
```

Se resolvió con distribución Binomial

Ejercicio 8.- Las ventas de combustible en una gasolinera tienen una media de 40,000 litros por día y un mínimo de 30,000 litros por día. Suponga que una distribución uniforme es apropiada.

La variable aleatoria son los litros Distribución uniforme continua

a) Determine las ventas máximas diarias.

```
media <- 40000
a<-30000
b<-(media*2)-30000
print(b)
```

```
## [1] 50000
```

#Es la cantidad maxima de ventas

b) ¿Que porcentaje de dias las ventas excederan de 34,000 litros?

```
b<-50000
a<-30000
fdp <- 1/(b-a)
print(fdp)
```

```
## [1] 5e-05
```

$$\int_x^b f(x)dx = F(x)|_x^b$$

$$\int_x^b 5e-05dx = 5e-05|_x^b$$

Días que se exceden los 34,000 litros:

```
fda<- (5e-05*50000)-(5e-05*34000)
print(fda)
```

```
## [1] 0.8
```

Se resolvió con uniforme continua

Ejercicio 9.- Una variable aleatoria continua X se distribuye uniformemente en el intervalo [2, 4].

a) Determine la función de distribución, valor esperado y varianza.

x = variable aleatoria continua

```
#fdp:
b<-4
a<-2
```

```
fdp <- 1/(b-a)
print(fdp)

## [1] 0.5

#calculamos la media:
media <- (b+a)/2
#La media es:
print(media)

## [1] 3

#Varianza es:
varianza <- (b - a)^2/12
print(varianza)

## [1] 0.3333333
```

b) Para dicha variable, calcule las probabilidades:

c) $P(X \geq 3)$

```
b<-4
a<-3
```

$$\int_3^4 f(x)dx = F(x)|_3^4$$

La probabilidad de $P(X \geq 3)$

```
fda<- (0.5*4)-(0.5*3)
print(fda)

## [1] 0.5
```

ii) $P(1.25 < X \leq 2.05)$

```
b<-2.05
a<-1.25
```

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b$$

La probabilidad de $P(1.25 < X \leq 2.05)$ es:

```
fda<- (0.5*2.05)-(0.5*1.25)
print(fda)

## [1] 0.4
```

Se resolvió con uniforme continua

Ejercicio 10.- Los clientes llegan a una instalación de servicio de acuerdo con la distribución de Poisson, con una frecuencia de cuatro por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos un cliente llegue en determinado intervalo de 30 segundos?

x =variable discreta, llegadas

conseguimos λ de la siguiente manera:

```
lambda= (4*30)/60  
print(lambda)
```

```
## [1] 2
```

Calculando para $P(x=0)$

```
dpois(0,2)
```

```
## [1] 0.1353353
```

Calculamos el complemento

La probabilidad de que al menos un cliente llegue en 30 segundos es la siguiente:

```
cliente = 1-dpois(0,2)
```

```
print(cliente)
```

```
## [1] 0.8646647
```

Se resolvió usando distribución Poisson

Ejercicio 11.- Supóngase que el número de llamadas telefónicas que recibe una operadora desde las 9:00 horas hasta las 9:05 horas sigue una distribución Poisson con $\lambda = 4$. Hallar:

- a) Probabilidad de que la operadora no reciba ninguna llamada al día siguiente en ese intervalo de tiempo.

Resolvemos el problema teniendo en cuenta que: $x = 0$ y $\lambda = 8$ ya sería el día siguiente entonces multiplicamos nuestra $\lambda * 2$

```
prob <- dpois(0,8)  
print(prob)
```

```
## [1] 0.0003354626
```

- b) Probabilidad de que en los dos próximos días la operadora reciba un total de 3 llamadas en ese intervalo de tiempo.

Aquí nuestro valor de $x = 3$ ya que es la probabilidad de que ocurran 3 llamadas en el intervalo de tiempo, y utilizamos $\lambda * 3$ ya que nos piden 3 días después tomando en cuenta el primer día.

```
prob <- dpois(3,12)
print(prob)

## [1] 0.001769533
```

Se resolvió usando distribución Poisson

Ejercicio 12.- La duración de un cierto modelo de batería tiene una distribución exponencial. Se sabe que la media es de 5500 horas. El fabricante de las baterías debe informar cuál es la duración de esas baterías. ¿Qué duración debe informar si quiere que la probabilidad de que una batería concreta viva más que esa duración informada sea del 85%?

La probabilidad de que la batería dure mas del 85% seria:

$P(x > 5500 * .85)$, para utilizar la instrucción en R tendríamos que sacar el complemento.

```
prob <- 1 - pexp(.85*5500,1/5500)
print(prob)

## [1] 0.4274149
```

Se resolvió usando distribución exponencial

Ejercicio 13.- La duración de la vida de una bombilla es exponencial. La probabilidad de que sobrepase las 100 horas de uso es 0.9

a) ¿cuál es la probabilidad de que sobrepase 200 horas de uso?

Pasos Tenemos que

$$P(X > 100) = 1 - P(X \leq 100)$$

Vamos haciendo la formula de forma regresiva para encontrar nuestro valor de λ :

$$1 - F(100) = 1 - [1 - e^{100\lambda}] = 0.9$$

Despejamos para λ

$$e^{-100\lambda} = 0.9 \Rightarrow -100\lambda = \ln 0.9 \Rightarrow -100\lambda = -0.105 \Rightarrow \lambda = \frac{-0.105}{-100} = \lambda = 0.00105$$

```
lambda <- (log(0.9)/-100)
```

Teniendo el valor de λ , lo utilizamos para resolver en las x que nos pide el problema:

```
prob <- 1 - pexp(200,lambda)
print(prob)
```

```
## [1] 0.81
```

b) ¿Cuántas horas se mantiene funcionando con una probabilidad de 0.95?

Tenemos lo siguiente:

$$P(X > t) = 0.95 \Rightarrow P(X > t) = 1 - P(X \leq t) \Rightarrow 1 - F(t) = e^{-0.00105t} = 0.95$$

Tenemos que despejar para t:

$$e^{-0.00105t} = 0.95 \Rightarrow -0.00105t = \ln(0.95) \Rightarrow -0.00105t = -0.05129 \Rightarrow t = \frac{-0.05129}{-0.00105}$$

```
#Valor de t
```

```
valor <- log(0.95)
t <- (valor/-0.00105)
print(t)
```

```
## [1] 48.85076
```

Se resolvió usando distribución exponencial

Ejercicio 14.- El tiempo de revisión del motor de un avión sigue una distribución exponencial con media de 17 minutos.

a) Encontrar la probabilidad de que el tiempo de revisión sea menor a 10 minutos

x = Tiempo de revisión sea menor a 10 minutos

```
pexp(10, 1/17)
```

```
## [1] 0.4446936
```

b) ¿Cuál es el tiempo de revisión de un motor superado por el 10% de los tiempos de revisión.

λ es la misma ya que no hay cambio

```
1-pexp(10, 1/17)
```

```
## [1] 0.002788217
```

c) El costo de revisión es de 200 unidades monetarias fijas al que se le suma 10 unidades monetarias por el tiempo que dure la revisión. Encontrar la media y la varianza del costo.

Se resolvió con distribución exponencial

Ejercicio 15.- Sea X una variable aleatoria normal con $\mu = 50$ y $\sigma^2 = 25$.

Calcular:

a) $P(X \leq 40)$

```
pnorm(40, 50, 25)
```

```
## [1] 0.3445783
```

b) $P(X \leq 60)$

```
pnorm(60,50,25)
```

```
## [1] 0.6554217
```

c) $P(X > 65)$

```
1-pnorm(65,50,25)
```

```
## [1] 0.2742531
```

d) $P(X > 35)$

```
1-pnorm(35,50,25)
```

```
## [1] 0.7257469
```

e) $P(40 < X < 60)$

```
pnorm(c(40,60), mean =50, sd =25)
```

```
## [1] 0.3445783 0.6554217
```

f) $P(30 < X < 42)$

```
pnorm(c(30,42), mean =50, sd=25)
```

```
## [1] 0.2118554 0.3744842
```

Se resolvio con distribucion normal