

Prova 03 - PDS

Aluno: João Costa

Matrícula: 203840603037

Disciplina: Processamento digital de sinais

Professor: Cláudio Coutinho

Turma: Engenharia de Computação 2038

Data: 24/08/21

1)

$$a) \chi(z) = \frac{1 - \frac{1}{3}z^{-3}}{1 + \frac{17}{10}z^{-3} - 2z^{-2}} \cdot \frac{z^3}{z^3} = \frac{z^3 - \frac{1}{3}z^0}{z^3 + \frac{17}{10}z - 2}$$

(Zeros)

$$z^3 - \frac{1}{3}z = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0$$

$$\Delta = \frac{1}{9}$$

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\rightarrow \frac{-(-\frac{1}{3}) \pm \sqrt{\frac{1}{9}}}{2 \cdot 1} = \frac{\frac{1}{3} \pm \frac{1}{3}}{2}$$

$$\frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3}$$

$$\rightarrow \frac{-(-\frac{1}{3}) - \sqrt{\frac{1}{9}}}{2 \cdot 1} = \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{3}}{2} = 0$$

$$= 0$$

(Pólos)

$$z^3 + \frac{17}{10}z - 2 = 0 \rightarrow \frac{289 + 800}{100}$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\left(\frac{17}{10}\right)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)$$

$$\frac{289}{100} - (-2)$$

$$= \frac{1089}{100}$$

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$


$$\rightarrow \frac{-\left(\frac{17}{10}\right) \pm \sqrt{\frac{1089}{100}}}{2 \cdot 1} = \frac{-\frac{17}{10} \pm \frac{33}{10}}{2}$$

$$= \frac{\frac{16}{10} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{4}{5}}$$

$$\rightarrow \frac{-\left(\frac{17}{10}\right) - \frac{33}{10}}{2} = \frac{-\frac{50}{10} \cdot \frac{1}{2}}{2}$$

$$= -\frac{5}{2}$$

# Continuação letra (a) (ROC)



A transformada de Fourier existe!

A ROC compreende o círculo unitário

$$b) X(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{5}{8}z^{-1} - \frac{3}{32}z^{-2}} \cdot \frac{z^2}{z^2} = \frac{z^2 - z}{z^2 - \frac{5}{8}z - \frac{3}{32}}$$

(Zeros)

$$z^2 - z = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0$$

$$\Delta = 1$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm 1}{2}$$

$$x = \frac{1+1}{2} = 1$$

$$x = \frac{1-1}{2} = 0$$

(Polos)

$$z^2 - \frac{5}{8}z - \frac{3}{32} = 0$$

$$\Delta = \left(-\frac{5}{8}\right)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{3}{32}\right)$$

$$\Delta = \frac{25}{64} + \frac{12}{32} = \frac{49}{64}$$


$$x = \frac{-(-\frac{5}{8}) \pm \sqrt{\frac{49}{64}}}{2 \cdot 1} = \frac{\frac{5}{8} \pm \frac{7}{8}}{2}$$

$$\frac{\frac{5}{8} + \frac{7}{8}}{2} = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$$

$$x = \frac{-(-\frac{5}{8}) - \sqrt{\frac{49}{64}}}{2 \cdot 1} = \frac{\frac{5}{8} - \frac{7}{8}}{2}$$

$$\frac{\frac{5}{8} - \frac{7}{8}}{2} = \frac{-2}{16} = -\frac{1}{8}$$

(ROC)



Para um sistema causal levamos em consideração o polo mais externo para determinar a ROC



2)

$$a) x(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}, |z| < \frac{1}{2}$$

$$\frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{\underbrace{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}_{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

or for  $|z| < |a|$

$$x[n] = -a^n u[-n-1] = -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] = z^{-1} \left\{ x(z) \right\}$$

$$b) x(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}}, |z| > \frac{1}{2}$$

$$\frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{\underbrace{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)}_{1 + \frac{1}{4}z^{-1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}z^{-2}}} = \frac{A}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$A = x(z) \cdot \text{den}(A) \Big|_{z = -\frac{1}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{\cancel{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)}\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)} \Big|_{z = -\frac{1}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$A = \frac{1 - \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}}{1 + \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}} = \frac{2}{1 - \frac{2}{4}} = \frac{2}{\frac{2}{4}} = 4$$



Continuação Letra b Questão 02:

$$B = X(z) \cdot \det(B) \Big|_{z=\frac{2}{4}} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)} \cdot \left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$B = \frac{1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}} = \frac{1 + \frac{1}{4}}{1 + \frac{3}{4}} = \frac{\frac{5}{4}}{\frac{7}{4}} = \frac{5}{7}$$

$$X(z) = 4 \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} - 3 \frac{1}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}} \rightarrow \alpha \text{ ou } |z| > |\alpha|$$

$$\mathcal{Z}^{-1}\{X(z)\} = 4\left(-\frac{1}{2}\right)^n U[n] - 3\left(-\frac{1}{4}\right)^n U[n]$$

0.3)

$$a) x[n] = U[-n-1] + \left(\frac{1}{4}\right)^n U[n]$$

$$\mathcal{Z}\{x[n]\} = -\frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

Questão 03 (Letra b):  $1 - \frac{1}{2}z^{-1} + z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}$

Pólos  $\left\{ \begin{matrix} -1 \\ +\frac{1}{2} \end{matrix} \right.$

$$Z\{y[n]\} = \frac{-\frac{1}{2}z^{-1}}{(1+z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})} = \frac{A}{(1+z^{-1})} + \frac{B}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})}$$


$$A = Z\{y[n]\} \cdot \text{den}(A) \Big|_{z=-1} = \frac{-\frac{1}{2}(-1)^{-1}}{1 - \frac{1}{2}(-1)^{-1}} = \frac{+\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}$$

$$B = Z\{y[n]\} \cdot \text{den}(B) \Big|_{z=\frac{1}{2}} = \frac{-\frac{1}{2} \cdot (\frac{1}{2})^{-1}}{1 + (\frac{1}{2})^{-1}} = \frac{-\frac{1}{3}}{4}$$

$$Z\{y[n]\} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+z^{-1}} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$Z^{-1}\{Z\{y[n]\}\} = \frac{1}{3}v[n] - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n v[n]$$

(ROC)



não tem transformada de Fourier