

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Prof. Claudio Coutinho

Turma EC
2018

Aula 12

Transformada Z (Cont.)

Exemplo

- Considere o sinal $x[n] = -\alpha^n u[-n - 1] = \begin{cases} -\alpha^n, & n \leq -1 \\ 0, & n > -1 \end{cases}$
- Ou seja, esta é uma sequência de *lado esquerdo*
- A Transformada Z dela é, então:

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} -\alpha^n u[-n - 1] z^{-n} = - \sum_{n=-\infty}^{-1} \alpha^n z^{-n} \\ &= - \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^{-n} z^n = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha^{-1} z)^n \end{aligned}$$

Exemplo

$$X(z) = - \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^{-n} z^n = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha^{-1} z)^n \rightarrow |\alpha^{-1} z| < 1$$

- Então

$$|z| < |\alpha|$$

Exemplo

- Continuando:

$$X(z) = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha^{-1}z)^n = 1 - \frac{1 - (z/\alpha)^{\infty+1}}{1 - (z/\alpha)} = 1 - \frac{1}{1 - (z/\alpha)}$$

- Ou:

$$X(z) = 1 - \frac{1}{1 - \alpha^{-1}z} = \frac{1}{1 - \alpha z^{-1}} = \frac{z}{z - \alpha}$$

Exemplo

- Note que, para $|\alpha| < 1$, a sequência $-\alpha^n u[-n - 1]$ cresce exponencialmente conforme $n \rightarrow -\infty$, e a Transformada de Fourier não existe, pois:

$$|z| < |\alpha| < 1$$

- Mas se $|\alpha| > 1$, a Transformada de Fourier existe e é dada por:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}}$$

- Semelhante à relação do exemplo interior, mas esta só é válida para $-\alpha^n u[-n - 1]$ quando $|\alpha| > 1$
- E é válida para $\alpha^n u[n]$ quando $|\alpha| < 1$

Exemplo

- Temos, então a ROC:





TABLE 1 SOME COMMON z -TRANSFORM PAIRS

Sequence	Transform	ROC
1. $\delta[n]$	1	All z
2. $u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z > 1$
3. $-u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z < 1$
4. $\delta[n - m]$	z^{-m}	All z except 0 (if $m > 0$) or ∞ (if $m < 0$)
5. $a^n u[n]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$ z > a $
6. $-a^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$ z < a $
7. $na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$	$ z > a $
8. $-na^n u[-n - 1]$	$\frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$	$ z < a $
9. $\cos(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
10. $\sin(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
11. $r^n \cos(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{1 - r\cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2r\cos(\omega_0)z^{-1} + r^2z^{-2}}$	$ z > r$
12. $r^n \sin(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{r\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2r\cos(\omega_0)z^{-1} + r^2z^{-2}}$	$ z > r$
13. $\begin{cases} a^n, & 0 \leq n \leq N - 1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$	$\frac{1 - a^N z^{-N}}{1 - az^{-1}}$	$ z > 0$

Função de Sistema

- Sabe-se que, para um determinado sistema LTI, $h[n]$ é conhecida como ***resposta ao impulso***. Uma espécie de comportamento padrão para qualquer sinal de entrada.
- Ao calcular a Transformada Z desse sinal, $\mathcal{Z}\{h[n]\}$, encontramos $H(z)$, a chamada ***função de sistema***



Função de Sistema

- Ou seja:

$$Y(z) = H(z) \cdot X(z)$$

- Representando uma multiplicação simples na frequência
- Ou seja, o produto na frequência é equivalente a uma convolução no tempo.

Função de Sistema

- A relação da Função de Sistema é muito útil para encontrarmos entrada, saída e a própria função no tempo, a partir das outras duas e, assim, analisar sua região de convergência.
- A partir da fórmula fechada, podemos encontrar, através da tabela de pares de transformada, os sinais no tempo.
- Método proposto por Oliver Heaviside (1850-1925)

Função de Sistema – Exemplo

- Considere uma sequência cuja Transformada Z é:

$$X(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}\right)}$$

Primeiro, localizamos os valores dos polos (multipliquemos por z):

$$X(z) = \frac{z}{\left(z^2 - \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}\right)}$$

$$\Delta = \left(-\frac{3}{4}\right)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{8}\right) = \frac{9}{16} - \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$$

Função de Sistema – Exemplo

$$\Delta = \left(-\frac{3}{4}\right)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{8}\right) = \frac{9}{16} - \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$$

$$z = \frac{-(-3/4) \pm \sqrt{1/16}}{2 \cdot 1} = \frac{3/4 \pm 1/4}{2}$$

$$z' = 1/2$$

$$z'' = 1/4$$

Função de Sistema – Exemplo

$$X(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}\right)} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

Para separar as frações, utilizamos o método de expansão por frações parciais, ou seja:

$$X(z) = \frac{A}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} + \frac{B}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

Função de Sistema – Exemplo

$$X(z) = \frac{A}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} + \frac{B}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

- Aplicando-se o método do resíduo, temos:

$$A = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \Big|_{z=1/2} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4} \cdot 2\right)} = 2$$

Função de Sistema – Exemplo

$$X(z) = \frac{A}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} + \frac{B}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

- Aplicando-se o método do resíduo, temos:

$$B = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)} \cdot \left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) \Big|_{z=1/4} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2} \cdot 4\right)} = -1$$

Função de Sistema – Exemplo

- Então:

$$X(z) = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} - \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

- Então:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}^{-1}\{X(z)\} &= \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{2}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}\right\} - \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)}\right\} \\ &= 2 \cdot \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}\right\} - \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)}\right\}\end{aligned}$$

Função de Sistema – Exemplo

- Da tabela de pares de transformada:


$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}\right\} = \alpha^n u[n], \quad |z| > |\alpha|$$

- Então:

$$\mathcal{Z}^{-1}\{X(z)\} = 2 \cdot \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}\right\} - \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)}\right\}$$

$$x[n] = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

Função de Sistema – Exemplo (ROC)



Exercício

- Considere $h[n] = \alpha^n u[n]$, $|\alpha| < 1$ e $x[n] = Au[n]$.
- Encontre $y[n]$ utilizando a relação da função de sistema (sem convoluir).

- Resp:

$$y[n] = \frac{A}{1 - \alpha} (1 - \alpha^{n+1}) u[n]$$

Exercício

- Resp:

$$y[n] = \frac{A}{1 - \alpha} (1 - \alpha^{n+1}) u[n]$$

