

CATÁLOGO FARMACOLÓGICO PEDIÁTRICO

MONOGRAFIAS FARMACOLÓGICAS, APRESENTAÇÕES REAIS NO BRASIL E
INDICAÇÕES CLÍNICAS E OFF-LABEL

EDIÇÃO DEFINITIVA — REVISÃO CRÍTICA PEDIÁTRICA CONSOLIDADA

- **Total de Monografias:** 498 Princípios Ativos Estruturados de A a Z
- **Padronização Farmacológica:** 100% Denominação Comum Brasileira (DCB / DCI)
- **Garantia Anti-Redundância:** Isenção estrita de marcas comerciais e duplicidades
- **Escopo de Prática:** Emergência Pediátrica, Terapia Intensiva (UTIP/UTIN), Neonatologia e Ambulatório
- **Atualização de Apresentações:** Foco em formas líquidas, injetáveis, inalatórias e hospitalares vigentes no Brasil
- **Exclusão Técnica:** Quimioterápicos e Antineoplásicos rigorosamente excluídos conforme diretriz

Apresentação & Nota Metodológica

O **Catálogo Farmacológico Pediátrico Consolidado** foi desenvolvido para prover aos médicos pediatras, emergencistas e intensivistas uma fonte de consulta rápida, fidedigna e livre de vieses comerciais sobre as medicações disponíveis no mercado farmacêutico brasileiro regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

1. Denominação Farmacológica Pura (DCB / DCI): Todas as fichas foram convertidas e padronizadas exclusivamente pelo nome do princípio ativo, sal ou complexo farmacológico. Nomes comerciais de marcas ou laboratórios foram completamente erradicados, prevenindo indução prescritiva e assegurando conformidade com as normas sanitárias e éticas de prescrição.

2. Critérios de Inclusão e Apresentações Comerciais: Foram mantidas apenas as apresentações com disponibilidade e comercialização ativas documentadas no Brasil. Incluem-se todas as formas farmacêuticas pediátricas relevantes omitidas em versões prévias (soluções orais, suspensões orodispersíveis, gotas, apresentações neonatais e formulações de terapia intensiva).

3. Escopo Clínico e Enquadramento Off-Label: As indicações abrangem os usos formais aprovados em bula no Brasil, bem como os usos pediátricos off-label consolidados em consensos da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Organização Mundial da Saúde (OMS) e academias internacionais de referência (quando formalmente validados por evidência clínica robusta).

4. Exclusão de Quimioterápicos: Conforme diretriz do projeto, antineoplásicos e quimioterápicos oncológicos foram estritamente excluídos, mantendo-se apenas agentes imunossupressores de uso não oncológico (como metotrexato em baixas doses para artrite idiopática juvenil, azatioprina e micofenolato).

ESTRUTURA DAS MONOGRAFIAS NO CATÁLOGO:

- **Título da Ficha:** Número de ordem cardinal e Denominação Comum Brasileira (Princípio Ativo).
- **Indicações Clínicas e Pediátricas:** Condições clínicas aprovadas em bula e indicações off-label pediátricas devidamente contextualizadas.
- **Apresentações Farmacêuticas Disponíveis no Brasil:** Formas farmacêuticas, dosagens mássicas reais (mg, g, UI, mEq), concentrações (mg/mL, mg/g, %) e volumes/dispositivos certificados.

Índice Remissivo Alfabético de Princípios Ativos (Parte 1 de 4)

463. Abatacepte	p. 57	49. Aztreonam	p. 12	483. Carboximaltose Férrica	p. 59
1. Acebrofilina	p. 7	484. Azul de Metileno (Cloreto ...	p. 59	88. Carmelose Sódica	p. 16
496. Acetato de Cálcio	p. 61	50. Baclofeno	p. 12	90. Carvedilol	p. 17
2. Acetazolamida	p. 7	494. Baloxavir Marboxil	p. 61	89. Carvão Vegetal Ativado	p. 16
3. Acetilcisteína	p. 7	51. Bamifilina	p. 12	91. Caspofungina	p. 17
4. Aciclovir	p. 7	52. Beclometasona	p. 12	92. Cefaclor	p. 17
464. Adalimumabe	p. 57	458. Benralizumabe	p. 57	93. Cefadroxila	p. 17
16. Adenosina	p. 8	53. Benzidamina	p. 12	94. Cefalexina	p. 17
17. Adrenalina (Epinefrina)	p. 8	54. Benzilpenicilina Benzatina	p. 13	95. Cefalotina Sódica	p. 17
18. Agalsidase Beta	p. 9	55. Benzilpenicilina Potássica...	p. 13	96. Cefazolina Sódica	p. 17
19. Albendazol	p. 9	56. Benzilpenicilina Procaína ...	p. 13	97. Cefepima	p. 17
467. Albumina Humana	p. 58	57. Benznidazol	p. 13	98. Cefotaxima Sódica	p. 17
20. Alendronato de Sódio	p. 9	58. Benzoato de Benzila	p. 13	99. Cefoxitina Sódica	p. 18
21. Alfa-Dornase (Dornase Alfa)	p. 9	59. Beractanto	p. 13	100. Ceftarolina Fosamila	p. 18
22. Alglucosidase Alfa	p. 9	60. Betametasona	p. 13	101. Ceftazidima	p. 18
23. Alopurinol	p. 9	61. Bicarbonato de Sódio	p. 13	102. Ceftazidima + Avibactam	p. 18
24. Alprazolam	p. 9	62. Bilastina	p. 13	103. Ceftolozana + Tazobactam	p. 18
25. Alprostadil (Prostaglandin...	p. 9	63. Bimatoprost	p. 14	104. Ceftriaxona Sódica	p. 18
26. Alteplase	p. 9	64. Biperideno	p. 14	105. Cefuroxima (Axetila / Sódic...	p. 18
27. Amantadina	p. 10	65. Bisacodil	p. 14	106. Celecoxibe	p. 18
28. Ambroxol	p. 10	66. Bosentana	p. 14	108. Cetirizina	p. 19
29. Amicacina	p. 10	67. Brimonidina	p. 14	109. Cetoconazol	p. 19
30. Amilorida + Hidroclorotiaz...	p. 10	68. Brometo de Ipratrópio	p. 14	110. Cetoprofeno (Base / Lisina...	p. 19
31. Aminofilina	p. 10	69. Brometo de Pancurônio	p. 14	111. Cetotifeno	p. 19
32. Amiodarona	p. 10	70. Brometo de Rocurônio	p. 14	486. Ciclesonida	p. 60
33. Amitriptilina	p. 10	71. Brometo de Tiotrópio	p. 14	112. Ciclopirox Olamina	p. 19
34. Amlodipino	p. 10	72. Brometo de Vecurônio	p. 15	113. Ciclosporina	p. 19
35. Amoxicilina	p. 10	73. Bromexina	p. 15	114. Cimetidina	p. 19
36. Amoxicilina + Clavulanato ...	p. 11	74. Bromoprida	p. 15	115. Cinchocaína + Policresuleno	p. 19
37. Amoxicilina + Sulbactam	p. 11	75. Budesonida	p. 15	116. Ciproetadina + Cobamamida	p. 19
39. Ampicilina	p. 11	76. Bupivacaína	p. 15	117. Ciprofloxacino	p. 19
38. Ampicilina + Sulbactam	p. 11	77. Buprenorfina	p. 15	118. Cisatracúrio	p. 20
40. Anfotericina B	p. 11	78. Bupropiona	p. 15	119. Citrato de Potássio	p. 20
41. Anidulafungina	p. 11	79. Cafeína (Citrato de Cafeína)	p. 15	120. Claritromicina	p. 20
42. Aripiprazol	p. 11	80. Calcipotriol	p. 15	121. Clindamicina	p. 20
43. Atenolol	p. 11	81. Calcitonina Sintética de S...	p. 16	122. Clioquinol + Hidrocortisona	p. 20
475. Atomoxetina	p. 58	82. Calcitriol	p. 16	123. Clobazam	p. 20
44. Atracúrio	p. 11	83. Canabidiol (CBD)	p. 16	124. Clobetasol	p. 20
45. Atropina	p. 12	84. Captopril	p. 16	125. Clomipramina	p. 20
46. Azatioprina	p. 12	85. Carbamazepina	p. 16	126. Clonazepam	p. 20
47. Azelastina	p. 12	86. Carbocisteína	p. 16	127. Clonidina	p. 21
48. Azitromicina	p. 12	87. Carbonato de Cálcio	p. 16		

Índice Remissivo Alfabético de Princípios Ativos (Parte 2 de 4)

128. Cloperastina	p. 21	167. Dobutamina	p. 25	197. Fentanila	p. 28
129. Clopidogrel	p. 21	168. Domperidona	p. 25	198. Ferro Aminoácido Quelato (...)	p. 28
497. Cloranfenicol	p. 61	454. Donepezila	p. 56	199. Ferro Polimaltosado	p. 28
476. Cloreto de Cálcio 10%	p. 59	169. Dopamina	p. 25	200. Fexofenadina	p. 29
130. Cloreto de Potássio	p. 21	170. Doxazosina	p. 25	201. Filgrastim (G-CSF)	p. 29
131. Cloreto de Sódio	p. 21	171. Doxiciclina	p. 25	202. Fitomenadiona (Vitamina K1)	p. 29
132. Cloroquina	p. 21	172. Dropropizina	p. 25	203. Flucitosina	p. 29
133. Clorpromazina	p. 21	446. Duloxetina	p. 55	204. Fluconazol	p. 29
134. Clotrimazol	p. 21	456. Dupilumabe	p. 56	205. Fludrocortisona	p. 29
135. Codeína	p. 21	173. Ebastina	p. 26	206. Flumazenil	p. 29
136. Colagenase	p. 22	174. Eculizumabe	p. 26	207. Fluoxetina	p. 29
137. Colchicina	p. 22	469. Eltrombopague	p. 58	208. Fluticasona (Furoato / Pro...)	p. 29
138. Colecalciferol (Vitamina D3)	p. 22	470. Emicizumabe	p. 58	209. Fomepizol	p. 30
139. Colestiramina	p. 22	175. Emulsão Lipídica 20%	p. 26	210. Formoterol	p. 30
140. Colistimetato de Sódio (Co...)	p. 22	176. Enalapril	p. 26	477. Fosfato de Potássio Injetá...	p. 59
141. Complexo Protrombínico Con...	p. 22	177. Enoxaparina Sódica	p. 26	211. Fosfomicina Trometamol	p. 30
142. Concentrado de Fibrinogênio	p. 22	178. Enzimas Pancreáticas (Panc...)	p. 26	212. Furosemida	p. 30
143. Crioprecipitado	p. 22	179. Epinastina	p. 26	213. Gabapentina	p. 30
144. Cromoglicato Dissódico	p. 22	493. Epoetina Alfa (Eritropoiet...)	p. 60	214. Galsulfase	p. 30
145. Dantroleno Sódico	p. 23	180. Eritromicina	p. 26	215. Ganciclovir	p. 30
146. Daptomicina	p. 23	181. Ertapenem Sódico	p. 26	216. Gentamicina	p. 30
147. Deferasirox	p. 23	107. Escetamina	p. 18	217. Glicerina (Glicerol)	p. 30
148. Deferoxamina	p. 23	182. Escitalopram	p. 27	461. Glicopirrônio (Brometo)	p. 57
149. Deflazacorte	p. 23	183. Escopolamina (Butilbrometo...)	p. 27	218. Glicose	p. 31
150. Deltametrina	p. 23	184. Esmolol	p. 27	219. Glucagon	p. 31
151. Desloratadina	p. 23	185. Esomeprazol	p. 27	220. Gluconato de Cálcio 10%	p. 31
152. Desmopressina	p. 23	186. Espiramicina	p. 27	221. Gramicidina + Triancinolon...	p. 31
153. Desonida	p. 23	187. Espironolactona	p. 27	222. Granisetrona	p. 31
447. Desvenlafaxina	p. 55	188. Etambutol	p. 27	495. Griseofulvina	p. 61
154. Dexametasona	p. 24	465. Etanercepte	p. 57	223. Haloperidol	p. 31
155. Dexclorfeniramina	p. 24	189. Etomidato	p. 27	224. Hedera Helix	p. 31
156. Dexmedetomidina	p. 24	190. Etossuximida	p. 27	225. Heparina Não Fracionada	p. 31
157. Dexpantenol	p. 24	191. Famotidina	p. 28	226. Hidralazina	p. 31
158. Diazepam	p. 24	491. Fator IX da Coagulação Hum...	p. 60	227. Hidroclorotiazida	p. 32
159. Diazóxido	p. 24	192. Fator VIIa Recombinante	p. 28	228. Hidrocortisona	p. 32
160. Diclofenaco (Potássico / S...)	p. 24	472. Fator VIII + Fator de von ...	p. 58	229. Hidroxicloroquina	p. 32
161. Difenidramina	p. 24	471. Fator XIII da Coagulação H...	p. 58	233. Hidroxiquinolina + Trolamina	p. 32
162. Digoxina	p. 24	193. Fenilefrina	p. 28	234. Hidroxizina	p. 32
163. Diltiazem	p. 25	194. Fenitoína Sódica	p. 28	235. Hidroxocobalamina (Vitamin...	p. 32
164. Dimenidrinato	p. 25	195. Fenobarbital	p. 28	230. Hidróxido de Alumínio	p. 32
165. Dimenidrinato + Piridoxina	p. 25	196. Fenoterol	p. 28	231. Hidróxido de Alumínio + Hi...	p. 32
166. Dipirona Sódica (Metamizol)	p. 25	473. Fenoximetilpenicilina Potá...	p. 58		

Índice Remissivo Alfabético de Princípios Ativos (Parte 3 de 4)

232. Hidróxido Férrico em Sacar...	p. 32	273. Levomepromazina	p. 36	310. Mupirocina	p. 41
236. Ibuprofeno	p. 33	274. Levosimendana	p. 37	311. Naloxona	p. 41
237. Idarucizumabe	p. 33	275. Levotiroxina Sódica	p. 37	312. Naproxeno (Sódico)	p. 41
238. Idursulfase	p. 33	276. Lidocaína	p. 37	313. Neomicina	p. 41
239. Iloprosta	p. 33	277. Linezolida	p. 37	314. Neomicina + Bacitracina	p. 41
240. Imiglucerase	p. 33	278. Lisdexanfetamina	p. 37	315. Neostigmina	p. 41
241. Imipenem + Cilastatina	p. 33	280. Loperamida	p. 37	316. Nifedipino	p. 41
242. Imipramina	p. 33	281. Loratadina	p. 37	317. Nimesulida	p. 41
243. Imunoglobulina Humana Anti...	p. 33	282. Lorazepam	p. 37	474. Nirsevimabe	p. 58
244. Imunoglobulina Humana Anti...	p. 33	283. Losartana Potássica	p. 38	318. Nistatina	p. 41
245. Imunoglobulina Humana Anti...	p. 33	279. Lítio (Carbonato)	p. 37	319. Nistatina + Óxido de Zinco	p. 42
492. Imunoglobulina Humana Anti...	p. 60	284. Macrogol 3350 / 4000 (PEG)	p. 38	320. Nitazoxanida	p. 42
246. Imunoglobulina Humana Intr...	p. 34	285. Manitol	p. 38	321. Nitrofurantoína	p. 42
460. Indacaterol	p. 57	286. Mebendazol	p. 38	322. Nitroglicerina	p. 42
247. Indometacina	p. 34	287. Mebeverina	p. 38	323. Nitroprussiato de Sódio	p. 42
478. Infliximabe	p. 59	288. Meloxicam	p. 38	324. Noradrenalina (Norepinefri...	p. 42
248. Insulina Asparto	p. 34	452. Memantina	p. 56	325. Nortriptilina	p. 42
249. Insulina Degludeca	p. 34	457. Mepolizumabe	p. 56	326. Octreotida	p. 42
490. Insulina Detemir	p. 60	289. Meropenem	p. 38	327. Olanzapina	p. 42
250. Insulina Glargina	p. 34	290. Mesalazina	p. 38	329. Olopatadina	p. 43
251. Insulina Glulisina	p. 34	291. Metadona	p. 38	330. Omalizumabe	p. 43
252. Insulina Lispro	p. 34	292. Metformina	p. 39	331. Omeprazol	p. 43
253. Insulina NPH (Humana)	p. 34	293. Metilergometrina	p. 39	332. Ondansetrona	p. 43
254. Insulina Regular (Humana)	p. 34	294. Metilfenidato	p. 39	333. Oseltamivir	p. 43
255. Iodeto de Potássio	p. 34	295. Metilprednisolona	p. 39	334. Oxacilina Sódica	p. 43
256. Isavuconazol (Sulfato de I...	p. 35	296. Metoclopramida	p. 39	335. Oxcarbazepina	p. 43
257. Isoflurano	p. 35	297. Metoprolol (Tartarato / Su...	p. 39	336. Oxiconazol	p. 43
258. Isoniazida	p. 35	480. Metotrexato (Uso Imunossup...	p. 59	337. Oxigênio Medicinal	p. 44
259. Isossorbida (Dinitrato / M...	p. 35	298. Metronidazol / Benzoilmetr...	p. 39	338. Oxitocina	p. 44
260. Itraconazol	p. 35	299. Micafungina	p. 39	339. Palivizumabe	p. 44
261. Ivermectina	p. 35	479. Micofenolato de Mofetila /...	p. 59	340. Pantoprazol	p. 44
262. L-Ornitina L-Aspartato	p. 35	300. Miconazol	p. 39	341. Paracetamol (Acetaminofeno)	p. 44
263. Lacosamida	p. 35	301. Midazolam	p. 40	342. Penicilamina	p. 44
264. Lactulose	p. 35	302. Mikania Glomerata (Guaco)	p. 40	498. Perampanel	p. 61
265. Lamotrigina	p. 36	303. Milrinona	p. 40	343. Permetrina	p. 44
266. Lansoprazol	p. 36	304. Minociclina	p. 40	344. Petidina (Meperidina)	p. 44
267. Laronidase	p. 36	451. Mirtazapina	p. 56	345. Picossulfato de Sódio	p. 44
268. Levetiracetam	p. 36	305. Misoprostol	p. 40	346. Pilocarpina	p. 45
269. Levocetirizina	p. 36	306. Mometasona	p. 40	347. Pimecrolimo	p. 45
270. Levodopa + Benserazida / C...	p. 36	307. Montelukaste de Sódio	p. 40	348. Piperacilina + Tazobactam	p. 45
271. Levodropropizina	p. 36	308. Morfina	p. 40	349. Pirazinamida	p. 45
272. Levofloxacino	p. 36	309. Moxifloxacino	p. 40		

Índice Remissivo Alfabético de Princípios Ativos (Parte 4 de 4)

350. Piridostigmina	p. 45	466. Secuquinumabe	p. 57	423. Ticagrelor	p. 53
351. Piridoxina (Vitamina B6)	p. 45	384. Sertralina	p. 49	424. Tigeciclina	p. 53
352. Pirimetamina	p. 45	385. Sevoflurano	p. 49	425. Timolol	p. 53
353. Pirvínio (Pamoato)	p. 45	386. Sildenafil	p. 49	426. Tinidazol	p. 53
354. Plasma Fresco Congelado	p. 45	387. Simeticona (Dimeticona)	p. 49	427. Tioconazol	p. 53
355. Poliestirenosulfonato de ...	p. 45	388. Sinvastatina	p. 49	428. Tiopental	p. 53
356. Polimixina B	p. 46	389. Solução de Ringer com Lact...	p. 49	429. Tobramicina	p. 53
357. Polimixina B + Neomicina +...	p. 46	390. Somatropina (Hormônio do C...	p. 49	430. Tocilizumabe	p. 54
358. Poractanto Alfa	p. 46	391. Soro Antiaracnídico	p. 49	431. Tocoferol (Vitamina E)	p. 54
359. Posaconazol	p. 46	392. Soro Antibotrópico (Pentav...	p. 49	432. Topiramato	p. 54
485. Pralidoxima	p. 60	393. Soro Antibotulínico AB Biv...	p. 50	481. Toxina Botulínica Tipo A	p. 59
360. Praziquantel	p. 46	394. Soro Anticrotático	p. 50	433. Tramadol	p. 54
361. Prednisolona	p. 46	395. Soro Antidiftérico	p. 50	449. Trazodona	p. 56
362. Prednisona	p. 46	396. Soro Antielaipídico (Bivale...	p. 50	434. Triancinolona Acetonida	p. 54
363. Pregabalina	p. 46	397. Soro Antiescorpiônico	p. 50	435. Trimebutina	p. 54
364. Primidona	p. 46	398. Soro Antitetânico	p. 50	462. Umeclidínio (Brometo)	p. 57
366. Prometazina	p. 47	399. Soro Polieletrólítico Bala...	p. 50	436. Ureia	p. 54
488. Propafenona	p. 60	489. Sotalol	p. 60	437. Valaciclovir	p. 54
367. Propiltiouracila	p. 47	400. Succinilcolina	p. 50	438. Valganciclovir	p. 54
368. Propofol	p. 47	401. Sucralfato	p. 50	439. Vancomicina	p. 55
369. Propranolol	p. 47	402. Sufentanila	p. 51	440. Varfarina Sódica	p. 55
370. Protamina	p. 47	403. Sugamadex	p. 51	441. Vasopressina	p. 55
371. Quetiapina	p. 47	404. Sulfadiazina	p. 51	450. Venlafaxina	p. 56
372. Racecadotril	p. 47	405. Sulfadiazina de Prata	p. 51	442. Verapamil	p. 55
373. Rasburicase	p. 47	406. Sulfametoxazol + Trimetopr...	p. 51	443. Vigabatrina	p. 55
374. Remifentanila	p. 48	407. Sulfassalazina	p. 51	444. Vitamina A + D (Associação)	p. 55
375. Retinol (Vitamina A)	p. 48	408. Sulfato de Magnésio	p. 51	445. Voriconazol	p. 55
376. Ribavirina	p. 48	410. Sulfato Ferroso	p. 51	448. Vortioxetina	p. 55
377. Rifampicina	p. 48	411. Tacrolimo	p. 52	409. Zinco (Sulfato)	p. 51
378. Risperidona	p. 48	412. Tadalafila	p. 52	5. Ácido Acetilsalicílico (AAS)	p. 7
453. Rivastigmina	p. 56	413. Teicoplanina	p. 52	6. Ácido Aminocaproico	p. 7
459. Roflumilaste	p. 57	414. Tenecteplase	p. 52	7. Ácido Ascórbico (Vitamina C)	p. 7
468. Romiplostim	p. 58	415. Teofilina	p. 52	9. Ácido Fólinico (Folinato d...	p. 8
482. Ropivacaína	p. 59	416. Terbinafina	p. 52	10. Ácido Fusídico	p. 8
379. Rufinamida	p. 48	417. Terbutalina	p. 52	8. Ácido Fólico (Vitamina B9)	p. 7
487. Rupatadina	p. 60	418. Terlipressina	p. 52	11. Ácido Mefenâmico	p. 8
365. Saccharomyces Boulardii	p. 47	419. Tetraciclina	p. 52	12. Ácido Nalidíxico	p. 8
380. Sais de Reidratação Oral (...)	p. 48	455. Tezepelumabe	p. 56	13. Ácido Tranexâmico	p. 8
381. Salbutamol	p. 48	420. Tiabendazol	p. 52	14. Ácido Ursodesoxicólico	p. 8
382. Salmeterol	p. 48	421. Tiamazol (Metimazol)	p. 53	15. Ácido Valproico / Valproat...	p. 8
383. Secnidazol	p. 49	422. Tiamina (Vitamina B1)	p. 53	328. Óleo Mineral (Petrolato Lí...	p. 43

1. Acebrofilina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Bronquite e traqueobronquite com hipersecreção, broncoespasmo (adjuvante, a partir de 2 anos); hipersecreção e broncoespasmo associados a asma, broncopneumonia, bronquiectasias, pneumoconioses, rinofaringite, laringotraqueíte e enfisema (adjuvante sintomático conforme bula).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope 5 mg/mL e 10 mg/mL; gel oral 5 mg/mL.

2. Acetazolamida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Glaucoma congênito ou secundário, epilepsias refratárias com crises de ausência ou mioclônicas (adjuvante); prevenção e tratamento do mal agudo da altitude; edema da insuficiência cardíaca e edema induzido por medicamentos (adjuvante), glaucoma de ângulo aberto e redução pré-operatória da pressão no glaucoma agudo de ângulo fechado; hipertensão intracraniana idiopática, alcalose metabólica refratária (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 250 mg.

3. Acetilcisteína

Indicações Clínicas e Pediátricas: Intoxicação por paracetamol (antídoto oral ou IV); secreções respiratórias espessas (mucolítico, a partir de 2 anos); mucólise como adjuvante na bronquite aguda ou crônica e exacerbações, enfisema, pneumonia, atelectasia e complicações pulmonares da fibrose cística.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 20 mg/mL e 40 mg/mL; granulado oral 100, 200 e 600 mg/envelope; solução injetável 100 mg/mL (ampola 3 mL); comprimido efervescente 600 mg.

4. Aciclovir

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções por herpes simples, encefalite herpética, herpes neonatal ou disseminado, gengivostomatite herpética grave, varicela em situações selecionadas e imunodeprimidos, herpes-zóster, supressão de recorrências, profilaxia em imunodeprimidos; ceratite por herpes simples.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 200 mg e 400 mg; suspensão oral 40 mg/mL; pó para infusão IV 250 mg/frasco; creme dermatológico 50 mg/g (5%); pomada oftálmica 30 mg/g (3%).

5. Ácido Acetilsalicílico (AAS)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Artrite da febre reumática aguda; dor e febre (respeitar restrições; não usar como antitérmico pediátrico de rotina); doença de Kawasaki: fase inflamatória e antiagregação plaquetária (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 100 mg infantil e 500 mg; comprimidos revestidos 81 mg; comprimidos 85 mg; comprimidos gastrorresistentes 100 mg e 300 mg.

6. Ácido Aminocaproico

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hemorragias por hiperfibrinólise ou trombolíticos, prevenção/controle de sangramento perioperatório, discrasias sanguíneas e hemoflias, hemoptise, sangramento renal e uterino.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 500 mg; solução injetável 50 mg/mL e 200 mg/mL (frascos 20 mL).

7. Ácido Ascórbico (Vitamina C)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Deficiência de vitamina C e escorbuto, suplementação em prematuros ou nutrição parenteral, apoio à absorção de ferro.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 200 mg/mL; comprimidos 500 mg; solução injetável 100 mg/mL; comprimidos efervescentes 1 g e 2 g.

8. Ácido Fólico (Vitamina B9)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Anemia megaloblástica por deficiência de folato, suplementação nas anemias hemolíticas crônicas (falciforme, esferocitose, talassemia) e prematuridade, redução da toxicidade do metotrexato; prevenção de defeitos do tubo neural no período periconcepcional.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimido 5 mg; solução oral 0,2 mg/mL e 5 mg/mL (frasco com gotejador).

9. Ácido Folínico (Folinato de Cálcio)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Resgate após metotrexato, prevenção ou tratamento da toxicidade hematológica da pirimetamina na toxoplasmose congênita e da trimetoprima; anemia megaloblástica quando a reposição oral é inadequada.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 15 mg; solução injetável IV/IM 10 mg/mL; pó liofilizado injetável 50 mg/frasco.

10. Ácido Fusídico

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções bacterianas cutâneas localizadas; impetigo, foliculite, paroníquia, eritasma, eczema e feridas infectadas.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Creme dermatológico 20 mg/g (2%); pomada de fusidato de sódio 20 mg/g.

11. Ácido Mefenâmico

Indicações Clínicas e Pediátricas: Dor inflamatória leve a moderada, dor odontológica, dismenorreia primária (bula restrita acima de 14 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 500 mg.

12. Ácido Nalidíxico

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções urinárias e intestinais por bactérias Gram-negativas sensíveis (contraindicado abaixo de 3 meses e em histórico de convulsões).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 500 mg.

13. Ácido Tranexâmico

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hemorragia traumática, prevenção e controle de sangramento cirúrgico, sangramentos mucosos na hemofilia ou doença de von Willebrand (adjuvante); angioedema hereditário.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 250 mg; solução injetável 50 mg/mL (ampola 5 mL).

14. Ácido Ursodesoxicólico

Indicações Clínicas e Pediátricas: Colestase neonatal ou associada à nutrição parenteral, atresia biliar após Kasai, doença hepatobiliar da fibrose cística, colangite esclerosante primária; lama e cálculos biliares (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 50, 150 e 300 mg.

15. Ácido Valproico / Valproato de Sódio / Divalproato de Sódio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Epilepsias generalizadas, crises de ausência e mioclônicas; crises focais complexas; estado de mal epilético refratário a benzodiazepínicos (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas 250 mg; xarope 50 mg/mL; comprimidos 250 e 500 mg; divalproato de sódio comprimidos de liberação retardada e prolongada 250 e 500 mg.

16. Adenosina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Taquicardia supraventricular regular por reentrada nodal ou atrioventricular, inclusive Wolff-Parkinson-White; reversão de TSV em crianças (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 3 mg/mL (ampola 2 mL = 6 mg).

17. Adrenalina (Epinefrina)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Anafilaxia e anafilaxia refratária, parada cardiorrespiratória, choque distributivo ou cardiogênico refratário; crise asmática grave refratária; crupe moderado/grave com estridor em repouso (nebulização, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 1 mg/mL (ampola 1 mL).

18. Agalsidase Beta

Indicações Clínicas e Pediátricas: Doença de Fabry (reposição enzimática, a partir de 8 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para solução injetável 35 mg.

19. Albendazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Ascaridíase, oxiuríase, ancilostomíase, tricuriase, giardíase (2-12 anos), larva migrans cutânea, estrogiloidíase, teníase, himenolepiase; neurocisticercose e toxocaríase (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral 40 mg/mL (frasco 10 mL = 400 mg); comprimidos mastigáveis 400 mg.

20. Alendronato de Sódio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Osteoporose pós-menopausa e induzida por glicocorticoides, doença de Paget (uso majoritário adulto; uso pediátrico especializado em osteogênese imperfeita, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 70 mg.

21. Alfa-Dornase (Dornase Alfa)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Fibrose cística com secreções respiratórias viscosas para melhora da função pulmonar.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução para inalação 1 mg/mL (ampola 2,5 mL = 2,5 mg).

22. Alglucosidase Alfa

Indicações Clínicas e Pediátricas: Doença de Pompe de início infantil ou tardio (reposição enzimática de primeira linha).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para solução injetável 50 mg.

23. Alopurinol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hiperuricemia associada à lise tumoral, erros inatos do metabolismo (síndrome de Lesch-Nyhan), nefropatia por ácido úrico.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 100 mg e 300 mg.

24. Alprazolam

Indicações Clínicas e Pediátricas: Transtornos de ansiedade e pânico (uso predominantemente adulto; uso pediátrico restrito e especializado, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg e 2 mg; liberação prolongada 0,5 mg, 1 mg e 2 mg.

25. Alprostadil (Prostaglandina E1)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Manutenção da permeabilidade do canal arterial em lactentes com cardiopatia congênita e fluxo pulmonar dependente do canal arterial, até intervenção cirúrgica.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para infusão IV/intra-arterial equivalente a 20 mcg de alprostadil/ampola.

26. Alteplase

Indicações Clínicas e Pediátricas: Trombólise em embolia pulmonar maciça ou AVC isquêmico (uso adulto); desobstrução trombótica de cateter venoso central (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado 10 mg, 20 mg e 50 mg/frasco.

27. Amantadina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Reações extrapiramidais induzidas por fármacos; distonias e reabilitação após traumatismo cranioencefálico grave na criança (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 100 mg.

28. Ambroxol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Doenças broncopulmonares agudas e crônicas associadas a secreções mucóides viscosas.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope pediátrico 15 mg/5 mL (3 mg/mL); xarope adulto 30 mg/5 mL; gotas 7,5 mg/mL; solução para inalação 7,5 mg/mL.

29. Amicacina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções graves por Gram-negativos suscetíveis (sepse neonatal, sepse, infecções urinárias complicadas, osteoarticulares, pulmonares); infecções por micobactérias não tuberculosas (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 50 mg/mL e 250 mg/mL (ampolas 2 mL).

30. Amilorida + Hidroclorotiazida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hipertensão arterial e edema cardíaco (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label para preservação de potássio).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 2,5 mg + 25 mg e 5 mg + 50 mg.

31. Aminofilina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Crise asmática grave refratária (resgate especializado em UTI); apneia primária da prematuridade como alternativa à cafeína (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 100 mg e 200 mg; solução injetável 24 mg/mL (10 mL = 240 mg).

32. Amiodarona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Parada cardiorrespiratória por FV/TV sem pulso refratária à desfibrilação, taquiarritmias ventriculares e supraventriculares graves.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 100 mg e 200 mg; solução injetável 50 mg/mL (ampola 3 mL = 150 mg); suspensão oral magistral/gotas 200 mg/mL.

33. Amitriptilina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Enurese noturna monossintomática refratária (com causas orgânicas excluídas); profilaxia de enxaqueca e dor neuropática crônica (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 10 mg, 25 mg e 75 mg.

34. Amlodipino

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hipertensão arterial essencial (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label consolidado).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 2,5 mg, 5 mg e 10 mg.

35. Amoxicilina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Otite média aguda, rinossinusite bacteriana, faringoamigdalite estreptocócica, pneumonia comunitária típica, profilaxia de endocardite bacteriana.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para suspensão oral 250 mg/5 mL, 400 mg/5 mL e 500 mg/5 mL (frascos de 150 mL); comprimidos dispersíveis 250 mg; cápsulas 500 mg e 875 mg.

36. Amoxicilina + Clavulanato de Potássio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Otite média aguda e rinossinusite com falha à amoxicilina ou risco de betalactamases, mordeduras animais/humanas, pneumonia aspirativa, celulite orbitária/pré-septal, infecções urinárias complicadas.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para suspensão oral nas proporções 4:1 (125+31,25 mg/5 mL e 250+62,5 mg/5 mL), 7:1 (400+57 mg/5 mL) e 14:1 (600+42,9 mg/5 mL [ES]); comprimidos 500+125 mg e 875+125 mg; pó injetável IV 1 g + 200 mg.

37. Amoxicilina + Sulbactam

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções respiratórias, otite média aguda, infecções intra-abdominais e de partes moles por microrganismos produtores de betalactamases.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para suspensão oral e comprimidos; pó para solução injetável IV/IM 1 g + 500 mg.

38. Ampicilina + Sulbactam

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções intra-abdominais, pélvicas, respiratórias (epiglotite, sinusite, pneumonia), abscessos periamigdalinos e retrofaríngeos, celulite orbitária.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável frasco-ampola 1,5 g e 3 g.

39. Ampicilina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Seps e meningite neonatal, meningite bacteriana, pneumonia grave, infecções por *Listeria monocytogenes*, *Enterococcus faecalis* ou estreptococo do grupo B.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó injetável 500 mg e 1 g (sódica); suspensão oral 50 mg/mL e cápsulas 500 mg.

40. Anfotericina B

Indicações Clínicas e Pediátricas: Micoses sistêmicas graves e invasivas (candidíase sistêmica, aspergilose, criptococose, mucormicose, histoplasmose, leishmaniose visceral).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Desoxicolato (pó 50 mg/frasco) e formulação lipossomal (pó 50 mg/frasco).

41. Anidulafungina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Candidemia e candidíase invasiva (aprovado para adultos e crianças acima de 1 mês).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 100 mg.

42. Aripiprazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Esquizofrenia e transtorno bipolar em adultos; irritabilidade associada ao transtorno do espectro autista e tiques/Tourette em pediatria (off-label regulatório).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 10, 15, 20 e 30 mg; solução oral 1 mg/mL; suspensão oral 20 mg/mL.

43. Atenolol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hipertensão e taquiarritmias (uso adulto na bula); crises hipoxêmicas da tetralogia de Fallot e profilaxia de enxaqueca (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 25 mg, 50 mg e 100 mg.

44. Atracúrio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Bloqueio neuromuscular para intubação endotraqueal, cirurgias e adaptação à ventilação mecânica em UTI pediátrica.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 10 mg/mL (ampolas 2,5 mL e 5 mL).

45. Atropina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Bradicardia sintomática, intoxicação por organofosforados e carbamatos; midríase e cicloplegia diagnóstica; sialorreia em paralisia cerebral (off-label sublingual).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 0,25 mg/mL e 0,5 mg/mL; solução oftálmica 0,5% e 1%.

46. Azatioprina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hepatite autoimune, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Crohn e retocolite ulcerativa (manutenção), transplantes de órgãos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 50 mg.

47. Azelastina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento sintomático da rinite alérgica sazonal e perene por via intranasal.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Spray nasal 1 mg/mL (0,1%).

48. Azitromicina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Pneumonia por atípicos, coqueluche (tratamento e profilaxia pós-exposição), faringoamigdalite estreptocócica em alérgicos à penicilina, otite média, sinusite.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para suspensão oral 200 mg/5 mL (frascos 600, 900 e 1500 mg); comprimidos 500 mg e 1 g; pó injetável 500 mg.

49. Aztreonam

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções graves por bacilos Gram-negativos aeróbios (incluindo *Pseudomonas aeruginosa* em fibrose cística); alternativa em multirresistência com NDM (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável frasco-ampola 1 g.

50. Baclofeno

Indicações Clínicas e Pediátricas: Espasticidade grave de origem cerebral ou medular (paralisia cerebral, lesão medular).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 10 mg.

51. Bamifilina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Broncoespasmo associado a asma brônquica ou bronquite asmática (uso predominantemente adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 300 mg e 600 mg.

52. Beclometasona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Controle e manutenção da asma persistente; rinite alérgica crônica.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Spray nasal 50 e 100 mcg/dose; aerossol inalatório 50, 200 e 250 mcg/dose; suspensão para nebulização 400 mcg/mL.

53. Benzidamina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Alívio sintomático da dor e inflamação de orofaringe (aftas, faringites, estomatites, pós-operatório odontológico); vulvovaginites (solução ginecológica).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pastilhas 3 mg; colutório spray 1,5 mg/mL; pó para solução ginecológica 53,2 mg/g.

54. Benzilpenicilina Benzatina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Faringoamigdalite estreptocócica, profilaxia primária e secundária da febre reumática, sífilis adquirida (esquemas do PCDT).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para suspensão IM 600.000 UI e 1.200.000 UI por frasco.

55. Benzilpenicilina Potássica (Cristalina)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Sífilis congênita, neurosífilis, meningite por pneumococo ou meningococo sensíveis, pneumonia pneumocócica grave.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável 5.000.000 UI/frasco (com sobre-enchimento técnico).

56. Benzilpenicilina Procaína + Benzilpenicilina Potássica

Indicações Clínicas e Pediátricas: Pneumonia comunitária bacteriana não complicada e erisipela em ambiente ambulatorial selecionado.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para suspensão injetável IM 300.000 UI + 100.000 UI.

57. Benznidazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da doença de Chagas aguda, congênita, formas crônicas recentes na infância ou reativação em imunossuprimidos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 12,5 mg (pediátrico) e 100 mg.

58. Benzoato de Benzila

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento tópico da escabiose (sarna) e pediculose (respeitando restrições etárias do produto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Emulsão tópica 250 mg/mL (25%); sabonete dermatológico 100 mg/g.

59. Beractanto

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento de resgate da síndrome do desconforto respiratório (doença da membrana hialina) em recém-nascidos prematuros.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão intratraqueal 25 mg/mL (frascos de 4 mL e 8 mL).

60. Betametasona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Condições alérgicas, inflamatórias e autoimunes sistêmicas graves; maturação pulmonar fetal antenatal (acetato + fosfato).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Elixir 0,1 mg/mL; comprimidos 0,5 mg e 2 mg; cremes e pomadas de valerato/dipropionato; suspensões injetáveis depot.

61. Bicarbonato de Sódio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Acidose metabólica grave selecionada, hipercalcemia com alteração eletrocardiográfica, intoxicação por antidepressivos tricíclicos ou bloqueadores de canal de sódio.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 8,4% (1 mEq/mL) e 10%; pó para uso oral (sachês).

62. Bilastina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento sintomático da rinite alérgica sazonal/perene e da urticária crônica espontânea.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 20 mg; solução oral 2,5 mg/mL.

63. Bimatoprost

Indicações Clínicas e Pediátricas: Redução da pressão intraocular no glaucoma de ângulo aberto e hipertensão ocular (uso adulto na bula; uso pediátrico especializado, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oftálmica 0,1 mg/mL e 0,3 mg/mL.

64. Biperideno

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de reações extrapiramidais agudas (distonias agudas, crises oculógiras) induzidas por neurolépticos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 2 mg; solução injetável 5 mg/mL (ampola 1 mL).

65. Bisacodil

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de curto prazo da constipação intestinal e esvaziamento/preparo intestinal para exames.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos gastrorresistentes 5 mg.

66. Bosentana

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da hipertensão arterial pulmonar (idiopática, familiar ou associada a cardiopatias congênitas / Eisenmenger).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 62,5 mg e 125 mg.

67. Brimonidina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Redução da pressão intraocular no glaucoma de ângulo aberto e hipertensão ocular.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oftálmica (colírio) 0,1%, 0,15% e 0,2%.

68. Brometo de Ipratrópio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Broncoespasmo agudo em crise asmática moderada a grave, em associação a agonistas beta-2 de curta ação.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução para nebulização 0,25 mg/mL; aerossol inalatório 20 mcg/dose.

69. Brometo de Pancurônio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Bloqueio neuromuscular de longa duração para intubação orotraqueal e manutenção da ventilação mecânica em UTI.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 2 mg/mL (ampola 2 mL = 4 mg).

70. Brometo de Rocurônio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Relaxamento muscular para intubação de sequência rápida e cirurgias em neonatos, lactentes, crianças e adolescentes.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 10 mg/mL (frasco-ampola 5 mL = 50 mg).

71. Brometo de Tiotrópio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de manutenção da asma persistente não controlada (a partir de 6 anos) e DPOC.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução para inalação Respimat 2,5 mcg por acionamento.

72. Brometo de Vecurônio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Bloqueio neuromuscular intermediário para intubação e procedimentos cirúrgicos ou ventilação mecânica prolongada.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para solução injetável 4 mg e 10 mg.

73. Bromexina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento secretolítico em afecções broncopulmonares associadas a muco espesso e viscoso.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope pediátrico e adulto; solução oral e inalatória 2 mg/mL.

74. Bromoprida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Distúrbios da motilidade gastrointestinal, náuseas e vômitos de diversas etiologias.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral em gotas 4 mg/mL; comprimidos e cápsulas 10 mg; solução injetável 5 mg/mL.

75. Budesonida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Controle da asma persistente; crupe viral (laringite estridulosa); rinite alérgica; esofagite eosinofílica (via oral deglutida, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão para nebulização 0,25 mg/mL e 0,5 mg/mL; spray nasal 32, 50, 64 e 100 mcg/dose; cápsulas para inalação 200 e 400 mcg.

76. Bupivacaína

Indicações Clínicas e Pediátricas: Anestesia local infiltrativa, bloqueios de nervos periféricos, bloqueio peridural, caudal e raquianestesia.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 2,5 mg/mL (0,25%) e 5 mg/mL (0,5%), com e sem vasoconstritor; solução hiperbárica.

77. Buprenorfina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Analgesia opioide para dor moderada a intensa em contexto oncológico e pós-operatório (uso predominantemente adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Adesivos transdérmicos (taxas de liberação de 5 a 70 mcg/h).

78. Bupropiona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da depressão maior e cessação do tabagismo (uso adulto; uso em TDAH ou depressão em adolescentes, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos de liberação prolongada 150 mg e 300 mg.

79. Cafeína (Citrato de Cafeína)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da apneia primária da prematuridade; profilaxia da apneia em prematuros extremos (recomendação da OMS).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral ou IV de citrato de cafeína 20 mg/mL (equivalente a 10 mg/mL de cafeína-base).

80. Calcipotriol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento tópico da psoríase em placas vulgar (uso adulto na bula; uso pediátrico selecionado, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pomada dermatológica 50 mcg/g (0,005%).

81. Calcitonina Sintética de Salmão

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da dor óssea associada a osteólise, osteoporose pós-menopausa (uso adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Spray nasal 200 UI por dose.

82. Calcitriol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hipoparatiroidismo congênito ou adquirido, raquitismo dependente de vitamina D, osteodistrofia renal e distúrbio mineral ósseo da doença renal crônica.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas gelatinosas 0,25 mcg.

83. Canabidiol (CBD)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de crises epilépticas associadas às síndromes de Dravet, Lennox-Gastaut e complexo de esclerose tuberosa (produtos farmacêuticos purificados sob autorização sanitária).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 20 mg/mL, 50 mg/mL e 200 mg/mL.

84. Captopril

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hipertensão arterial sistêmica (incluindo faixa neonatal e pediátrica off-label), insuficiência cardíaca congestiva.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 12,5 mg, 25 mg e 50 mg.

85. Carbamazepina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Crises epilépticas focais com ou sem generalização secundária, crises tônico-clônicas generalizadas; neuralgia do trigêmeo.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral 20 mg/mL; comprimidos convencionais e de liberação prolongada 200 mg e 400 mg.

86. Carbocisteína

Indicações Clínicas e Pediátricas: Alívio sintomático de afecções respiratórias hipersecretivas com muco espesso (mucolítico adjuvante, a partir de 2 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope pediátrico 20 mg/mL e adulto 50 mg/mL.

87. Carbonato de Cálcio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Suplementação de cálcio, prevenção e tratamento de raquitismo carencial, controle da hiperfosfatemia na doença renal crônica.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos mastigáveis equivalentes a 500 mg de cálcio elementar (1.250 mg de carbonato).

88. Carmelose Sódica

Indicações Clínicas e Pediátricas: Alívio sintomático do olho seco, irritação ocular, queimação e proteção contra agentes externos (lubrificante ocular).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oftálmica (colírio) 0,5% (5 mg/mL).

89. Carvão Vegetal Ativado

Indicações Clínicas e Pediátricas: Descontaminação gastrointestinal em intoxicações agudas exógenas por substâncias adsorvíveis, dentro do intervalo terapêutico inicial.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para suspensão oral em envelopes industriais de 50 g; suspensão oral pronta para uso.

90. Carvedilol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Insuficiência cardíaca crônica com disfunção sistólica e hipertensão arterial (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label consolidado).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg e 25 mg.

91. Caspofungina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Candidíase invasiva, candidemia, aspergilose invasiva refratária e tratamento antifúngico empírico em neutropenia febril.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável frascos 50 mg e 70 mg.

92. Cefaclor

Indicações Clínicas e Pediátricas: Otite média aguda, rinosinusite bacteriana, faringoamigdalite, pneumonia comunitária e infecções urinárias por agentes sensíveis.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral 50 mg/mL e 75 mg/mL; comprimidos de liberação prolongada 500 mg e 750 mg.

93. Cefadroxila

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções de pele e tecidos moles por estafilococos sensíveis à metilicina e estreptococos; faringite e infecção urinária não complicada.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas 500 mg; pó para suspensão oral 50 mg/mL.

94. Cefalexina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Impetigo, foliculite, celulite, erisipela, faringite estreptocócica, infecção urinária afebril e profilaxia de ITU recorrente em crianças selecionadas (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral 50 mg/mL e gotas 100 mg/mL; cápsulas e comprimidos 500 mg e 1 g.

95. Cefalotina Sódica

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções sistêmicas graves por estafilococos e estreptococos sensíveis; profilaxia cirúrgica antimicrobiana.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável frasco de 1 g.

96. Cefazolina Sódica

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia cirúrgica de escolha em grande parte dos procedimentos; tratamento de celulite, infecções cutâneas, osteomielite e bacteremia por *Staphylococcus aureus* sensível à metilicina (MSSA).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável frasco de 1 g.

97. Cefepima

Indicações Clínicas e Pediátricas: Neutropenia febril, sepse hospitalar, infecções graves por Gram-negativos multirresistentes (incluindo *Pseudomonas aeruginosa*), meningite bacteriana em crianças.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável frascos de 1 g e 2 g.

98. Cefotaxima Sódica

Indicações Clínicas e Pediátricas: Sepse e meningite bacteriana neonatal e pediátrica; infecções respiratórias, urinárias, osteoarticulares e intra-abdominais por agentes suscetíveis.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável frascos de 500 mg e 1 g.

99. Cefoxitina Sódica

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções intra-abdominais mistas, doença inflamatória pélvica, profilaxia em cirurgia colorretal, infecções por *Mycobacterium abscessus* (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável frasco de 1 g.

100. Ceftarolina Fosamila

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções complicadas de pele e tecidos moles (incluindo MRSA); pneumonia comunitária; infecções graves por MRSA refratárias (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para infusão IV frasco de 600 mg (equivalente a 530 mg de ceftarolina ativa).

101. Ceftazidima

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções graves por Gram-negativos com atividade antipseudomonal confirmada, exacerbações pulmonares em fibrose cística, meningite pós-neurocirúrgica.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó injetável frasco de 1 g.

102. Ceftazidima + Avibactam

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções graves por Gram-negativos produtores de KPC e enterobactérias multirresistentes; infecção intra-abdominal complicada e pielonefrite desde o nascimento.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável frasco com ceftazidima 2 g + avibactam 0,5 g.

103. Ceftolozana + Tazobactam

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções intra-abdominais complicadas e infecção urinária complicada/pielonefrite por bacilos Gram-negativos multirresistentes, incluindo *Pseudomonas*.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável frasco com ceftolozana 1 g + tazobactam 0,5 g.

104. Ceftriaxona Sódica

Indicações Clínicas e Pediátricas: Meningite bacteriana, sepse, doença meningocócica, pneumonia grave com derrame pleural, pielonefrite, celulite orbitária, febre em lactente sem foco.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável frascos de 250 mg, 500 mg e 1 g (com diluentes específicos para via IM ou IV).

105. Cefuroxima (Axetila / Sódica)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Otite média aguda, rinossinusite bacteriana, pneumonia comunitária, infecções urinárias e de pele por agentes suscetíveis.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral 125 mg e 250 mg/5 mL; comprimidos 250 mg e 500 mg; pó injetável 750 mg.

106. Celecoxibe

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da dor inflamatória em artrite idiopática juvenil (uso pediátrico off-label frente à bula adulta).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas 100 mg e 200 mg.

107. Escetamina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Sedoanalgesia para procedimentos dolorosos e indução/manutenção anestésica; infusão subdissociativa em asma grave refratária (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 50 mg/mL; spray nasal 28 mg.

108. Cetirizina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Rinite alérgica sazonal/perene e urticária crônica idiopática (gotas e xarope a partir de 6 meses; comprimidos acima de 12 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral em gotas; xarope; comprimidos 10 mg.

109. Cetoconazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento tópico de dermatite seborreica, pitíriase versicolor e micoses superficiais.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Creme 20 mg/g; xampu 20 mg/mL; comprimidos 200 mg (uso oral restrito por hepatotoxicidade).

110. Cetoprofeno (Base / Lisinato)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Dor pós-operatória, inflamações osteoarticulares, quadros traumáticos e febre (gotas aprovadas acima de 1 ano).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Gotas orais 20 mg/mL; cápsulas; solução injetável IM/IV; supositórios 100 mg.

111. Cetotifeno

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia de longo prazo da asma brônquica alérgica, rinite e conjuntivite alérgica (acima de 6 meses); não indicado para crise aguda.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope 0,2 mg/mL; solução oral em gotas 1 mg/mL; colírio 0,25 mg/mL.

112. Ciclopirox Olamina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Micoses cutâneas superficiais, candidíase cutânea e dermatite seborreica.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução tópica 10 mg/mL; creme 10 mg/g; esmalte terapêutico para unhas 80 mg/g.

113. Ciclosporina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Síndrome nefrótica corticodependente ou corticorresistente; imunossupressão em transplantes de órgãos e medula óssea; dermatite atópica grave.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 100 mg/mL; cápsulas 25, 50 e 100 mg; concentrado IV 50 mg/mL.

114. Cimetidina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Úlcera péptica, DRGE e condições hipersecretoras patológicas (bula oral rotulada acima de 1 ano).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 200 mg e 400 mg; solução injetável 150 mg/mL.

115. Cinchocaína + Policresuleno

Indicações Clínicas e Pediátricas: Alívio sintomático de hemorroidas, fissuras anais e prurido anal (uso adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pomada retal e supositórios.

116. Ciproheptadina + Cobamamida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Estimulante do apetite em quadros de desnutrição e convalescença (acima de 2 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope e microcomprimidos associados.

117. Ciprofloxacino

Indicações Clínicas e Pediátricas: Exacerbação pulmonar por *Pseudomonas* na fibrose cística (5-17 anos); otite externa (com hidrocortisona, a partir de 1 ano); infecções sistêmicas graves por Gram-negativos multirresistentes em pediatria (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 500 mg; solução IV 2 mg/mL; colírio e solução otológica.

118. Cisatracúrio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Bloqueio neuromuscular para intubação e ventilação mecânica em UTI pediátrica (a partir de 2 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável IV 2 mg/mL (ampolas 5 mL e 10 mL).

119. Citrato de Potássio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Acidose tubular renal distal e prevenção de litíase renal por hipocitratúria (uso adulto na bula; uso pediátrico especializado, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos de liberação prolongada 540, 1.080 e 1.620 mg.

120. Claritromicina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções respiratórias por bactérias atípicas, otite média, faringoamigdalite em alérgicos à penicilina, tratamento de micobactérias não tuberculosas.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 500 mg; suspensão oral 25 mg/mL e 50 mg/mL; pó liofilizado IV 500 mg.

121. Clindamicina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções graves de pele e partes moles por Gram-positivos (incluindo MRSA), osteomielite, artrite séptica, infecções anaeróbias intra-abdominais e pulmonares.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas 300 mg; solução injetável 150 mg/mL; géis e soluções tópicas associadas para acne.

122. Clioquinol + Hidrocortisona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Dermatites inflamatórias com infecção secundária fúngica ou bacteriana associada (acima de 2 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Creme dermatológico (clioquinol 30 mg/g + hidrocortisona 10 mg/g).

123. Clobazam

Indicações Clínicas e Pediátricas: Terapia adjuvante em epilepsias refratárias (síndromes de Lennox-Gastaut e Dravet) a partir de 3 anos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 10 mg e 20 mg.

124. Clobetasol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Dermatoses inflamatórias graves de curta duração e resistentes a corticoides mais fracos (psoríase, líquen escleroso).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Creme, pomada, solução capilar, xampu e spray 0,05%.

125. Clomipramina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e enurese noturna refratária em crianças acima de 5 anos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 10 mg, 25 mg e liberação prolongada 75 mg.

126. Clonazepam

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de crises epilépticas mioclônicas, ausências atípicas e espasmos infantis (segunda linha).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Gotas orais 2,5 mg/mL; comprimidos 0,5 mg e 2 mg; comprimido sublingual 0,25 mg.

127. Clonidina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hipertensão arterial (uso adulto); TDAH, tiques/Tourette, abstinência de opioides e sedativos em UTI pediátrica (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 100, 150 e 200 mcg; solução injetável 150 mcg/mL.

128. Cloperastina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento sintomático da tosse seca, irritativa e não produtiva.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope (fendizoato de cloperastina) e gotas orais.

129. Clopidogrel

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção de eventos aterotrombóticos em adultos; antiagregação após cirurgias de cardiopatias congênitas e stents em pediatria (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 75 mg.

130. Cloreto de Potássio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento da hipocalemia, perdas gastrointestinais e composição da fluidoterapia de manutenção.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 60 mg/mL (6%); comprimidos de liberação prolongada 600 mg; concentrado injetável 10%, 15% e 19,1%.

131. Cloreto de Sódio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Ressuscitação volêmica, fluidoterapia de manutenção, higiene nasal (0,9% a 3%); correção de hiponatremia grave (solução hipertônica).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Soluções nasais 0,9% e 3%; bolsas de infusão IV 0,9%; ampola concentrada 10% e 20%; colírio hipertônico 5%.

132. Cloroquina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da malária por espécies sensíveis (*P. vivax*, *P. malariae*, *P. ovale*); lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 150 mg de cloroquina base (242 mg de difosfato).

133. Clorpromazina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Agitação psicomotora grave, soluços intratáveis, náuseas e vômitos refratários; coreia de Sydenham (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Gotas 40 mg/mL; comprimidos 25 mg e 100 mg; solução injetável IM 5 mg/mL.

134. Clotrimazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento tópico de dermatite de fraldas complicada por Candida, dermatofitoses superficiais e pitíriase versicolor.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Creme dermatológico 10 mg/g; solução tópica 10 mg/mL; creme e comprimidos vaginais.

135. Codeína

Indicações Clínicas e Pediátricas: Dor moderada a intensa em adolescentes elegíveis acima de 12 anos (contraindicada para analgesia pós-tonsilectomia em menores de 18 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 3 mg/mL; comprimidos 30 mg e 60 mg; solução injetável IM/SC 30 mg/mL.

136. Colagenase

Indicações Clínicas e Pediátricas: Desbridamento enzimático de feridas, úlceras de pressão e tecidos desvitalizados cutâneos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pomada dermatológica 0,6 U/g e 1,2 U/g.

137. Colchicina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e profilaxia da febre familiar do Mediterrâneo e crises de gota (uso adulto); pericardite aguda e recorrente em pediatria (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 0,5 mg e 1 mg.

138. Colecalciferol (Vitamina D3)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento da deficiência de vitamina D, raquitismo carencial e suporte à homeostase mineral óssea.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Soluções orais em gotas (várias concentrações, ex: 10.000 UI/mL); cápsulas e comprimidos de 1.000 UI a 50.000 UI.

139. Colestiramina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prurido associado a colestase crônica, diarreia por má absorção de ácidos biliares.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para suspensão oral em envelopes com 4 g de resina anidra.

140. Colistimetato de Sódio (Colistina)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de infecções graves por bacilos Gram-negativos multirresistentes (*Acinetobacter*, *Pseudomonas*, *KPC*); terapia inalatória em fibrose cística.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável ou inalatória frascos 1 milhão, 2 milhões e 4,5 milhões de UI.

141. Complexo Protrombínico Concentrado

Indicações Clínicas e Pediátricas: Reversão rápida de deficiência de fatores da coagulação dependentes de vitamina K (anticoagulantes cumarínicos) em hemorragias graves.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para solução IV acompanhado de diluente (concentrações em UI de fator IX).

142. Concentrado de Fibrinogênio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Reposição em afibrinogenemia congênita ou hipofibrinogenemia adquirida grave com sangramento ativo.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para solução IV frascos de 1 g e 2 g.

143. Crioprecipitado

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hemorragias por deficiência de fibrinogênio, fator XIII e doença de von Willebrand quando concentrados específicos não estão disponíveis.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Bolsas de hemocomponente fresco congelado.

144. Cromoglicato Dissódico

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e profilaxia da conjuntivite alérgica e ceratoconjuntivite vernal.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oftálmica (colírio) 2% e 4%.

145. Dantroleno Sódio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de resgate da hipertermia maligna anestésica; síndrome neuroléptica maligna grave (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável IV frasco de 20 mg.

146. Daptomicina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções complicadas de pele e partes moles por Gram-positivos e bacteremia por *S. aureus* (aprovado a partir de 1 ano de idade).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável frascos de 350 mg e 500 mg.

147. Deferasirox

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da sobrecarga crônica de ferro secundária a transfusões sanguíneas repetidas em talassemia e outras anemias (a partir de 2 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos dispersíveis 125, 250 e 500 mg.

148. Deferoxamina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da intoxicação aguda grave por ferro e sobrecarga crônica de ferro ou alumínio.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó injetável frasco de 500 mg.

149. Deflazacorte

Indicações Clínicas e Pediátricas: Doenças inflamatórias, autoimunes e alérgicas com indicação de corticoterapia sistêmica; distrofia muscular de Duchenne (off-label por indicação).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 6 mg, 7,5 mg e 30 mg.

150. Deltametrina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento tópico da pediculose do couro cabeludo e ftíriase.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Loção, emulsão e xampu capilar 0,2 mg/mL.

151. Desloratadina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento sintomático da rinite alérgica e urticária crônica (xarope a partir de 6 meses; comprimidos acima de 12 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope 0,5 mg/mL; gotas 1,25 mg/mL; comprimidos 5 mg.

152. Desmopressina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento do diabetes insípido central; enurese noturna primária (a partir de 5 anos); controle de hemorragias leves na hemofilia A e von Willebrand.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 0,1 mg e 0,2 mg; solução nasal 0,1 mg/mL; solução injetável 4 mcg/mL.

153. Desonida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Dermatoses inflamatórias leves a moderadas, eczema infantil e dermatite de contato.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Creme e pomada 0,5 mg/g; loção e gel-creme dermatológico.

154. Dexametasona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Edema cerebral, exacerbação grave de asma, crupe laringotraqueíte viral, meningite bacteriana (adjuvante), choque refratário.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Elixir 0,1 mg/mL; comprimidos 0,5, 0,75 e 4 mg; solução injetável (fosfato) 2 mg/mL e 4 mg/mL; colírios e pomadas oftálmicas.

155. Dexclorfeniramina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Alívio de reações alérgicas agudas, urticária, prurido e rinite alérgica (respeitar faixas etárias).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 0,4 mg/mL; gotas 2,8 mg/mL; comprimidos 2 mg e drágeas de liberação prolongada 6 mg.

156. Dexmedetomidina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Sedação em UTI e ventilação mecânica; sedação para exames e procedimentos (uso pediátrico e vias intranasal/IM, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Concentrado para infusão IV 100 mcg/mL (ampola 2 mL); solução pronta 4 mcg/mL.

157. Dexpantenol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento de assaduras, fissuras mamilares, suporte à cicatrização de lesões cutâneas superficiais e ceratites.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pomada dermatológica 50 mg/g; gel oftálmico 50 mg/g.

158. Diazepam

Indicações Clínicas e Pediátricas: Controle do estado de mal epilético, convulsões agudas, espasmos musculares intensos e tétano; sedação pré-procedimento.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 5 mg e 10 mg; solução injetável 5 mg/mL (ampola 2 mL).

159. Diazóxido

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de emergências hipertensivas graves em ambiente hospitalar especializado.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável IV 15 mg/mL (ampola 20 mL).

160. Diclofenaco (Potássico / Sódico / Resinato)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Dor pós-operatória e pós-traumática; artrite idiopática juvenil (gotas a partir de 1 ano, conforme formulação).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Gotas (resinato 50 mg/mL); comprimidos potássicos/sódicos; ampola IM 25 mg/mL; géis e colírios.

161. Difenidramina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Reações alérgicas graves e anafilaxia (como adjuvante); reações transfusionais; cinetose; reações extrapiramidais agudas (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 50 mg/mL (ampola 1 mL); comprimidos revestidos 50 mg.

162. Digoxina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Insuficiência cardíaca com disfunção sistólica ou shunts volumosos; controle da frequência ventricular em taquiarritmias supraventriculares.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 0,25 mg; elixir oral 0,05 mg/mL.

163. Diltiazem

Indicações Clínicas e Pediátricas: Controle de taquiarritmias supraventriculares e hipertensão arterial (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 30 e 60 mg; cápsulas de liberação prolongada 90 e 120 mg.

164. Dimenidrinato

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento de náuseas, vômitos e cinetose (cápsulas a partir de 6 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas moles 25 mg e 50 mg.

165. Dimenidrinato + Piridoxina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e prevenção de náuseas, vômitos, vertigens e labirintopatias (gotas acima de 2 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Gotas orais; comprimidos; solução injetável IV associada a glicose e frutose.

166. Dipirona Sódica (Metamizol)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Alívio de febre e dor aguda leve a moderada de diversas etiologias.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Gotas 500 mg/mL; solução oral 50 mg/mL; comprimidos 500 mg e 1 g; supositórios 300 mg; solução injetável 500 mg/mL (ampolas 2 mL e 5 mL).

167. Dobutamina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Suporte inotrópico no choque cardiogênico, baixo débito cardíaco e choque séptico com disfunção miocárdica.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução concentrada para infusão IV 12,5 mg/mL (frasco 20 mL = 250 mg).

168. Domperidona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Náuseas e vômitos; dispepsia e distúrbios da motilidade gastrointestinal (respeitar restrições regulatórias de peso e idade).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral 1 mg/mL e gotas 5 mg/mL; comprimidos 10 mg.

169. Dopamina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Suporte hemodinâmico no choque com hipotensão arterial e necessidade de ação inotrópica/vasopressora.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução concentrada para infusão IV 5 mg/mL (ampola 10 mL = 50 mg).

170. Doxazosina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hipertensão arterial e sintomas urinários (uso adulto na bula; uso pediátrico em bexiga neurogênica, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 1 mg, 2 mg e 4 mg.

171. Doxiciclina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Febre maculosa, riquetsioses, doença de Lyme inicial, infecções por clamídia e acne grave (em geral a partir de 8 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos solúveis ou revestidos equivalentes a 100 mg de doxiciclina base.

172. Dropropizina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Alívio sintomático da tosse seca, irritativa e não produtiva em pediatria e adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope pediátrico 1,5 mg/mL e adulto 3 mg/mL; gotas 30 mg/mL.

173. Ebastina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento sintomático da rinite alérgica e urticária (xarope a partir de 2 anos; comprimidos acima de 12 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope 1 mg/mL; comprimidos revestidos 10 mg.

174. Eculizumabe

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) e síndrome hemolítico-urêmica atípica (SHUa).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Concentrado para infusão IV 10 mg/mL (frasco 30 mL = 300 mg).

175. Emulsão Lipídica 20%

Indicações Clínicas e Pediátricas: Aporte calórico e de ácidos graxos essenciais em nutrição parenteral; resgate em toxicidade sistêmica por anestésicos locais (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Emulsão intravenosa estéril a 20% (200 mg/mL), frascos de 100 mL e 500 mL.

176. Enalapril

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hipertensão arterial e insuficiência cardíaca (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos de maleato de enalapril 5 mg, 10 mg e 20 mg.

177. Enoxaparina Sódica

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia e tratamento do tromboembolismo venoso e trombose associada a cateter venoso central em pediatria (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável em seringas preenchidas com sistema de segurança (20 mg a 100 mg).

178. Enzimas Pancreáticas (Pancrelipase)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Insuficiência pancreática exócrina na fibrose cística, pancreatite crônica e síndrome de Shwachman-Diamond.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas gastrorresistentes com microgrânulos (10.000 e 25.000 unidades de lipase).

179. Epinastina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e prevenção da conjuntivite alérgica sazonal (colírio a partir de 3 anos); rinite alérgica (via oral).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 10 mg; solução oftálmica 0,05%.

180. Eritromicina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da coqueluche, pneumonia atípica, conjuntivite neonatal por clamídia; procinético gastrointestinal (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral de estolato de eritromicina equivalente a 50 mg/mL de eritromicina base.

181. Ertapenem Sódico

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções intra-abdominais complicadas, infecções urinárias graves e pneumonia comunitária por bactérias sensíveis (a partir de 3 meses).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável IV/IM frasco-ampola 1 g.

182. Escitalopram

Indicações Clínicas e Pediátricas: Transtorno depressivo maior e transtorno de ansiedade generalizada (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Gotas orais 20 mg/mL; comprimidos 10, 15 e 20 mg; comprimidos orodispersíveis.

183. Escopolamina (Butilbrometo de Escopolamina)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Espasmos e cólicas do trato gastrointestinal, biliar e geniturinário; secreções respiratórias na fase final de vida (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Gotas 10 mg/mL; comprimidos 10 mg; solução injetável 20 mg/mL.

184. Esmolol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Controle rápido de taquiarritmias supraventriculares, taquicardia sinusal e hipertensão aguda (uso adulto e pediátrico monitorizado).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 10 mg/mL; solução concentrada 250 mg/mL; bolsas prontas para infusão.

185. Esomeprazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Doença do refluxo gastroesofágico, esofagite erosiva, úlcera gástrica/duodenal e erradicação de *H. pylori*.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas gastrorresistentes 20 mg e 40 mg; pó para solução IV 40 mg.

186. Espiramicina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da toxoplasmose adquirida na gestação para prevenção da transmissão vertical (uso materno).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 1,5 milhão UI.

187. Espironolactona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Insuficiência cardíaca, edema na síndrome nefrótica e ascite cirrótica; hipertensão arterial e hiperaldosteronismo.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 25 mg, 50 mg e 100 mg.

188. Etambutol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da tuberculose pulmonar e extrapulmonar em esquema combinado (uso oral acima de 6 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimido revestido 400 mg de dicloridrato de etambutol.

189. Etomidato

Indicações Clínicas e Pediátricas: Indução da anestesia geral para intubação traqueal de emergência e procedimentos de curta duração.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 2 mg/mL (ampola 10 mL).

190. Etossuximida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de crises epiléticas de ausência típicas (aprovado acima de 3 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope 50 mg/mL.

191. Famotidina

Indicações Clínicas e Pediátricas: DRGE (suspensão aprovada desde o nascimento) e úlcera péptica (a partir de 1 ano).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral reconstituída 8 mg/mL; comprimidos 20 mg e 40 mg.

192. Fator VIIa Recombinante

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e prevenção de sangramentos na hemofilia A ou B com inibidores, deficiência de fator VII e trombastenia de Glanzmann.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado 1 mg, 2 mg e 5 mg com diluente.

193. Fenilefrina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de hipotensão arterial aguda severa; crises hipercianóticas da tetralogia de Fallot (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável de cloridrato de fenilefrina 10 mg/mL (ampola 1 mL).

194. Fenitoína Sódica

Indicações Clínicas e Pediátricas: Estado de mal epilético (após benzodiazepínico) e manutenção de crises focais e tônico-clônicas.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 100 mg; solução injetável 50 mg/mL (ampola 5 mL).

195. Fenobarbital

Indicações Clínicas e Pediátricas: Estado de mal epilético e controle de crises convulsivas neonatais e pediátricas (atentar para restrições neonatais de marcas específicas de apresentação injetável).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 100 mg; gotas orais 40 mg/mL; solução injetável 100 mg/mL (ampola 2 mL).

196. Fenoterol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Alívio do broncoespasmo agudo em crises asmáticas e sibilância responsiva.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Aerossol inalatório 100 mcg/dose.

197. Fentanila

Indicações Clínicas e Pediátricas: Analgesia opioide potente para dor intensa, intubação orotraqueal, sedação em UTI pediátrica e procedimentos cirúrgicos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 50 mcg/mL; adesivos transdérmicos (12 a 100 mcg/h); comprimidos bucais.

198. Ferro Aminoácido Quelato (Glicinato Férrico)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento da deficiência de ferro e anemia ferropriva.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos e suspensão oral em gotas (expressos em ferro elementar).

199. Ferro Polimaltosado

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia e tratamento da anemia ferropriva em pediatria e adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Gotas 50 mg/mL e 100 mg/mL de ferro elementar; xarope e comprimidos mastigáveis.

200. Fexofenadina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da rinite alérgica (suspensão a partir de 2 anos) e urticária crônica (a partir de 6 meses); comprimidos acima de 12 anos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 60, 120 e 180 mg; suspensão oral 6 mg/mL.

201. Filgrastim (G-CSF)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da neutropenia associada à quimioterapia oncológica e neutropenia congênita grave.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 300 mcg/mL (frascos e seringas preenchidas).

202. Fitomenadiona (Vitamina K1)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia e tratamento da doença hemorrágica do recém-nascido; reversão de coagulopatia por antagonistas da vitamina K.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 10 mg/mL (ampola 1 mL).

203. Flucitosina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Terapia combinada em meningite criptocócica e candidíase invasiva grave.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 500 mg (fornecimento institucional centralizado pelo SUS).

204. Fluconazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Candidíase orofaríngea, esofágica, candidemia, meningite criptocócica (consolidação) e profilaxia antifúngica em prematuros de extremo baixo peso.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas 100 mg e 150 mg; solução IV 2 mg/mL (bolsa 100 mL).

205. Fludrocortisona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Reposição mineralocorticoide na hiperplasia adrenal congênita perdedora de sal e insuficiência adrenal primária.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 0,1 mg (100 mcg).

206. Flumazenil

Indicações Clínicas e Pediátricas: Reversão específica da sedação e depressão respiratória induzidas por benzodiazepínicos (a partir de 1 ano).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 0,1 mg/mL (ampola 5 mL = 0,5 mg).

207. Fluoxetina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento do transtorno depressivo maior e TOC (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 20 mg/mL; cápsulas e comprimidos 10 mg e 20 mg.

208. Fluticasona (Furoato / Propionato)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de manutenção da asma persistente, rinite alérgica e dermatite atópica (creme a partir de 1 ano).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Spray nasal; aerossol inalatório; creme dermatológico de propionato de fluticasona 0,05%.

209. Fomepizol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Antídoto específico para intoxicação aguda grave por metanol ou etilenoglicol.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 1 g/mL (ampola 1,5 mL), distribuída pelo SUS.

210. Formoterol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Broncodilatador de longa ação associado a corticosteroides inalatórios na manutenção da asma e DPOC.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas inalatórias 12 mcg; associações fixas com budesonida ou beclometasona em pó ou aerossol.

211. Fosfomicina Trometamol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de cistite aguda não complicada (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label selecionado).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Granulado oral em envelope contendo equivalente a 3 g de fosfomicina base.

212. Furosemida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva, sobrecarga volêmica e crises hipertensivas.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 40 mg; solução injetável 10 mg/mL (ampola 2 mL).

213. Gabapentina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Terapia adjuvante de crises focais (a partir de 12 anos); tratamento de dor neuropática; espasticidade e irritabilidade neurológica (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas 300 mg e 400 mg; comprimidos 600 mg.

214. Galsulfase

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de reposição enzimática na mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução concentrada para infusão 1 mg/mL (frasco 5 mL = 5 mg).

215. Ganciclovir

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da infecção grave por citomegalovírus (CMV) em imunossuprimidos e citomegalovirose congênita sintomática (off-label IV pediátrico).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado injetável 500 mg/frasco; bolsas para infusão IV 1 mg/mL; cápsulas orais 250 mg.

216. Gentamicina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Sepses neonatal (em associação), infecções graves por bacilos Gram-negativos suscetíveis, infecções urinárias e endocardite.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 20 mg/mL (1 mL) e 40 mg/mL (1 mL e 2 mL).

217. Glicerina (Glicerol)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Alívio sintomático da constipação intestinal distal e impactação fecal (via retal).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Enema retal 12%; supositórios de glicerol nas apresentações lactente, infantil e adulto.

218. Glicose

Indicações Clínicas e Pediátricas: Correção de hipoglicemia, suporte calórico em nutrição parenteral e veículo de diluição para medicamentos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Soluções injetáveis IV 5%, 10%, 25% e 50%; glicose 75% para escleroterapia.

219. Glucagon

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de emergência da hipoglicemia grave quando o acesso IV não está disponível; intoxicação por betabloqueadores (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 1 mg (1 UI) com diluente.

220. Gluconato de Cálcio 10%

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de urgência da hipocalcemia sintomática, hipercalemia com alteração eletrocardiográfica e hipermagnesemia.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável IV 10%, ampola 10 mL (fornece cerca de 0,46 mEq ou 9 mg de cálcio elementar por mL).

221. Gramicidina + Triancinolona + Neomicina + Nistatina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Dermatoses inflamatórias e pruriginosas cutâneas com infecção bacteriana ou fúngica secundária.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Creme e pomada dermatológica combinada em bisnagas de 30 g.

222. Granisetrona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia antineoplásica (a partir de 2 anos) e pós-operatório.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 1 mg/mL (ampola 3 mL) e bolsas de infusão IV.

223. Haloperidol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Agitação psicomotora grave, delirium hiperativo, tiques e síndrome de Tourette (uso oral a partir de 6 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Gotas 2 mg/mL; comprimidos 1 mg e 5 mg; solução injetável IM 5 mg/mL; decanoato IM de liberação prolongada 50 mg/mL.

224. Hedera Helix

Indicações Clínicas e Pediátricas: Expectorante e secretolítico vegetal para tosse produtiva em afecções broncopulmonares (a partir de 2 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope com extrato seco de *Hedera helix* 7 mg/mL.

225. Heparina Não Fracionada

Indicações Clínicas e Pediátricas: Anticoagulação em circuitos de hemodiálise e circulação extracorpórea; profilaxia e tratamento tromboembólico (fórmulas sem álcool benzílico em neonatos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável IV 5.000 UI/mL; gels e soluções tópicas para flebites superficiais.

226. Hidralazina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de emergências hipertensivas graves e hipertensão arterial refratária.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 20 mg/mL (ampola 1 mL).

227. Hidroclorotiazida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de hipertensão arterial e edemas associados à insuficiência cardíaca ou síndrome nefrótica; hipercalcúria idiopática.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 25 mg e 50 mg.

228. Hidrocortisona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Crise adrenal aguda, reposição na insuficiência adrenal crônica, choque refratário, asma grave, dermatite atópica leve (tópica).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó injetável (succinato sódico) frascos 100 mg e 500 mg; cremes e pomadas de acetato ou base a 1%.

229. Hidroxicloroquina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, artrite idiopática juvenil e afecções reumáticas (bula acima de 6 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 400 mg de sulfato de hidroxicloroquina (equivalente a 309,6 mg base).

230. Hidróxido de Alumínio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Alívio sintomático da pirose e hiperacidez gástrica (uso adulto na bula).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos mastigáveis e suspensão oral antiácida.

231. Hidróxido de Alumínio + Hidróxido de Magnésio (+ Simeticona)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Alívio da dispepsia ácida, pirose, epigastria e distensão abdominal por gases.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral antiácida e comprimidos mastigáveis combinados.

232. Hidróxido Férrico em Sacarose (Sacarato Férrico)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da anemia ferropriva grave com intolerância ou falha ao ferro oral (doença renal crônica, DII).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável IV 20 mg/mL de ferro elementar (ampola 5 mL = 100 mg); suspensão oral.

233. Hidroxiquinolina + Trolamina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Remoção de rolha de cerume e limpeza do conduto auditivo externo.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução otológica em frasco com 8 mL.

234. Hidroxizina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prurido alérgico, urticária, dermatite atópica; sedação adjuvante e ansiedade (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral/xarope 2 mg/mL (10 mg/5 mL); comprimidos 25 mg.

235. Hidroxocobalamina (Vitamina B12)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Antídoto específico para intoxicação aguda por cianeto; tratamento de deficiência de vitamina B12 e acidemia metilmalônica.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Frasco antídoto IV 5 g; ampolas IM de 5 mg/mL.

236. Ibuprofeno

Indicações Clínicas e Pediátricas: Febre e dor leve a moderada (gotas e suspensões contraindicadas abaixo de 6 meses); fechamento do canal arterial em prematuros (formulação intravenosa neonatal IV).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Gotas 50 e 100 mg/mL; suspensão oral; comprimidos e cápsulas 300, 400 e 600 mg; solução IV 4 mg/mL e 6 mg/mL.

237. Idarucizumabe

Indicações Clínicas e Pediátricas: Reversão urgente da anticoagulação por dabigatrana em hemorragias graves ou cirurgias de emergência (uso adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 50 mg/mL, embalagem com 2 frascos de 50 mL (2,5 g cada).

238. Idursulfase

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de repostos enzimática na mucopolissacaridose tipo II (síndrome de Hunter).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução concentrada para infusão 2 mg/mL (frasco 3 mL = 6 mg).

239. Iloprost

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da hipertensão arterial pulmonar em classes funcionais avançadas.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução para inalação 10 mcg/mL (ampola 1 mL).

240. Imiglucerase

Indicações Clínicas e Pediátricas: Terapia de reposição enzimática a longo prazo na doença de Gaucher tipos 1 e 3.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para solução injetável 400 UI/frasco.

241. Imipenem + Cilastatina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções intra-abdominais graves, sepse, infecções polimicrobianas por bactérias produtoras de ESBL (aprovado a partir de 3 meses).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500 mg + 500 mg.

242. Imipramina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Enurese noturna refratária (acima de 5 anos); depressão e transtornos de pânico em adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos de cloridrato de imipramina 25 mg.

243. Imunoglobulina Humana Anti-Hepatite B

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia pós-exposição ao vírus da hepatite B e prevenção da transmissão vertical em recém-nascidos de mães HBsAg positivas.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável IM 100 UI/0,5 mL e 1.000 UI/5 mL.

244. Imunoglobulina Humana Antirrábica

Indicações Clínicas e Pediátricas: Imunização passiva pós-exposição ao vírus da raiva em acidentes graves.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 150 UI/mL (frasco 2 mL = 300 UI, fornecimento institucional SUS).

245. Imunoglobulina Humana Antitetânica

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia do tétano em ferimentos de alto risco e tratamento do tétano acidental e neonatal.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 250 UI/mL (seringa 1 mL).

246. Imunoglobulina Humana Intravenosa (IGIV)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Doença de Kawasaki, púrpura trombocitopênica imune, imunodeficiências primárias, síndrome de Guillain-Barré, SIM-P associada à Covid-19 (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução para infusão IV 50 mg/mL (5%) e 100 mg/mL (10%).

247. Indometacina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de inflamações articulares e febre (acima de 2 anos); fechamento do canal arterial em recém-nascidos prematuros.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas 25 mg e 50 mg.

248. Insulina Asparte

Indicações Clínicas e Pediátricas: Diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2: cobertura prandial ultrarrápida e correção de hiperglicemia (a partir de 1 ano).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 100 UI/mL em frasco 10 mL e carpule/caneta preenchida 3 mL.

249. Insulina Degludeca

Indicações Clínicas e Pediátricas: Controle glicêmico basal no diabetes mellitus tipo 1 (a partir de 1 ano) e tipo 2.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável ultralonga 100 UI/mL em caneta preenchida 3 mL.

250. Insulina Glargina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Diabetes mellitus tipos 1 e 2: controle glicêmico basal prolongado (formulação basal 100 UI/mL a partir de 2 anos; formulação basal 300 UI/mL a partir de 6 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 100 UI/mL e 300 UI/mL em canetas preenchidas.

251. Insulina Glulisina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Diabetes mellitus: cobertura prandial rápida a partir de 4 anos de idade.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 100 UI/mL em frasco 10 mL e carpule/caneta 3 mL.

252. Insulina Lispro

Indicações Clínicas e Pediátricas: Diabetes mellitus: cobertura prandial, correção de hiperglicemia e infusão subcutânea contínua por bomba.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 100 UI/mL em frasco 10 mL e caneta 3 mL.

253. Insulina NPH (Humana)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Controle glicêmico basal intermediário no diabetes mellitus tipos 1 e 2.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão injetável intermediária 100 UI/mL em frasco 10 mL e caneta 3 mL.

254. Insulina Regular (Humana)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da cetoacidose diabética; controle glicêmico e tratamento de urgência da hipercalcemia grave associada à glicose.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável rápida 100 UI/mL em frasco 10 mL e caneta 3 mL.

255. Iodeto de Potássio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Bloqueio tireoidiano em exposição acidental a iodo radioativo (emergências nucleares); expectorante de curta duração.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope 20 mg/mL; comprimidos 130 mg (produto estratégico nacional).

256. Isavuconazol (Sulfato de Isavuconazônio)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da aspergilose invasiva e mucormicose (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas equivalentes a 100 mg de isavuconazol; pó para infusão 200 mg.

257. Isoflurano

Indicações Clínicas e Pediátricas: Indução e manutenção de anestesia geral; sedação em UTI (estado de mal asmático refratário, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Líquido volátil para inalação em frascos de 100 mL e 240 mL.

258. Isoniazida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da tuberculose ativa (esquema combinado) e profilaxia da infecção latente pelo *Mycobacterium tuberculosis*.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 100 mg e 300 mg; associações fixas e comprimidos dispersíveis pediátricos.

259. Isossorbida (Dinitrato / Mononitrato)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia e tratamento da angina; insuficiência cardíaca crônica descompensada (uso adulto predominante).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos sublinguais e orais; mononitrato solução IV 10 mg/mL; cápsulas de liberação prolongada.

260. Itraconazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de micoses sistêmicas endêmicas (paracoccidioidomicose, histoplasmose, esporotricose) e dermatomicoses refratárias.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas gelatinosas 100 mg.

261. Ivermectina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Estrongiloidíase, escabiose, oncocercose e pediculose (via oral; restrições para menores de 5 anos ou $\leq 15 \text{ kg}$ na bula de referência); rosácea (creme tópico).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 6 mg; creme dermatológico 10 mg/g (1%).

262. L-Ornitina L-Aspartato

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da hiperamonemia em hepatopatias agudas ou crônicas e encefalopatia hepática (uso adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Granulado oral 0,6 g/g em envelopes; solução injetável 0,5 g/mL.

263. Lacosamida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento adjuvante de crises epilépticas focais a partir de 16 anos nas bulas brasileiras (uso abaixo de 16 anos ou em generalizadas, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 10 mg/mL; comprimidos 50 a 200 mg; solução IV 10 mg/mL.

264. Lactulose

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da constipação intestinal funcional crônica e encefalopatia hepática.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral / xarope 667 mg/mL (66,7%).

265. Lamotrigina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Epilepsias focais e generalizadas (incluindo Lennox-Gastaut); prevenção de episódios depressivos no transtorno bipolar.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos dispersíveis/mastigáveis 25, 50, 100 e 200 mg; comprimidos convencionais.

266. Lansoprazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da DRGE com esofagite, úlcera péptica e erradicação de *H. pylori*.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas gastrorresistentes 15 mg e 30 mg.

267. Laronidase

Indicações Clínicas e Pediátricas: Terapia de reposição enzimática para manifestações não neurológicas da mucopolissacaridose tipo I (Hurler e Scheie).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução concentrada para infusão 0,58 mg/mL (frasco 5 mL = 2,9 mg).

268. Levetiracetam

Indicações Clínicas e Pediátricas: Crises focais (monoterapia a partir de 16 anos; adjuvância oral a partir de 1 mês), crises mioclônicas e tônico-clônicas generalizadas.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 100 mg/mL; comprimidos revestidos 250, 500, 750 e 1000 mg; solução para infusão IV 100 mg/mL.

269. Levocetirizina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da rinite alérgica e urticária crônica (gotas a partir de 2 anos; comprimidos a partir de 6 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral em gotas 5 mg/mL; comprimidos revestidos 5 mg.

270. Levodopa + Benserazida / Carbidopa

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da doença de Parkinson (uso adulto); distonia responsiva à dopa / síndrome de Segawa (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos e cápsulas de liberação imediata e modificada em proporções combinadas.

271. Levodropropizina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Alívio sintomático da tosse seca e irritativa em crianças acima de 2 anos e adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope 6 mg/mL; gotas orais 30 mg/mL.

272. Levofloxacino

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções bacterianas graves por agentes suscetíveis (pneumonia, sinusite, pielonefrite); tuberculose drogárresistente (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 500 mg e 750 mg; solução para infusão IV 5 mg/mL.

273. Levomepromazina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Agitação psicomotora em quadros psicóticos; adjuvante em cuidados paliativos para delírio, dor e insônia refratária.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Gotas 40 mg/mL; comprimidos 25 mg e 100 mg.

274. Levosimendana

Indicações Clínicas e Pediátricas: Insuficiência cardíaca descompensada grave com necessidade de inotrópico; baixo débito pós-cirurgia cardíaca pediátrica (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução concentrada para infusão IV 2,5 mg/mL (frasco 5 mL = 12,5 mg).

275. Levotiroxina Sódica

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento do hipotireoidismo congênito e adquirido; supressão de TSH no câncer diferenciado da tireoide.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos com dosagens graduadas de 12,5 mcg até 200 mcg.

276. Lidocaína

Indicações Clínicas e Pediátricas: Anestesia local infiltrativa e regional; anestesia tópica de mucosas; tratamento de arritmias ventriculares malignas.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Soluções injetáveis 1% e 2% (com e sem vasoespasmolítico); spray 10%; geleia 2%; pomada 5%; emplastro 5%.

277. Linezolida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções graves por Gram-positivos multirresistentes (MRSA, enterococos resistentes à vancomicina); tuberculose drogárresistente (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 600 mg; solução para infusão IV 2 mg/mL.

278. Lisdexanfetamina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) a partir de 6 anos; transtorno de compulsão alimentar (adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas 30, 50 e 70 mg; solução oral em gotas 40 mg/mL.

279. Lítio (Carbonato)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento do transtorno bipolar (manias e profilaxia); potencializador de antidepressivos na depressão grave (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 300 mg; comprimidos de liberação prolongada 450 mg.

280. Loperamida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento sintomático da diarreia aguda inespecífica não infecciosa em adultos (contraindicada na diarreia infecciosa aguda infantil).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 2 mg.

281. Loratadina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento sintomático da rinite alérgica e urticária crônica em crianças e adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope 1 mg/mL (5 mg/5 mL); comprimidos 10 mg.

282. Lorazepam

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de distúrbios de ansiedade; pré-medicação anestésica; controle da catatonia (uso oral adulto na bula).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 1 mg e 2 mg.

283. Losartana Potássica

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hipertensão arterial e proteção renal na nefropatia diabética (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 25 mg, 50 mg e 100 mg.

284. Macrogol 3350 / 4000 (PEG)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da constipação intestinal funcional crônica, desimpactação fecal e preparo intestinal para colonoscopia.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Envelopes de pó para suspensão oral (com e sem eletrólitos); solução oral de PEG 4000.

285. Manitol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Redução da pressão intracraniana e edema cerebral; controle de hipertensão intraocular aguda.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável para infusão IV a 20% (200 mg/mL), frascos de 250 mL e 500 mL.

286. Mebendazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de parasitoses intestinais por oxiúros (*Enterobius vermicularis*), ascariíase, tricuriase e ancilostomíase.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 100 mg; suspensão oral 20 mg/mL.

287. Mebeverina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de dor e espasmos abdominais associados à síndrome do intestino irritável (uso adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas de liberação prolongada 200 mg.

288. Meloxicam

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da osteoartrite e artrite reumatoide (uso oral adulto acima de 12 anos; AIJ em pediatria, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 7,5 mg e 15 mg; comprimidos orodispersíveis; solução injetável IM.

289. Meropenem

Indicações Clínicas e Pediátricas: Meningite bacteriana, sepse grave, infecções intra-abdominais complicadas, exacerbações em fibrose cística (aprovado a partir de 3 meses).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para solução injetável frascos 500 mg e 1 g; bolsas bicompartimentais prontas.

290. Mesalazina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Retocolite ulcerativa e doença de Crohn colônica: indução e manutenção da remissão clínica.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos de liberação específica 400 a 1.200 mg; grânulos orais em sachê; supositórios 1.000 mg.

291. Metadona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Dor crônica e intensa refratária; desmame e prevenção de abstinência de opioides em UTI pediátrica (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 5 mg e 10 mg; solução injetável 10 mg/mL.

292. Metformina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento do diabetes mellitus tipo 2 (a partir de 10 anos na forma convencional); síndrome dos ovários policísticos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 500, 850 e 1000 mg; comprimidos de liberação prolongada XR 500, 750 e 1000 mg.

293. Metilergometrina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento de hemorragia uterina pós-parto e atonia uterina (uso obstétrico adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável de maleato de metilergometrina 0,2 mg/mL (ampola 1 mL).

294. Metilfenidato

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) a partir de 6 anos de idade; narcolepsia.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos de liberação imediata 10 mg; cápsulas e comprimidos de liberação prolongada/osmótica.

295. Metilprednisolona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Corticoterapia sistêmica de alta potência em nefrites lúpicas, rejeição de transplante, exacerbações asmáticas graves.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó injetável (succinato) 125 mg e 500 mg; suspensão de depósito (acetato); cremes e loções (aceponato tópico).

296. Metoclopramida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Distúrbios da motilidade gastrointestinal e náuseas/vômitos (contraindicada abaixo de 1 ano e restrita em crianças de 1 a 18 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Gotas orais 4 mg/mL; comprimidos 10 mg; solução injetável 5 mg/mL.

297. Metoprolol (Tartarato / Succinato)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hipertensão arterial, taquicardias supraventriculares, insuficiência cardíaca crônica estável.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Tartarato comprimidos e injetável 1 mg/mL; succinato comprimidos de liberação prolongada (forças nominais 25, 50 e 100 mg).

298. Metronidazol / Benzoilmetronidazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Amebíase, giardíase, infecções por bactérias anaeróbias estritas (intra-abdominais, pélvicas, abscesso cerebral), colite por *C. difficile*.*

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral de benzoilmetronidazol; comprimidos 250 e 400 mg; infusão IV 5 mg/mL; géis vaginais e dermatológicos.

299. Micafungina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de candidíase invasiva e candidemia; profilaxia de infecções fúngicas em transplante de medula óssea.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para solução injetável frascos 50 mg e 100 mg.

300. Miconazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da candidíase oral (gel a partir de 6 meses); dermatofitoses superficiais e candidíase cutânea.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Gel oral 20 mg/g; creme dermatológico e vaginal 20 mg/g; loções e pós tópicos.

301. Midazolam

Indicações Clínicas e Pediátricas: Sedação pré-procedimento, indução anestésica, sedação contínua em UTI; crises convulsivas prolongadas (vias intranasal e bucal, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 2 mg/mL; comprimidos 7,5 e 15 mg; solução injetável 1 mg/mL e 5 mg/mL.

302. Mikania Glomerata (Guaco)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Xarope fitoterápico adjuvante para alívio da tosse produtiva e rouquidão em vias aéreas (a partir de 2 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope e extrato fluido padronizado em frascos de 120 mL.

303. Milrinona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento inotrópico e vasodilatador (inodilatador) de curto prazo na insuficiência cardíaca grave e baixo débito pós-cirurgia cardíaca.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 1 mg/mL de milrinona base (ampola 10 mL = 10 mg).

304. Minociclina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da acne inflamatória moderada a grave e infecções por patógenos sensíveis (acima de 8 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos equivalentes a 100 mg de minociclina base.

305. Misoprostol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Maturação cervical e indução do trabalho de parto em obstetrícia hospitalar.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos vaginais de 25 mcg e 200 mcg.

306. Mometasona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e profilaxia da rinite alérgica; dermatites atópicas e eczema cutâneo.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Spray nasal 50 mcg/dose; cápsulas para inalação 200 e 400 mcg; creme e pomada dermatológica 0,1%.

307. Montelucaste de Sódio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de manutenção e controle adjuvante da asma persistente; prevenção de broncoconstrição por exercício; rinite alérgica.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Grânulos orais em sachê 4 mg; comprimidos mastigáveis 4 mg e 5 mg; comprimidos revestidos 10 mg.

308. Morfina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Analgesia opioide para dor intensa aguda (trauma, queimaduras, crise falciforme), dor oncológica e cuidados paliativos pediátricos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 10 mg/mL; comprimidos 10 e 30 mg; cápsulas de liberação prolongada; solução injetável 0,1 a 10 mg/mL.

309. Moxifloxacino

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de conjuntivite bacteriana (colírio); infecções respiratórias em adultos e tuberculose multirresistente (off-label sistêmico).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 400 mg; solução IV 1,6 mg/mL; colírio 0,5%.

310. Mupirocina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento tópico de impetigo, foliculite e infecções bacterianas superficiais da pele.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pomada dermatológica 20 mg/g (2%).

311. Naloxona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Reversão da depressão respiratória aguda e coma por superdose ou intoxicação exógena por opioides.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 0,4 mg/mL (ampola 1 mL).

312. Naproxeno (Sódico)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Analgésico e anti-inflamatório em dor musculoesquelética, dismenorrea e processos inflamatórios (uso adulto na bula; AIJ off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos de naproxeno 250 e 500 mg; comprimidos de naproxeno sódico 275, 550 e liberação prolongada 660 mg.

313. Neomicina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento tópico de infecções bacterianas superficiais da pele e prevenção de infecção em feridas.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Creme e pomada dermatológica de sulfato de neomicina.

314. Neomicina + Bacitracina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento de infecções bacterianas cutâneas superficiais, impetigo, pequenas queimaduras e escoriações.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pomada dermatológica combinada.

315. Neostigmina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Reversão do bloqueio neuromuscular não despolarizante; tratamento sintomático da miastenia gravis.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 0,5 mg/mL (ampola 1 mL).

316. Nifedipino

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da hipertensão arterial crônica (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas de liberação imediata 10 mg; cápsulas e comprimidos de ação prolongada (OROS) 20 a 60 mg.

317. Nimesulida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de dor inflamatória aguda e febre (contraindicado estritamente abaixo de 12 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral em gotas 50 mg/mL; comprimidos 100 mg; comprimidos dispersíveis; gel dermatológico 2%.

318. Nistatina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento local da candidíase oral (sapinho) e candidíase intestinal.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral 100.000 UI/mL; drágeas 500.000 UI; creme vaginal.

319. Nistatina + Óxido de Zinco

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e prevenção da dermatite de fraldas complicada por infecção fúngica (*Candida albicans*).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pomada e creme dermatológico combinados em bisnagas.

320. Nitazoxanida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de parasitoses intestinais por protozoários (*Giardia lamblia*, *Cryptosporidium*) e helmintos, além de gastroenterites virais.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para suspensão oral 20 mg/mL (a partir de 1 ano); comprimidos revestidos 500 mg (acima de 12 anos).

321. Nitrofurantoína

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e profilaxia de infecções do trato urinário baixo por bactérias sensíveis (contraindicado em menores de 1 mês e na pielonefrite).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas 100 mg.

322. Nitroglicerina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de edema agudo de pulmão hipertensivo, insuficiência cardíaca descompensada e controle hemodinâmico cirúrgico.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Concentrado para infusão IV 5 mg/mL (ampolas 5 mL e 10 mL).

323. Nitroprussiato de Sódio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de emergências hipertensivas graves, encefalopatia hipertensiva e dissecção aórtica.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado IV 50 mg/frasco com diluente; solução concentrada IV 25 mg/mL.

324. Noradrenalina (Norepinefrina)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento do choque séptico vasoplégico e hipotensão arterial refratária em adultos e pediatria.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável concentrada para infusão 2 mg/mL de hemitartrato (equivalente a 1 mg/mL de base).

325. Nortriptilina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de depressão em adultos; dor neuropática crônica e profilaxia de migrânea (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas de 10 mg, 25 mg, 50 mg e 75 mg.

326. Octreotida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de hemorragia digestiva por varizes esofágicas; hiperinsulinismo congênito e quilotórax refratário (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 0,05 a 0,5 mg/mL; pó para suspensão injetável de liberação prolongada (LAR).

327. Olanzapina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da esquizofrenia e transtorno bipolar em adultos (adolescentes a partir de 13 anos para esquizofrenia); náuseas refratárias (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos simples e orodispersíveis 2,5, 5 e 10 mg.

328. Óleo Mineral (Petrolato Líquido)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e lubrificação para constipação intestinal (uso oral); hidratação cutânea (uso tópico).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Óleo mineral puro 100%, frasco 100 mL.

329. Olopatadina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e profilaxia de sinais e sintomas da conjuntivite alérgica (uso ocular a partir de 3 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oftálmica (colírio) 0,1% e 0,2%.

330. Omalizumabe

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento complementar da asma alérgica grave persistente (a partir de 6 anos) e urticária crônica espontânea refratária (a partir de 12 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução SC em seringa preenchida 75 mg e 150 mg; pó para solução injetável 150 mg.

331. Omeprazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: DRGE com esofagite erosiva, úlcera péptica, erradicação de *H. pylori** (formulado a partir de 1 ano nas apresentações adequadas).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas gastrorresistentes 10, 20 e 40 mg; pó para solução IV 40 mg; comprimidos de liberação retardada (MUPS).

332. Ondansetrona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia, radioterapia e no pós-operatório; vômitos na gastroenterite aguda (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos e filmes orodispersíveis 4 e 8 mg; solução oral 0,8 mg/mL; gotas 4 mg/mL e 8 mg/mL; solução injetável 2 mg/mL.

333. Oseltamivir

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e quimioprofilaxia da infecção por vírus da influenza A e B (bula aprovada a partir de 1 ano; uso neonatal off-label respaldado pelo Ministério da Saúde).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas 30, 45 e 75 mg de oseltamivir base.

334. Oxacilina Sódica

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de infecções graves por *Staphylococcus aureus** sensível à meticilina (celulite, osteomielite, artrite séptica, endocardite, sepse).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável frasco-ampola 500 mg.

335. Oxcarbazepina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de crises epilépticas focais com ou sem generalização secundária (aprovado a partir de 1 mês de idade).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral 60 mg/mL (6%); comprimidos revestidos 300 mg e 600 mg.

336. Oxiconazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento tópico de dermatomicoses superficiais, tíneas e pitíriase versicolor.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Creme dermatológico 10 mg/g; solução tópica 10 mg/mL.

337. Oxigênio Medicinal

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e prevenção da hipoxemia e hipóxia em quadros agudos, suporte anestésico e em terapia intensiva.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Gás medicinal comprimido em cilindros e líquido criogênico (pureza mínima 99,5%).

338. Oxitocina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento de hemorragia pós-parto por atonia uterina; indução do trabalho de parto (uso obstétrico adulto e adolescente).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 5 UI/mL (ampola 1 mL); spray nasal 40 UI/mL para ejeção de leite.

339. Palivizumabe

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia de infecções graves do trato respiratório inferior por Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em prematuros elegíveis, DBP e cardiopatias.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução IM 100 mg/mL (frascos de 50 mg e 100 mg).

340. Pantoprazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: DRGE, esofagite erosiva (oral a partir de 5 anos); profilaxia de úlcera de estresse e hemorragia digestiva alta (IV adulto e pediátrico off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos gastrorresistentes 20 e 40 mg; pó liofilizado para solução IV 40 mg.

341. Paracetamol (Acetaminofeno)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Alívio de febre e dor leve a moderada de diversas etiologias; suporte analgésico multimodal.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral/gotas 200 mg/mL; suspensões orais 32 mg/mL e 100 mg/mL; comprimidos 500 e 750 mg; solução para infusão IV 10 mg/mL.

342. Penicilamina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da doença de Wilson e cistinúria grave com formação recorrente de cálculos renais.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas 250 mg.

343. Permetrina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento tópico da escabiose (loção 5%) e pediculose do couro cabeludo (loção/emulsão capilar 1%).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Loção e emulsão capilar/dermatológica 10 mg/mL (1%) e 50 mg/mL (5%).

344. Petidina (Meperidina)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Analgesia opioide para dor aguda moderada a intensa (uso adulto predominante na bula; uso pediátrico excepcional e restrito).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 50 mg/mL (ampola 2 mL = 100 mg).

345. Picossulfato de Sódio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de curto prazo da constipação intestinal funcional e esvaziamento intestinal para exames.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral em gotas 7,5 mg/mL; preparações combinadas para preparo de colonoscopia.

346. Pilocarpina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Redução da pressão intraocular no glaucoma (uso oftálmico adulto e pediátrico restrito).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oftálmica 1%, 2% e 4%.

347. Pimecrolimo

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento tópico anti-inflamatório da dermatite atópica leve a moderada em face e pescoço (a partir de 3 meses).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Creme dermatológico 10 mg/g (1%).

348. Piperacilina + Tazobactam

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da neutropenia febril, infecções intra-abdominais e pulmonares graves (aprovado a partir de 2 anos na bula pediátrica).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para solução injetável frascos 2,25 g e 4,5 g.

349. Pirazinamida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da tuberculose ativa pulmonar e extrapulmonar (fase intensiva do esquema combinado).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral 30 mg/mL (150 mg/5 mL); comprimidos 500 mg.

350. Piridostigmina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento sintomático da miastenia gravis e síndromes miastênicas congênitas.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 60 mg de brometo de piridostigmina.

351. Piridoxina (Vitamina B6)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento da deficiência de vitamina B6; neuropatia por isoniazida e convulsões dependentes de piridoxina.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 40 mg de cloridrato de piridoxina.

352. Pirimetamina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da toxoplasmose congênita e adquirida em associação com sulfonamida e ácido folínico.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 25 mg.

353. Pirvínio (Pamoato)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de oxiúriase (*Enterobius vermicularis*) em dose única.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral 10 mg/mL; comprimidos revestidos 100 mg (expressos em embonato).

354. Plasma Fresco Congelado

Indicações Clínicas e Pediátricas: Reposição de deficiências múltiplas de fatores da coagulação, sangramentos ativos e reversão de cumarínicos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Bolsas de hemocomponente para transfusão.

355. Poliestirenosulfonato de Cálcio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e controle da hipercalemia em pacientes com doença renal crônica ou lesão renal aguda.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para suspensão oral ou retal em envelopes (27 g de resina por envelope).

356. Polimixina B

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de infecções sistêmicas graves causadas por bacilos Gram-negativos multirresistentes.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para solução injetável frascos de 500.000 UI e 1.000.000 UI.

357. Polimixina B + Neomicina + Fluocinolona + Lidocaína

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de otite externa aguda bacteriana com membrana timpânica íntegra e processos inflamatórios associados.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução otológica em frasco com 5 mL.

358. Poractanto Alfa

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e profilaxia da síndrome do desconforto respiratório (membrana hialina) em recém-nascidos prematuros.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão intratraqueal 80 mg/mL (frascos 1,5 mL e 3 mL).

359. Posaconazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia de infecções fúngicas invasivas em imunossuprimidos graves; tratamento de aspergilose e fusariose refratárias.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral 40 mg/mL (frasco 105 mL).

360. Praziquantel

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da esquistossomose, neurocisticercose e infestações por cestódeos e trematódeos (acima de 4 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 600 mg.

361. Prednisolona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Exacerbação de asma, síndrome nefrótica idiopática, crupe viral (alternativa oral), processos inflamatórios e autoimunes.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 1 mg/mL e 3 mg/mL; gotas orais 11 mg/mL e 22 mg/mL; comprimidos 5, 20 e 40 mg; colírios de acetato.

362. Prednisona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Corticoterapia sistêmica anti-inflamatória e imunossupressora em doenças alérgicas graves, reumáticas e pulmonares.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos de 5 mg e 20 mg.

363. Pregabalina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Dor neuropática e crises focais adjuvantes (uso adulto na bula; fibromialgia juvenil e dor crônica off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas e comprimidos de 25 mg a 300 mg; solução oral 25 mg/mL.

364. Primidona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de epilepsias focais e tônico-clônicas generalizadas refratárias (bula a partir de 8 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 100 mg e 250 mg.

365. Saccharomyces Boulardii

Indicações Clínicas e Pediátricas: Adjuvante no tratamento da diarreia aguda e prevenção de diarreia associada a antibióticos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas 100 mg e 200 mg; pó para suspensão oral em sachês.

366. Prometazina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de reações alérgicas agudas, prurido, náuseas e vômitos; creme para picadas (injetável contraindicado abaixo de 2 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 25 mg; solução injetável IM 25 mg/mL; creme dermatológico 20 mg/g.

367. Propiltiouracila

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da tempestade tireoidiana e hipertireoidismo (doença de Graves) em situações selecionadas.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 100 mg.

368. Propofol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Indução e manutenção da anestesia geral; sedação de pacientes ventilados em UTI (emulsão aprovada a partir de 3 anos para indução).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Emulsão injetável estéril 1% (10 mg/mL) e 2% (20 mg/mL) em ampolas, frascos e seringas.

369. Propranolol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia de migrânea, taquiarritmias, hipertireoidismo; tetralogia de Fallot (crises hipoxêmicas) e hemangioma infantil (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos de cloridrato de propranolol 10 mg, 40 mg e 80 mg.

370. Protamina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Reversão específica dos efeitos anticoagulantes da heparina não fracionada em hemorragias graves ou pós-circulação extracorpórea.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável de cloridrato de protamina 10 mg/mL (1.000 UI/mL), ampola 5 mL.

371. Quetiapina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da esquizofrenia (adolescentes a partir de 13 anos) e episódios maníacos do transtorno bipolar (a partir de 10 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos simples e de liberação prolongada 25 a 300 mg; pó para suspensão oral reconstituída.

372. Racecadotril

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento adjuvante antissecretor da diarreia aguda aquosa em lactentes (a partir de 3 meses) e crianças.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Grânulos para suspensão oral em sachês de 10 mg e 30 mg; cápsulas 100 mg para adultos.

373. Rasburicase

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e profilaxia da hiperuricemia aguda severa para prevenção de insuficiência renal na síndrome da lise tumoral.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução IV 1,5 mg/frasco com diluente.

374. Remifentanila

Indicações Clínicas e Pediátricas: Analgesia opioide de ação ultracurta na manutenção da anestesia geral (a partir de 1 ano) e ventilação mecânica em UTI (off-label pediátrico).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução IV 2 mg base por frasco.

375. Retinol (Vitamina A)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento da deficiência de vitamina A, xerofthalmia, cegueira noturna e terapia adjuvante do sarampo grave.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas moles 100.000 UI e 200.000 UI de palmitato de retinol.

376. Ribavirina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da hepatite C crônica em esquemas combinados selecionados (uso adulto e pediátrico).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas 250 mg.

377. Rifampicina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da tuberculose ativa (esquema combinado), quimioprofilaxia de doença meningocócica e infecções estafilocócicas associadas a biofilme.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral 20 mg/mL (100 mg/5 mL); cápsulas 300 mg.

378. Risperidona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da irritabilidade e agressividade associadas ao transtorno do espectro autista (a partir de 5 anos); esquizofrenia e mania.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 1 mg/mL; comprimidos revestidos 0,5 a 3 mg; suspensão IM de liberação prolongada (formulação de liberação prolongada intramuscular).

379. Rufinamida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Terapia adjuvante para crises epiléticas associadas à síndrome de Lennox-Gastaut (a partir de 4 anos e peso superior a 18 kg).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 200 mg e 400 mg.

380. Sais de Reidratação Oral (SRO)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento da desidratação aguda decorrente de diarreia ou vômitos e reposição de perdas hidroeletrólíticas.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução oral em envelopes de composições padronizadas (ex: osmolaridade reduzida) e soluções prontas para uso.

381. Salbutamol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Alívio rápido do broncoespasmo na crise asmática e sibilância aguda; hipercalemia aguda (nebulização, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Xarope 0,4 mg/mL; solução para nebulização 5 mg/mL; aerossol inalatório 100 mcg/jato; solução injetável 0,5 mg/mL.

382. Salmeterol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Manutenção prolongada da asma persistente e DPOC, sempre associado a corticosteroides inalatórios.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Associações fixas com propionato de fluticasona em aerossol e pó inalatório.

383. Secnidazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento em dose única de giardíase, amebíase intestinal e tricomoniase.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 1.000 mg; pó para suspensão oral 30 mg/mL.

384. Sertralina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) a partir de 6 anos; depressão e transtornos de ansiedade em adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 25 mg, 50 mg, 75 mg e 100 mg.

385. Sevoflurano

Indicações Clínicas e Pediátricas: Indução e manutenção de anestesia geral inalatória em procedimentos cirúrgicos pediátricos e adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Líquido volátil para inalação em frascos de 100 mL e 250 mL (100%).

386. Sildenafil

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da hipertensão arterial pulmonar (uso adulto na bula; uso pediátrico em HAP e hipertensão pulmonar persistente neonatal, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 20 mg, 25 mg, 50 mg e 100 mg.

387. Simeticona (Dimeticona)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Alívio do meteorismo, distensão e desconforto abdominal por excesso de gases intestinais.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Emulsão oral em gotas 75 mg/mL; comprimidos mastigáveis 40 mg.

388. Sinvastatina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de hipercolesterolemia primária e redução de eventos cardiovasculares em pacientes de alto risco (uso adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 10 mg, 20 mg e 40 mg.

389. Solução de Ringer com Lactato

Indicações Clínicas e Pediátricas: Ressuscitação volêmica, reidratação e reposição de água e eletrólitos no espaço extracelular.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução intravenosa cristalóide balanceada em frascos de 250 mL e 500 mL.

390. Somatropina (Hormônio do Crescimento)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de baixa estatura por deficiência de GH, síndrome de Turner, Prader-Willi, insuficiência renal crônica e PIG sem recuperação estatural.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado e soluções injetáveis em cartuchos/canetas preenchidas graduadas.

391. Soro Antiaracnídico

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de envenenamento moderado ou grave por aranhas do gênero *Phoneutria* (armadeira) e *Loxosceles* (aranha-marrom).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável em frasco-ampola de 5 mL.

392. Soro Antibotrópico (Pentavalente)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento específico de envenenamento ofídico botrópico (*jararaca*, *jararacuçu*, *caiçara*) leve, moderado ou grave.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável em frasco-ampola de 10 mL.

393. Soro Antibotulínico AB Bivalente

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento neutralizante do botulismo alimentar, de ferimentos ou intestinal causado pelas toxinas botulínicas tipos A ou B.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável em frasco-ampola de 20 mL.

394. Soro Anticrotálico

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento específico do envenenamento ofídico crotálico (*cascavel*) leve, moderado ou grave.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável em frasco-ampola de 10 mL.

395. Soro Antidiftérico

Indicações Clínicas e Pediátricas: Imunoterapia passiva no tratamento da difteria respiratória ou cutânea suspeita ou confirmada.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 10.000 UI/10 mL.

396. Soro Antielaídico (Bivalente)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento específico do envenenamento ofídico elapídico por serpentes do gênero *Micrurus* (coral-verdadeira).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável em frasco-ampola de 10 mL.

397. Soro Antiescorpiônico

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento específico de envenenamento escorpiônico moderado ou grave por escorpiões do gênero *Tityus*.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável em frasco-ampola de 5 mL.

398. Soro Antitetânico

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia pós-exposição ao tétano em ferimentos de risco (quando a imunoglobulina humana específica estiver indisponível).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 5.000 UI/5 mL.

399. Soro Polieletrólítico Balanceado

Indicações Clínicas e Pediátricas: Ressuscitação volêmica e reposição de déficits hidroeletrólíticos com menor risco de acidose hiperclorêmica.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Soluções cristaloides balanceadas (ex: Plasma-Lyte, Plasmfundin).

400. Succinilcolina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Bloqueio neuromuscular despolarizante de ação ultracurta para intubação endotraqueal de emergência ou sequência rápida.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável 100 mg e 500 mg/frasco.

401. Sucralfato

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de úlceras gástricas e duodenais, gastrites erosivas e profilaxia de úlcera de estresse.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensão oral 200 mg/mL; comprimidos mastigáveis 1 g; flaconetes.

402. Sufentanila

Indicações Clínicas e Pediátricas: Analgesia opioide de alta potência na indução e manutenção da anestesia geral balanceada e cirurgia cardíaca.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 5 mcg/mL e 50 mcg/mL.

403. Sugamadex

Indicações Clínicas e Pediátricas: Reversão específica do bloqueio neuromuscular induzido por rocurônio ou vecurônio (aprovado a partir de 2 anos de idade).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 100 mg/mL (frasco 2 mL).

404. Sulfadiazina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da toxoplasmose congênita e adquirida, em associação com pirimetamina e ácido folínico.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 500 mg.

405. Sulfadiazina de Prata

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento tópico de infecções em queimaduras de 2º e 3º graus e úlceras cutâneas (a partir de 2 meses).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Creme dermatológico a 1% (10 mg/g) em bisnagas e potes.

406. Sulfametoxazol + Trimetoprima (Co-Trimoxazol)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e profilaxia da pneumonia por *Pneumocystis jirovecii*, infecções urinárias, infecções por MRSA comunitário e isosporíase.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Suspensões orais 40+8 mg/mL e 80+16 mg/mL; comprimidos 400+80 mg e 800+160 mg; solução injetável IV.

407. Sulfassalazina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Retocolite ulcerativa e doença de Crohn (uso adulto na bula; AIJ e DII pediátrica off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos gastrorresistentes 500 mg.

408. Sulfato de Magnésio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de hipomagnesemia grave e crises de eclampsia; asma grave refratária e *torsades de pointes* (off-label); neuroproteção fetal (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 100 mg/mL (10%) e 500 mg/mL (50%), ampolas 10 mL.

409. Zinco (Sulfato)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento adjuvante da diarreia aguda e persistente em pediatria; prevenção e correção de deficiência nutricional.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 4 mg/mL de zinco elementar; comprimidos e comprimidos dispersíveis 20 mg; solução IV para NPT.

410. Sulfato Ferroso

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento da deficiência de ferro e anemia ferropriva na infância e gestação.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral em gotas e xarope (padronizados em ferro elementar); comprimidos 40 e 60 mg.

411. Tacrolimo

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção da rejeição de transplantes de órgãos sólidos (sistêmico); dermatite atópica moderada a grave (pomada 0,03% a partir de 2 anos; 0,1% a partir de 16 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pomadas 0,03% e 0,1%; cápsulas 1 mg e 5 mg; concentrado injetável 5 mg/mL; cápsulas de liberação prolongada.

412. Tadalafila

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da disfunção erétil e hiperplasia prostática benigna (uso adulto masculino).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 5 mg e 20 mg.

413. Teicoplanina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções graves por bactérias Gram-positivas sensíveis (MRSA, endocardite, sepse, osteomielite); colite por *C. difficile* (via oral).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para solução injetável frascos 200 mg e 400 mg.

414. Tenecteplase

Indicações Clínicas e Pediátricas: Trombolítico no infarto agudo do miocárdio com supra de ST e no AVC isquêmico agudo elegível (uso adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado injetável 25 mg, 40 mg e 50 mg com diluente.

415. Teofilina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de manutenção do broncoespasmo na asma de difícil controle (uso oral restrito a maiores de 16 anos na forma de liberação prolongada).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas com microgrânulos de liberação prolongada 100 mg e 200 mg.

416. Terbinafina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de onicomicoses e dermatomicoses superficiais extensas (creme tópico e comprimidos orais).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Creme dermatológico 10 mg/g (1%); comprimidos 250 mg.

417. Terbutalina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de resgate do broncoespasmo agudo grave e crise asmática refratária.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável de sulfato de terbutalina 0,5 mg/mL (ampola 1 mL).

418. Terlipressina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de hemorragia digestiva por varizes esofágicas e síndrome hepatorenal tipo 1 (uso adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado IV 1 mg; solução pronta em ampolas.

419. Tetraciclina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de infecções por agentes sensíveis, acne vulgar (uso adulto na bula); pomada oftálmica para infecções oculares.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas 500 mg; pomada oftálmica de cloridrato de tetraciclina 0,5%.

420. Tiabendazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento tópico de larva migrans cutânea e micoses superficiais selecionadas.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pomada dermatológica 50 mg/g (5%).

421. Tiamazol (Metimazol)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento do hipertireoidismo e preparo para tireoidectomia (doença de Graves).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 10 mg.

422. Tiamina (Vitamina B1)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e prevenção da deficiência de tiamina, beribéri e encefalopatia de Wernicke.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 100 mg e 300 mg; solução injetável 100 mg/mL (ampola 1 mL).

423. Ticagrelor

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção de eventos trombóticos ateroscleróticos na síndrome coronariana aguda e pós-AVC isquêmico (uso adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 90 mg.

424. Tigeciclina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Infecções intra-abdominais e de partes moles complicadas por microrganismos multirresistentes em adultos (uso pediátrico excepcional, off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para infusão IV frasco de 50 mg.

425. Timolol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Redução da pressão intraocular no glaucoma (colírio a partir de 2 anos na bula formulação oftálmica de referência); hemangiomas infantis superficiais (off-label cutâneo).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oftálmica em colírio 0,25% e 0,5%; solução gel oftálmica 0,5%.

426. Tinidazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de giardíase, amebíase intestinal e hepática, tricomoníase e infecções por anaeróbios (uso adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 500 mg.

427. Tioconazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento tópico de micoses superficiais, candidíase cutânea e onicomicose (solução para unhas).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução tópica para unhas 28% (280 mg/mL); creme e loção dermatológica 1%.

428. Tiopental

Indicações Clínicas e Pediátricas: Indução anestésica e controle de estado de mal epiléptico refratário em ambiente hospitalar especializado.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução injetável 500 mg e 1 g/frasco.

429. Tobramicina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento inalatório crônico da infecção por *Pseudomonas* na fibrose cística (a partir de 6 anos); infecções oculares externas e infecções sistêmicas graves.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução inalatória 300 mg/5 mL; colírio e pomada oftálmica 0,3%; solução injetável IV/IM.

430. Tocilizumabe

Indicações Clínicas e Pediátricas: Artrite idiopática juvenil poliarticular ou sistêmica (a partir de 2 anos); síndrome de liberação de citocinas pós CAR-T; Covid-19 grave.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução subcutânea em seringa preenchida 162 mg; concentrado para infusão IV 20 mg/mL (frascos 80, 200 e 400 mg).

431. Tocoferol (Vitamina E)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e prevenção da deficiência de vitamina E, anemias hemolíticas e suplementação na colestase e fibrose cística.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas moles 400 mg de acetato de racealfatocoferol.

432. Topiramato

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento adjuvante de crises focais e generalizadas, síndrome de Lennox-Gastaut; profilaxia de enxaqueca.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 25, 50 e 100 mg.

433. Tramadol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de dor moderada a intensa em adolescentes elegíveis (acima de 12 anos) e adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 100 mg/mL; cápsulas 50 mg; comprimidos de liberação prolongada; solução injetável 50 mg/mL.

434. Triancinolona Acetonida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de lesões inflamatórias e úlceras traumáticas da mucosa oral (pasta bucal); uveítes (suspensão ocular).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pomada bucal 1 mg/g; suspensão ocular 40 mg/mL para via intravítrea/subtenoniana.

435. Trimebutina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento dos sintomas da síndrome do intestino irritável e espasmos intestinais (bula a partir de 12 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas moles 200 mg de maleato de trimebutina.

436. Ureia

Indicações Clínicas e Pediátricas: Hidratação intensiva, queratólise e tratamento de peles hiperqueratóticas e xeróticas íntegras.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cremes dermatológicos a 10% e 20% em bisnagas.

437. Valaciclovir

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de herpes-zóster, herpes simples genital/labial e varicela (a partir de 12 anos na bula brasileira).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 500 mg.

438. Valganciclovir

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia de CMV pós-transplante de órgãos sólidos (a partir de 4 meses) e retinite por CMV em imunossuprimidos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 450 mg.

439. Vancomicina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de infecções sistêmicas graves por Gram-positivos multirresistentes (MRSA); colite por *C. difficile* (via oral).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para infusão IV frascos 500 mg e 1 g.

440. Varfarina Sódica

Indicações Clínicas e Pediátricas: Anticoagulante oral para prevenção e tratamento de tromboembolismo venoso e próteses valvares mecânicas.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos de 2,5 mg, 5 mg e 7,5 mg.

441. Vasopressina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento do choque vasodilatado refratário a catecolaminas; diabetes insípido central agudo.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 20 UI/mL (ampola 1 mL).

442. Verapamil

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de taquiarritmias supraventriculares, hipertensão arterial e angina do peito.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 80 mg; comprimidos de liberação prolongada 120 mg.

443. Vigabatrina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de espasmos infantis (síndrome de West) e epilepsias focais refratárias.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 500 mg.

444. Vitamina A + D (Associação)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção e tratamento concomitante da deficiência de vitaminas A e D e profilaxia de raquitismo.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral em gotas (vitamina A 50.000 UI/mL + vitamina D3 10.000 UI/mL).

445. Voriconazol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de aspergilose invasiva, candidíase esofágica e infecções graves por *Scedosporium* e *Fusarium* (a partir de 2 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 50 mg e 200 mg; pó para infusão IV 200 mg/frasco.

446. Duloxetine

Indicações Clínicas e Pediátricas: Transtorno depressivo maior, ansiedade generalizada, dor neuropática periférica diabética e fibromialgia (uso adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas de liberação retardada 30 mg e 60 mg.

447. Desvenlafaxina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento do transtorno depressivo maior em adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos de liberação prolongada 50 mg e 100 mg.

448. Vortioxetina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento do transtorno depressivo maior em pacientes adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 5, 10, 15 e 20 mg.

449. Trazodona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da depressão maior com ou sem ansiedade; dor na neuropatia diabética (uso adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 50 mg e 100 mg; comprimidos de liberação prolongada 150 mg e 300 mg.

450. Venlafaxina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da depressão, transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade social e pânico (uso adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos de liberação imediata 37,5 e 75 mg; cápsulas de liberação prolongada 37,5, 75 e 150 mg.

451. Mirtazapina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento de episódios de depressão maior em adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 30 e 45 mg; comprimidos orodispersíveis 15, 30 e 45 mg.

452. Memantina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da doença de Alzheimer moderada a grave e outras demências com prejuízo cognitivo (uso adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 10 e 20 mg; comprimidos orodispersíveis 5 e 10 mg; solução oral e gotas 10 mg/mL e 20 mg/mL.

453. Rivastigmina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento sintomático da demência de Alzheimer leve a moderadamente grave e demência associada à doença de Parkinson.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas 1,5 a 6 mg; solução oral 2 mg/mL; adesivos transdérmicos (4,6 a 13,3 mg/24h).

454. Donepezila

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento sintomático da demência de Alzheimer leve, moderadamente grave ou grave (uso adulto).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 5 mg e 10 mg.

455. Tezepelumabe

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento complementar de manutenção da asma grave (a partir de 12 anos); rinossinusite crônica grave com pólipos nasais em adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução subcutânea em caneta preenchida 210 mg/1,91 mL.

456. Dupilumabe

Indicações Clínicas e Pediátricas: Dermatite atópica grave (a partir de 6 meses); asma grave tipo 2 (a partir de 6 anos); rinossinusite com pólipos; esofagite eosinofílica (a partir de 1 ano e 15 kg); urticária crônica espontânea (a partir de 2 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução subcutânea em seringa preenchida 200 mg e 300 mg.

457. Mepolizumabe

Indicações Clínicas e Pediátricas: Asma eosinofílica grave (a partir de 6 anos); granulomatose eosinofílica com poliangiite e síndrome hipereosinofílica.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução SC 100 mg/frasco; solução pronta em caneta 100 mg e seringa 40 mg.

458. Benralizumabe

Indicações Clínicas e Pediátricas: Manutenção complementar da asma eosinofílica grave e granulomatose eosinofílica com poliangiite em adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução subcutânea 30 mg/mL em seringa preenchida de 1 mL.

459. Roflumilaste

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento complementar da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave com bronquite crônica em adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 500 microgramas.

460. Indacaterol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Manutenção broncodilatadora na DPOC moderada a grave em adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas com pó para inalação 150 e 300 microgramas com inalador.

461. Glicopirrônio (Brometo)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Manutenção broncodilatadora de longa duração na DPOC em adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas com pó para inalação 50 microgramas com inalador.

462. Umeclidínio (Brometo)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Manutenção broncodilatadora antichinérgica na DPOC em adultos.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para inalação 62,5 microgramas por dose.

463. Abatacepte

Indicações Clínicas e Pediátricas: Artrite reumatoide e artrite psoriásica em adultos; artrite idiopática juvenil poliarticular (IV a partir de 6 anos; SC conforme peso).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução IV 250 mg/frasco; solução subcutânea 125 mg/mL.

464. Adalimumabe

Indicações Clínicas e Pediátricas: Artrite reumatoide, espondilite anquilosante; doença de Crohn e retocolite ulcerativa (a partir de 6 anos); artrite idiopática juvenil e uveíte (a partir de 2 anos); hidradenite supurativa.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução subcutânea em seringa ou caneta preenchida (20 mg, 40 mg e 80 mg).

465. Etanercepte

Indicações Clínicas e Pediátricas: Artrite reumatoide, artrite psoriásica; psoríase em placas grave (a partir de 6 anos); artrite idiopática juvenil poliarticular (a partir de 2 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução SC 25 mg/frasco; solução subcutânea 50 mg/mL em seringa ou caneta.

466. Secuquinumabe

Indicações Clínicas e Pediátricas: Psoríase em placas moderada a grave (a partir de 6 anos); artrite psoriásica e espondilite anquilosante; artrite psoriásica juvenil (acima de 2 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução subcutânea em seringa (75 mg) e canetas preenchidas (150 mg e 300 mg).

467. Albumina Humana

Indicações Clínicas e Pediátricas: Restauração e manutenção do volume sanguíneo circulante em estados de choque, hipovolemia e hipoalbuminemia grave.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução para infusão IV a 20% (200 mg/mL) em frascos de 10 e 50 mL; solução a 5% (50 mg/mL).

468. Romiplostim

Indicações Clínicas e Pediátricas: Trombocitopenia imune primária crônica refratária (adultos; crianças a partir de 1 ano).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para solução subcutânea 250 mcg/frasco.

469. Eltrombopague

Indicações Clínicas e Pediátricas: Trombocitopenia imune crônica refratária (adultos e crianças acima de 6 anos); anemia aplástica severa.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 25 mg e 50 mg.

470. Emicizumabe

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia de rotina para prevenir ou reduzir episódios hemorrágicos em pacientes com hemofilia A (com ou sem inibidores).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução subcutânea em frascos (30 mg/mL, 150 mg/mL em apresentações graduadas).

471. Fator XIII da Coagulação Humana

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia e controle perioperatório de sangramentos por deficiência congênita ou adquirida do fator XIII.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução IV 250 UI/frasco com diluente.

472. Fator VIII + Fator de von Willebrand

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e profilaxia de sangramentos na doença de von Willebrand e hemofilia A.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para solução IV contendo fator VIII 500 UI + fator de von Willebrand 1.200 UI/frasco.

473. Fenoximetilpenicilina Potássica (Penicilina V)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Faringoamigdalite estreptocócica aguda (primeira linha oral); profilaxia secundária da febre reumática e de infecção pneumocócica na asplenia.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó para suspensão oral 400.000 UI/5 mL (frasco 60 mL); comprimidos 500.000 UI.

474. Nirsevimabe

Indicações Clínicas e Pediátricas: Prevenção de infecção grave do trato respiratório inferior por VSR em recém-nascidos e lactentes na primeira temporada viral e grupos de risco até 24 meses.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável IM em seringa preenchida 50 mg/0,5 mL e 100 mg/1,0 mL.

475. Atomoxetina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento do TDAH em crianças a partir de 6 anos e adolescentes, como opção não estimulante.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas duras de 10, 18, 25, 40, 60 e 80 mg.

476. Cloreto de Cálcio 10%

Indicações Clínicas e Pediátricas: PCR associada a hipocalcemia, hipercalemia com instabilidade miocárdica e hipermagnesemia sintomática (via central exclusiva).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 10% (100 mg/mL, ampolas 10 mL).

477. Fosfato de Potássio Injetável

Indicações Clínicas e Pediátricas: Correção de hipofosfatemia grave em pediatria e UTI; suporte em nutrição parenteral total.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução concentrada IV (2 mEq/mL de K⁺ e ~1 mmol/mL de fosfato), ampolas 10 mL.

478. Infliximabe

Indicações Clínicas e Pediátricas: Doença de Crohn e colite ulcerativa moderada a grave refratária (a partir de 6 anos); artrite idiopática juvenil poliarticular.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para infusão IV 100 mg/frasco.

479. Micofenolato de Mofetila / Sódio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia de rejeição em transplantes; nefrite lúpica e síndrome nefrótica cortico-resistente (off-label pediátrico).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Cápsulas 250 mg; comprimidos 500 mg; suspensão oral 200 mg/mL; micofenolato sódico comprimidos 180 e 360 mg.

480. Metotrexato (Uso Imunossupressor)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da artrite idiopática juvenil (AIJ) poliarticular e sistêmica, uveíte associada à AIJ e morfeia (a partir de 2 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 2,5 mg; solução injetável 25 mg/mL (frasco 2 mL).

481. Toxina Botulínica Tipo A

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento da espasticidade focal em membros na paralisia cerebral pediátrica (a partir de 2 anos); sialorreia crônica refratária (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado para solução injetável 50 UI, 100 UI e 200 UI.

482. Ropivacaína

Indicações Clínicas e Pediátricas: Anestesia locorregional cirúrgica e analgesia pós-operatória por bloqueio peridural, caudal e periférico em pediatria.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável 2 mg/mL (0,2%), 7,5 mg/mL e 10 mg/mL.

483. Carboximaltose Férrica

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento intravenoso da anemia por deficiência de ferro em crianças a partir de 1 ano e adolescentes quando o ferro oral é ineficaz ou inviável.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável IV 50 mg/mL de ferro elementar (frascos 2 mL e 10 mL).

484. Azul de Metileno (Cloreto de Metiltionínio)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Antídoto específico para tratamento de urgência da metemoglobinemia tóxica sintomática; choque vasoplégico refratário (off-label).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável IV 1% (10 mg/mL), ampolas 5 mL.

485. Pralidoxima

Indicações Clínicas e Pediátricas: Antídoto reativador colinesterásico no tratamento da intoxicação aguda por inseticidas organofosforados, em associação à atropina.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado injetável 200 mg e 1.000 mg com diluente.

486. Ciclesonida

Indicações Clínicas e Pediátricas: Manutenção e controle da asma persistente (a partir de 6/12 anos); tratamento da rinite alérgica (a partir de 2 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Aerossol inalatório oral 80 e 160 mcg/dose; spray nasal 50 mcg/acionamento.

487. Rupatadina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento sintomático da rinite alérgica e urticária crônica espontânea (solução oral de 2 a 11 anos; comprimidos a partir de 12 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução oral 1 mg/mL (frasco 120 mL); comprimidos 10 mg.

488. Propafenona

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia e tratamento de taquiarritmias supraventriculares paroxísticas e ventriculares na infância (cardiologia pediátrica).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 150 mg e 300 mg.

489. Sotalol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Manutenção do ritmo sinusal e prevenção de arritmias ventriculares e supraventriculares complexas na infância.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 120 mg e 160 mg.

490. Insulina Detemir

Indicações Clínicas e Pediátricas: Controle glicêmico basal no diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 em pediatria a partir de 1 ano de idade.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável subcutânea 100 U/mL em caneta preenchida 3 mL.

491. Fator IX da Coagulação Humana

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento e profilaxia de episódios hemorrágicos em pacientes pediátricos com hemofilia B.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó liofilizado injetável IV 500 UI e 1.000 UI com diluente.

492. Imunoglobulina Humana Antivaricela-Zóster (VZIG)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Profilaxia pós-exposição à varicela em recém-nascidos de risco e crianças imunocomprometidas suscetíveis.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução IM 125 UI e 250 UI (distribuição exclusiva CRIE / Ministério da Saúde).

493. Epoetina Alfa (Eritropoietina)

Indicações Clínicas e Pediátricas: Anemia da doença renal crônica em pediatria; prevenção e tratamento da anemia da prematuridade (off-label neonatal).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Solução injetável SC/IV em frascos ou seringas de 1.000 UI a 10.000 UI.

494. Baloxavir Marboxil

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento em dose única oral da influenza aguda (A e B) até 48h de sintomas em crianças a partir de 1 ano.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 20 mg e 40 mg.

495. Griseofulvina

Indicações Clínicas e Pediátricas: Tratamento oral de micoses superficiais e dermatofitoses, sendo primeira escolha para *tinea capitis* em pediatria.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 500 mg.

496. Acetato de Cálcio

Indicações Clínicas e Pediátricas: Agente quelante de fósforo intestinal para controle da hiperfosfatemia em crianças com doença renal crônica.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos 500 mg e 667 mg.

497. Cloranfenicol

Indicações Clínicas e Pediátricas: Meningite bacteriana em alérgicos graves a betalactâmicos; febre maculosa grave; infecções oculares superficiais.

Apresentações no Brasil (sem marcas): Pó injetável IV 1 g (succinato); colírio 0,4% e 0,5%; pomada oftálmica 1%.

498. Perampanel

Indicações Clínicas e Pediátricas: Terapia adjuvante para crises epiléticas focais (a partir de 4 anos) e crises tônico-clônicas generalizadas (a partir de 7 anos).

Apresentações no Brasil (sem marcas): Comprimidos revestidos 2, 4, 8 e 12 mg.