

10/09/24
 D S T Q S S
 D L M M J J

Lista de Exercícios - 1º
 PCD
 Prof.º Frederico Pinagé

{
 Juliano Melo Campos - 22250349
 Daniel Ribeiro Gonçalves - 22251338
 Ana Julia Pereira Corrêa - 22252025
 }

1-

código de bloco

linear sistemático → entrada

$(K+1, K) \sim (5, 4)$

$K=4$

→ saída

a) matriz geradora

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \rightarrow 2 \\ \rightarrow 2 \\ \rightarrow 2 \\ \rightarrow 2 \end{matrix}$$

$d_{\min}=2$

$$2 - G = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

→ para forma sistemática

$$L_1^N \Rightarrow L_1 + L_2 + L_3$$

$$\Rightarrow 1 \ 0 \ 0 \ 1$$

$$L_2 \Rightarrow 0 \ 1 \ 0 \ 1$$

$$L_3 \Rightarrow L_1^N + L_2 + L_3$$

$$\Rightarrow 0 \ 0 \ 1 \ 1$$

$$G_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

b) código gerador - lista

m	c	m	c
0000	00000	1000	10001
0001	00011	1001	10010
0010	00101	1010	10100
0011	00110	1011	10111
0100	01001	1100	11000
0101	01010	1101	11011
0110	01100	1110	11101
0111	01111	1111	11110

c) detecção:

correção

$$d_{\min} \geq t_0 + 1$$

$$d_{\min} \geq 2t_c + 1$$

$$2 \geq t_0 + 1$$

$$2 \geq 2t_c + 1$$

$$t_0 \leq 1$$

$$1 \geq 2t_c$$

$$t_0 = 1$$

$$t_c \leq \frac{1}{2}$$

$$t_c = 0$$

10 109 124

Q S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

3- $G = [I_k \ P] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

vetor $c_i = [110101]$

$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$C.H.T = [110101] \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

vetor c_i posto no código

4- $G = [P \ I_k] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

a) $H = [I \ P^T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ \rightarrow matriz geradora de paridade

b) $m = [101]$

$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow c_i = 101100$

$c_i = 110101 \rightarrow$ código de $[101]$

c) condição de ortogonalidade

$C.H.T = (110101) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$+ 011$
 000

ortogonal !!!

10 100 29
 (0) (1) (0) (0) (1) (0)
 (0) (1) (0) (0) (1) (0)

5 - vetor $c = 101011$ ^{ruído} $\rightarrow r = 101010$
 do código (6, 3, 3) $G = [P | I_k]$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\Delta 3} H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

^{errores}
 $d_{min} \geq 2t+1$
 $3 \geq 2t+1$
 $0t \leq 2$
 $t \leq 1$
 $t = 1$

$$S = rH^T = (101010) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{ruído}} S = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$6! = 6 \text{ erros}$
 $5! = 120 \text{ parâmetros}$
 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
 $S = e \cdot H^T$

$$c' = r + e$$

$$= 101010 + 000001$$

$$c' = 101011$$

\hookrightarrow código com erro/ruído
 corrigido

Questão 6.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{L_0 + L_1 \rightarrow L_0} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

TROCA-SE L_1 com L_2 .

a)

$$G = (P|I) \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

b)

msg	CODE
000	000000
001	110001
010	101010
011	011011
100	011100
101	101101
110	110110
111	000111

Questão 7.

$$M = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} 3 \times 6 \\ I \end{array}$$

$$\Rightarrow H^T = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} 6 \times 3 \\ I \end{array}$$

É ortogonal.

Questão 8.

codigo(5,2)

a)

$$G_{(I|P)} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \overset{d_m}{\textcircled{4}} \leftarrow \text{Maior distância Mínima.}$$

b)

$$H_{(P|I)} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$H^T = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

c)

$$l = d_m - 1 \quad t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$$

$$e = 3 - 1$$

$$e = 2$$

$$t = \left\lfloor \frac{2}{2} \right\rfloor$$

$$t = 1$$

d)

Erro	S
10000	111
01000	101
00100	100
00010	010
00001	001

Questão 9.

cod(8,4)

a)

$$G_{(5|P)} = \begin{bmatrix} m_0 & m_1 & m_2 & m_3 & p_0 & p_1 & p_2 & p_3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

b) d_m - A distância mínima é o menor valor da soma dos 1's de cada linha.

4
4
4
4

$$H_{(P|I)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

a)

e	S
1000.0000	0 1 1 1
0100.0000	1 1 1 0
0010.0000	1 1 0 1
0001.0000	1 0 1 1
0000.1000	1 0 0 0
0000.0100	0 1 0 0
0000.0010	0 0 1 0
0000.0001	0 0 0 1

$$r_1 = 10101010$$

$$S = e \cdot H^T = 0000 \text{ } \rho \text{ está correta!}$$

$$r_2 = 01011100$$

$$S = e \cdot H^T = 10001$$

↳ não é possível corrigir !!!

Questão 10.

$$G = \left[\begin{array}{cccccccccccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$H = \left[\begin{array}{cccccccccccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

11

I

	P1	P2	P3	P4	
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	1	0	0	1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	0	1	0	1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	1	1	0	0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	1	1	1	0	0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	1	0	0	1	0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	0	1	0	1	1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0	1	1	0	1	0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0	0	0	1	1	1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0	1	0	1	1	0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0	0	1	1	1	0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0	1	1	1	1	1

$$C = 11000101001.G$$

$$= 1000000000001100$$

$$0100000000001010$$

$$+ 000001000000101$$

$$0000000100000011$$

$$0000000000001111$$

$$110001010011111 //$$

I

P

(12)

$$G_{7 \times 4} = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \begin{array}{c} 3 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \end{array} \rightarrow dm$$

a) $\bar{m} = [0100] \times G = 0100101 //$

$0100101 \times H^T$

$$\begin{array}{r} 101 \\ + 100 \\ \hline 001 \\ (000) // \end{array}$$

$H^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

b) $\bar{m} = [0101] \times G = 0100101$

$$\begin{array}{r} \oplus 0001111 \\ 0101010 // \end{array}$$

$0101010 \times H^T$

$$\begin{array}{r} 101 \\ + 111 \\ \hline 010 \\ (000) // \end{array}$$

$$c) \bar{m} = [1110] \times G = 110$$

$$101$$

$$011$$

$$(000) //$$

$$\bar{m} = 1110000 //$$

$$d) \bar{m} = [1001] \times G = 1000110$$

$$+ 0001111$$

$$1001001 //$$

$$110$$

$$+ 111$$

$$001$$

$$(000) //$$

(13)

P

I

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 10 & 1 & : & 100 \\ 1 & 01 & 1 & : & 010 \\ 0 & 11 & 1 & : & 001 \end{bmatrix}$$

$$H^T =$$

$$110 \quad 11$$

$$101 \quad 10$$

$$011 \quad 00$$

$$111 \quad 11$$

$$100 \quad 00$$

$$010 \quad 00$$

$$001 \quad 11$$

$$t = \frac{(3-1)}{2} = 1$$

$$110$$

$$101$$

$$+ 111$$

$$001$$

$$101$$

erro

aqui

$$a) \bar{V} = [1101001] \cdot H^T$$

π H^T

a) $(101) \rightarrow 0 \text{ error}$

$e(t=1)$	3	
1 0 0 0 0 0 0	1 1 0	
0 1 0 0 0 0 0	1 0 1	1 1 0 1 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0	0 1 1	<u>0 1 0 0 0 0 0</u>
0 0 0 1 0 0 0	1 1 1	1 0 0 1 0 0 1 //
0 0 0 0 1 0 0	1 0 0	
0 0 0 0 0 1 0	0 1 0	1 1 0
0 0 0 0 0 0 1	0 0 1	1 1 1
		0 0 1 / (0 0 0) //

b) $\bar{v} = [1000111] \cdot H^T$

1 1 0	1 0 0 0 1 1 1
1 0 0	+ <u>0 0 0 0 0 0 1</u>
0 1 0	1 0 0 0 1 1 0 //
<u>0 0 1</u>	
0 0 1 \rightarrow error	

c) $\bar{v} = [1111100] \cdot H^T$

1 1 0	<u>0 1 0</u>	
1 0 1	(0 0 0) //	
+ 0 1 1		
1 1 1	1 1 1 1 1 0 0	
1 0 0 / 0 1 1	+ 0 0 1 0 0 0 0	1 1 0 1 1 0 0 //

$$\begin{array}{r}
 110 \\
 101 \\
 + 111 \\
 \hline
 100 \text{ } / (000) //
 \end{array}$$

$$d) \bar{v} = [1011001] \cdot H^T$$

$$\begin{array}{r}
 110 \\
 011 \\
 111 \\
 \hline
 001 \\
 011
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 1011001 \\
 + 0010000 \\
 \hline
 1001001 // \\
 110 \\
 + 111 \\
 \hline
 001 \text{ } / (000) //
 \end{array}$$

$$(14) \quad G = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix}$$

$$\begin{array}{r}
 L_0 + L_1 + L_2 \Rightarrow L_0 \rightarrow 1111 \\
 0101 \\
 \hline
 0011 \\
 1001
 \end{array}
 \qquad
 G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(15) \quad G = [I | P] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{bmatrix}$$

$G_{3 \times 4}$

$$H = [P | I]$$

$$H = [P_{1 \times 3}^T : I_1]$$

$$100$$

$$\oplus 010$$

$$001 / 111$$

$$H = [1 \ 1 \ 1 \ 1] //$$

$$e \quad a \quad H^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} //$$