

**BAYCUTEN^{MR} N**

Clotrimazol / Dexametazona / Neomicina
Crema

FORMULACIÓN.

Cada 100 g de **BAYCUTEN^{MR} N** crema contienen:

| | |
|--|---------|
| Clotrimazol | 1.0 g |
| Acetato de dexametazona | 0.040 g |
| Sulfato de neomicina equivalente a de neomicina | 0.500 g |
| Excipiente, c.b.p. | 100.0 g |

INDICACION(ES) TERAPÉUTICA(S).

BAYCUTEN^{MR} N crema está indicado en las dermatitis que cursan con infección bacteriana secundaria y que responden al tratamiento con corticoides, así como en las dermatitis complicadas por infecciones causadas por dermatofitos, levaduras, mohos y otros hongos.

BAYCUTEN^{MR} N crema combina el efecto antimicótico de amplio espectro del clotrimazol, el efecto antiinflamatorio, antipruriginoso y antialérgico del acetato de dexametazona con el poder antibacteriano del Sulfato de Neomicina, fármaco de gran efectividad en el tratamiento local de las infecciones bacterianas secundarias de la piel, lo que marca la diferencia y las ventajas entre **BAYCUTEN^{MR} N** crema y **BAYCUTEN^{MR}** crema ya que este último no contiene neomicina.

BAYCUTEN^{MR} N crema en resumen está indicado en eczemas de diversas etiologías, tanto primarios como complicados de infección bacteriana y/o micótica secundaria. Asimismo en eczemas por contacto, atópico, seborreico, numular y en neurodermatitis. **BAYCUTEN^{MR} N** crema es activo en dermatitis pruriginosas.

El clotrimazol es un antimicótico de amplio espectro que actúa contra dermatofitos, levaduras, mohos y otros hongos. Se sabe que el clotrimazol es antibacteriano frente a cocos grampositivos tales como, como estafilococos y *Corynebacterium minutissimum*, agente causal del eritema.

La dexametazona ejerce un efecto antiinflamatorio, antipruriginoso y antialérgico.

La neomicina es útil en el tratamiento de infecciones bacterianas de la piel causadas por microorganismos susceptibles, tales como *Escherichia coli*, *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae* y *Proteus vulgaris*, dentro de los organismos gram negativos. Con respecto a los gram positivos, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*, y algunas cepas de *Staphylococcus epidermidis*

El vehículo de **BAYCUTEN^{MR} N** permite su fácil y rápida penetración a los estratos profundos de la piel.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad a los ingredientes; ciertas manifestaciones cutáneas de infecciones sistémicas como sífilis, tuberculosis y varicela. Asimismo, enfermedades virales de la piel como herpes simple, rosáceo o en dermatitis perioral viral. No deberá aplicarse en infecciones del oído. No debe utilizarse concomitantemente con cubierta oclusiva en pacientes con eczema atópico.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA.

Durante el embarazo, particularmente en el primer trimestre, así como durante la lactancia, **BAYCUTEN^{MR} N**, al igual que todos los productos que contienen corticoesteroides, debe usarse sólo cuando la indicación ha sido bien establecida, por períodos cortos y no en superficies amplias.

Uso pediátrico.

Se aconseja no utilizar pañales desechables o calzoncitos de plástico durante el tratamiento, ya que pueden actuar como cubiertas oclusivas.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS.

Raras veces irritaciones cutáneas; acné por esteroides, telangiectasias, hipertrichosis, dermatofia, estrías cutáneas. El tratamiento a largo plazo con corticosteroides y antibióticos locales debe evitarse.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y OTRO GÉNERO.

No se ha reportado interacción con medicamentos o alimentos.

PRECAUCIONES.

Puede producir reacciones de rebote (al suspender la medicación brusca y prematuramente pueden presentarse las mismas afecciones que indicaron su uso). Gestación y lactancia. No se debe utilizar concomitantemente con una cubierta oclusiva en pacientes con eczema atópico. No se aplique en los ojos.

PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD.

No se han reportado hasta la fecha efectos de carcinogénesis, mutagénesis o teratogénesis con la aplicación local de dexametasona, clotrimazol y/o neomicina. Así mismo, no se conocen alteraciones de la fertilidad con esta forma de administración.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Se recomienda lavar la parte enferma con agua hervida, sin jabón, secar cuidadosamente y aplicar una capa delgada de **BAYCUTEN^{MR} N** crema con un ligero masaje, dos veces al día, de preferencia en la mañana y en la noche. Una vez que hayan desaparecido los síntomas es conveniente continuar el tratamiento para lograr la cura completa con formulaciones que no contienen corticoesteroides.

SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS).

No se han reportado hasta la fecha casos de sobredosificación o ingesta accidental con la aplicación tópica de dexametasona, clotrimazol y neomicina. Sin embargo la absorción sistémica por aplicación tópica de corticoesteroides ha producido supresión reversible del eje hipotalámico pituitario suprarrenal HPA, manifestaciones del síndrome de Cushing, hiperglicemia y glicosuria. Por lo que los pacientes que son tratados con corticosteroides en grandes superficies de la piel y/o, vendajes oclusivos por tiempo prolongado deberán evaluarse periódicamente para detectar posible supresión del eje HPA usando la prueba urinaria de cortisol libre y de estimulación en ACTH

PRESENTACIÓN.

Caja conteniendo un tubo de aluminio con 20 y 35 g de **BAYCUTEN^{MR} N** crema.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y seco.
Su venta requiere receta médica.
Literatura exclusiva para médicos.

Bayer de México, S.A. de C.V.
Blvd. M. de Cervantes Saavedra Núm 259
11520 México, D.F.

Baycuten^{MR} N

Reg. No. 036M95 SSA IV

GEAR-17826/95

**BAYCUTEN^{MR}**

Crema
Clotrimazol / Acetato de Dexametazona

FORMULACIÓN:

Cada 100 g de **BAYCUTEN^{MR}** crema contienen:

| | |
|-------------------------|---------|
| Clotrimazol | 1.0 g |
| Acetato de dexametazona | 0.040 g |
| Excipiente, c.b.p. | 100.0 g |

INDICACION(ES) TERAPÉUTICA(S):

El clotrimazol es un antimicótico de amplio espectro que actúa contra dermatofitos, levaduras, mohos y otros hongos. Se sabe que el clotrimazol es antibacteriano frente a cocos grampositivos, como estafilococos y *Corynebacterium minutissimum*, agente causal del eritrasma. La dexametazona ejerce un efecto antiinflamatorio, antipruriginoso y antialérgico. **BAYCUTEN^{MR}** está indicado en eccemas de diversa etiología; primarios, con o sin infección secundaria por hongos y/o bacterias, y secundarios a una infección primaria por hongos y/o bacterias. Eccemas: por contacto, atópico, seborreico, micótico, microbiano, numular y neurodermatitis. **BAYCUTEN^{MR}** actúa en dermatitis pruriginosas.

El vehículo especial de **BAYCUTEN^{MR}** permite su fácil y rápida penetración a los estratos profundos de la piel.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad a los ingredientes; ciertas manifestaciones cutáneas de infecciones sistémicas como sífilis, tuberculosis y varicela. Así mismo enfermedades virales de la piel como herpes simple, rosacea o en dermatitis perioral viral.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:

Durante el embarazo, particularmente en el primer trimestre, así como durante la lactancia, **BAYCUTEN^{MR}**, como todos los productos que contienen corticoides, debe ser usado solo cuando la indicación ha sido bien establecida, por períodos cortos y no en superficies amplias.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:

Raras veces irritaciones cutáneas; acné por esteroide, telangiectasias, hipertrichosis, dermatofia, estrías distensas. El tratamiento a largo plazo con corticosteroides locales, por tanto debe evitarse.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y OTRO GÉNERO:

No se han reportado interacciones con medicamentos o alimentos.

PRECAUCIONES:

Puede producir reacciones de rebote (al suspender la medicación prematuramente pueden presentarse las mismas afecciones alteradas). Gestación y lactancia. No se debe utilizar concomitantemente con una cubierta oclusiva en pacientes con eccema atópico.

PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

No se han reportado hasta la fecha efectos de carcinogénesis, mutagénesis o teratogénesis con la aplicación local de dexametasona y clotrimazol. Así mismo, no se conocen alteraciones de la fertilidad con esta forma de administración.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Se recomienda lavar la parte enferma con agua hervida, sin jabón, secar cuidadosamente y aplicar una capa delgada de **BAYCUTEN^{MR}** crema con un ligero masaje, dos veces al día, de preferencia en la mañana y en la noche. Una vez que hayan desaparecido los síntomas es conveniente continuar el tratamiento unos cinco días más.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS):

No se han reportado hasta la fecha casos de sobredosificación o ingesta accidental con la aplicación tópica de dexametasona y clotrimazol.

PRESENTACIÓN:

Caja conteniendo un tubo de aluminio con 30 g de **BAYCUTEN^{MR}** crema.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y seco. Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos.

Bayer de México, S.A. de C.V.
Blvd. M. de Cervantes Saavedra
Núm 259 11520 México, D.F.

Baycuten^{MR} Crema

Reg. Núm. 0153M80, S.S.A.

JEAR-23969/93