No.1061 高原草原

鹅喉羚

Goitered gazelle · *Gazella subgutturosa*


VU

易危

IUCN 2017

陆地 草食

草食性羚羊（维基未详述食性）



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

冬季日行		10–30 km
夏季日行		1–3 km
被猎捕历史		约 6000 年 约
分布国		十几国 约

刻度：距离 1–10000 km（对数）；年数 1–1 万年（对数）；数量 0–100。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 鼓起的喉咙

种名意思是“喉下饱满”，指公羊在发情期颈部和喉部会膨大。

技能 · 黑尾巴

也叫黑尾瞪羚。

认识鹅喉羚

鹅喉羚分布在土耳其、伊朗、中亚到中国西北和蒙古。

约 6000 年前人们就用“荒漠风筝”围栏捕杀它们。

冬季鹿群每天走 10–30 km，夏季只走 1–3 km。

冷知识 分布国包括格鲁吉亚、阿塞拜疆、伊拉克、巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦等。

分布： 中东、中亚到中国西北和蒙古的荒漠与半荒漠。

资料来源：Wikipedia「Goitered gazelle」；IUCN 红色名录（IUCN SSC 羚羊专家组 2017）。分布国数量为大约（待核）。 AI 辅助制作，需人工审核。