No.692 爬行两栖


东部拟眼镜蛇

Eastern brown snake · *Pseudonaja textilis*

LC
无危
IUCN 2018

陆地 农田 肉食

几乎只吃脊椎动物，主要是家鼠等哺乳动物



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

全长		可达 2 m
毒牙长		平均 2.8 mm
毒性排名		陆蛇第 2
描述年份		1854 年

刻度：长度 10 cm–10 m（对数）；长度 1 mm–1 m（对数）；数量 0–100；数量 1–1000（对数）。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 剧毒

按小鼠半数致死量，是世界第二毒的陆地蛇，仅次于内陆太攀蛇。

技能 · 住在农场边

主要吃家鼠，所以常出现在农田和城郊。

认识东部拟眼镜蛇

东部拟眼镜蛇是眼镜蛇科的剧毒蛇。

原产澳大利亚东部和中部，以及新几内亚南部。

毒液主要破坏血液凝固和循环系统。

安全 **毒蛇！野外看到不要靠近、不要抓；被咬后保持冷静、尽量少动，立刻送医。**

冷知识 和别的澳洲毒蛇比，它的毒牙很小，平均只有 2.8 mm。

分布： 澳大利亚东部和中部、新几内亚南部。