No.678 爬行两栖


杰克森变色龙

Jackson's chameleon · *Trioceros jacksonii*

LC
无危
IUCN 2014

林地 肉食

主要吃小昆虫，也吃蜈蚣、蜘蛛、蜗牛等



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

雄性体长	0–38 cm	最长 38 cm
海拔	0–6000 m	1600–2440 m
白天气温	0–50 °C	16–27 °C
性成熟	0–24 个月	5 个月

刻度：长度 10 cm–10 m（对数）；海拔 0–6000 m；温度 0–50 °C；月数 0–24 个月。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 三只角

雄性头上有三只角，属名就是“三只角”的意思。

技能 · 快速变色

像所有变色龙一样，会随心情、健康和温度很快变色。

认识杰克森变色龙

杰克森变色龙原产东非。

它生活在肯尼亚中南部和坦桑尼亚北部的林地和湿润森林。

雌性一般没有角。

冷知识 它被引入夏威夷，在那里会吃当地的陆地蜗牛。

分布： 肯尼亚、坦桑尼亚；被引入夏威夷。

资料来源：Wikipedia「Jackson's chameleon」；IUCN 红色名录（Tolley, K. 2014）。 AI 辅助制作，需人工审核。