No.725 昆虫

舞毒蛾

Spongy moth · *Lymantria dispar*


NE

未评估

NatureServe G5

林地 草食

幼虫吃多种阔叶树和针叶树的叶子



示意图

身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

扩散速度		约 21 km/年
毁林面积		3300 万公顷 约
爆发密度		250 万条/公顷
引入美国		1869 年 约

刻度：距离 1–10000 km（对数）；产量 0.1–1000 百万吨（对数）；数量 1–10 亿（对数）；数量 1–1000（对数）。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 什么叶都吃

幼虫什么树都吃，大爆发年份会造成严重破坏。

技能 · 毛毛虫

幼虫身上有一簇簇的毛。

认识舞毒蛾

舞毒蛾原产欧洲和亚洲。

它是世界百大外来入侵物种之一。

1869 年它被人带到北美，想用来产丝。

冷知识 1970 到 2013 年，它在北美累计让 3300 万公顷森林落叶。

分布： 原产欧洲和亚洲；入侵北美、非洲、南美。

资料来源：Wikipedia「Lymantria dispar」。“毁林面积（百万公顷）”借用 mt 刻度；“引入美国”比例条仅示意。 AI 辅助制作，需人工审核。