No.400 昆虫

斑衣蜡蝉

Spotted lanternfly · *Lycorma delicatula*


NE

未评估

未见评估 待核

陆地 天空 草食

最爱吸臭椿等植物汁液



身体数据 （真实数据；区间 = 常见范围）

雌体长		20–27 mm
雄体长		21–22 mm
每块卵		30–50 枚
交配		可达 4 小时

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；数量 0–100；时长 0–24 小时。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 最爱臭椿

最喜欢的寄主是同样入侵的臭椿，也吃大豆、葡萄、核果和苹果等作物。

技能 · 入侵扩散

意外传入韩国，扩散到日本、美国 21 个州和加拿大等地。

认识斑衣蜡蝉

斑衣蜡蝉原产中国部分地区和越南。

2014 年 9 月，美国宾夕法尼亚州首次确认发现它。

1845 年被命名，最早的标本采自南京附近。

冷知识 研究认为，约 −25 °C 时卵完全不能孵化。

分布： 原产中国、越南，已入侵韩国、美国等。

资料来源：Wikipedia「Spotted lanternfly」。未见 IUCN 评估（待核）。 AI 辅助制作，需人工审核。