No.383 昆虫

马铃薯甲虫

Colorado potato beetle · *Leptinotarsa decemlineata*


NE

未评估

未见评估 待核

陆地 草食

吃马铃薯等茄科植物叶子



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

成虫体长		6–11 mm
卵长		约 1 mm 约
每批卵		约 30 枚 约
向东扩散		平均每年 140 km

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；数量 0–100；距离 1–10000 km（对数）。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 十条纹

黄橙色身体，每片鞘翅上有五条粗的棕色纵纹，又叫“十线叶甲”。

技能 · 马铃薯大害虫

1859 年起在美国马铃薯田里迅速扩散，后来传到欧洲。

认识马铃薯甲虫

马铃薯甲虫最早在落基山脉被采集，当时吃的是野生的刺茄。

1811 年首次被记录。

雌虫把卵产在寄主叶片背面。

冷知识 风有时会把成虫从俄罗斯吹到芬兰。

分布： 原产北美，已传到欧洲和亚洲。

资料来源：Wikipedia「Colorado potato beetle」。未见 IUCN 评估（待核）。 AI 辅助制作，需人工审核。