No.1216 昆虫

欧洲萤

Common glow-worm · *Lampyris noctiluca*

NT


近危

IUCN 2024

陆地 林地 肉食

幼虫吃蜗牛和蛞蝓，先注入有毒的消化液使其麻痹

示意图



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

雌虫体长		12–20 mm
光可见距离		最远 45 m
能量变热		仅 2%
每次产卵		50–100 枚

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；数量 0–100；比例 0–100%；数量 0–400。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 冷光

雌虫腹部发光，几乎全部能量都变成光，只有 2% 变成热。

技能 · 麻醉猎手

幼虫给蜗牛和蛞蝓注入褐色有毒消化液，等它们不能动再吃。

认识欧洲萤

欧洲萤是欧洲常见的萤火虫，是萤属的模式种。

雌雄差别很大，雄虫比雌虫小得多。

雌虫在夏夜发光吸引雄虫。

冷知识 卵淡黄色，直径约 1 mm；产卵后成虫活不到卵孵化。

分布： 从葡萄牙、英国向东横跨欧洲和亚洲到中国（非洲也有记录）。

资料来源：Wikipedia「Lampyris noctiluca」；IUCN 红色名录（Macadam, C. 2024）。原定叶蛸科与已有卡片“叶蛸”重复，换为欧洲萤。 AI 辅助制作，需人工审核。