No.1022 农场

瘤牛

Zebu · *Bos indicus*

NE


未评估

家养动物

陆地 草食

吃草

示意图



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

驯化于		6000–7000 年前
妊娠期		平均 285 天
巴西肉牛		80% 以上
印度役用牛		6570 万头

刻度：年数 1–1 万年（对数）；天数 0–400 天；比例 0–100%；数量 1–10 亿（对数）。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 肩上驼峰

和普通黄牛不同，它肩上有脂肪驼峰、颈下有大垂皮，耳朵常下垂。

技能 · 耐热耐旱

这些特点让它更耐干旱、高温和日晒，在整个热带都有饲养。

认识瘤牛

瘤牛也叫印度牛、肩峰牛，是起源于南亚的家牛。

它来自印度原牛，在今巴基斯坦西北的梅赫尔格尔被驯化。

瘤牛被用作役畜、骑乘，也产肉和奶。

冷知识 巴西 80% 以上的肉牛（约 1.67 亿头）是纯种或杂交的翁戈尔牛（一种瘤牛）。

分布： 起源于南亚；现在热带各地都有饲养。

资料来源：Wikipedia「Zebu」。家牛的一种（种或亚种归属有争议）；印度役用牛数量为 1998 年估计。 AI 辅助制作，需人工审核。