No.342 爬行两栖

舟山眼镜蛇

Chinese cobra · *Naja atra*


VU

易危

IUCN 2014

陆地 肉食

（待核）



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

体长		1.2–1.5 m
最长		约 2 m 约
每窝蛋		6–23 枚
毒性 LD50		0.53 mg/kg

刻度：长度 10 cm–10 m（对数）；数量 0–100；体重 1 mg–10 kg（对数）。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 张开颈褶

颈部的斑纹形状多变，有眼镜形、面具形，也有马蹄形。

技能 · 神经毒

毒液含神经毒素，但现在医疗和血清充足，很少有人因此死亡。

认识舟山眼镜蛇

舟山眼镜蛇又叫中华眼镜蛇。

它是中国最常见的毒蛇之一，造成过许多咬伤事件。

雌蛇在 5 月到 7 月底产卵。

冷知识 中文维基记载，它每次攻击可排出 219 mg 毒液。

分布： 中国南部、台湾及邻近国家。

资料来源：Wikipedia「Chinese cobra」；维基百科「舟山眼镜蛇」；IUCN 红色名录（Ji 2014）。LD50 与毒液量来自中文维基（待核），毒性条按 mg/kg 数值显示。 AI 辅助制作，需人工审核。