No.354 爬行两栖

黑斑侧褶蛙

Dark-spotted frog · *Pelophylax nigromaculatus*

LC


无危

IUCN 2004

陆地 水中 肉食

（待核）

示意图



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

雄体长		约 62 mm 约
雌体长		约 74 mm 约
每窝卵		600–5000 枚
寿命		可达 13 年

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；数量 1–1000 万（对数）；寿命 0–80 年。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 低地蛙

多生活在低海拔水域，不超过 2200 m。

技能 · 耐人

比较能适应人类干扰，但面临捕猎和水污染威胁。

认识黑斑侧褶蛙

黑斑侧褶蛙又叫黑斑蛙，1861 年首次被描述。

分布在中国东部到东北、朝鲜半岛和俄罗斯阿穆尔河流域等地。

大约 2 岁成熟。

冷知识 它被引入到了土库曼斯坦、夏威夷瓦胡岛和塞班岛。

分布： 东亚。

资料来源：Wikipedia「Dark-spotted frog」；IUCN 红色名录（Kuzmin 2004）。IUCN 评估年代较早（2004 年）；卵数另有 1800–3000 的报道。 AI 辅助制作，需人工审核。