No.1159 鸟类


黑翅长脚鹬

Black-winged stilt · *Himantopus himantopus*

LC
无危
IUCN 2019

天空 水中 肉食

肉食性（维基未详述食性）



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

体长		33–36 cm
同属物种		5 种
亚种		2 个
英国断繁		27 年

刻度：长度 10 cm–10 m（对数）；数量 0–100；寿命 0–80 年。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 超长粉腿

粉红色的腿特别长，能在较深的浅水里涉水。

技能 · 黑白配色

上体黑色、下体白色，头颈白色。

认识黑翅长脚鹬

黑翅长脚鹬是分布很广的长腿涉禽。

属名 Himantopus 来自希腊语，意思是“皮带脚”。

雄鸟背部黑色带绿光，雌鸟背部偏褐。

冷知识 1987 年它在英国成功繁殖，时隔 27 年后，2014 年又在英格兰南部繁殖。

分布： 欧亚大陆、非洲（广布温暖地区的湿地）。

资料来源：Wikipedia「Black-winged stilt」; IUCN 红色名录（BirdLife International 2019）。数据较少；“英国断繁”无比较意义。 AI 辅助制作，需人工审核。