No.697 爬行两栖

圆斑蝰

Russell's viper · *Daboia russelii*

LC


无危

IUCN 红色名录

陆地 农田 肉食

主要吃啮齿类，也吃小爬行动物、陆蟹、蝎子等

示意图



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

平均全长		约 120 cm 约
最大全长		166 cm
毒牙长		16.5 mm
最高记录		2300–3000 m

刻度：长度 10 cm–10 m（对数）；长度 1 mm–1 m（对数）；海拔 0–6000 m。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 剧毒

咬伤极其疼痛，在它分布的地区被列为“四大毒蛇”之一。

技能 · 热感应

鼻上囊里的神经末梢很像其他蛇的热感受器，可能能感知热量。

认识圆斑蝰

圆斑蝰是剧毒的蝰蛇。

它分布在印度、斯里兰卡、孟加拉国、尼泊尔和巴基斯坦。

幼蛇在黄昏活动，主动捕食蜥蜴。

安全 **毒蛇！野外看到不要靠近、不要抓；被咬后保持冷静、尽量少动，立刻送医。**

冷知识 它以帕特里克·拉塞尔的名字命名，他曾用鸡和狗做实验证明它有剧毒。

分布： 印度、斯里兰卡、孟加拉国、尼泊尔、巴基斯坦。

资料来源：Wikipedia「Russell's viper」。 AI 辅助制作，需人工审核。