No.714 爬行两栖

草莓箭毒蛙

Strawberry poison dart frog · *Oophaga pumilio*


LC

无危

IUCN 红色名录

林地 肉食

吃螨虫和蚂蚁等小节肢动物，并从中获得毒素



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

颜色型	约 15–30 种
雌比雄	生物碱多 53%
毒素	pumiliotoxin 251D 约
分布国家	3 个

刻度：数量 0–100；比例 0–100%；数量 0–400。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 吃出毒性

吃下含毒的螨虫和蚂蚁后，皮肤就变得有毒。

技能 · 警戒色

有大约 15–30 种颜色型，常见的是“蓝牛仔裤”配草莓红。

认识草莓箭毒蛙

草莓箭毒蛙是中美洲的小型箭毒蛙。

它分布在尼加拉瓜中东部、哥斯达黎加和巴拿马西北部。

它不是箭毒蛙里最毒的，但是本属里最毒的。

安全 **皮肤有毒！不要用手摸，摸过两栖动物后一定要洗手。**

冷知识 雌蛙皮肤里的生物碱比雄蛙多约 53%。

分布： 尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马。

资料来源：Wikipedia「Strawberry poison-dart frog」。“毒素”比例条仅示意。 AI 辅助制作，需人工审核。