No.710 爬行两栖

负子蟾

Common Surinam toad · *Pipa pipa*


LC

无危

IUCN 2023

两栖 水中 杂食

伏击猎手，主要吃蠕虫、昆虫、甲壳类和小鱼



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

雄性		最长 154 mm
雌性		最长 171 mm
背上育儿		4–5 个月
吸食速度		12–24 毫秒

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；月数 0–24 个月；数量 0–100。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 背上孵蛋

雌蟾把卵嵌在背部皮肤的蜂窝状小坑里，4–5 个月后直接钻出小蟾蜍。

技能 · 超快吸食

没有舌头，靠瞬间张大嘴腔把猎物连水一起吸进去。

认识负子蟾

负子蟾生活在南美洲热带大部分地区和特立尼达岛。

它的眼睛很小，没有鼓膜。

侧线系统帮它找到猎物。

冷知识 它的内脏能往后挪动约身体长度的三分之一，给嘴腔腾出空间。

分布： 南美洲热带、特立尼达岛。

资料来源：Wikipedia「Common Surinam toad」；IUCN 红色名录（IUCN SSC Amphibian Specialist Group 2023）。“吸食速度（毫秒）”借用 n100 刻度。 AI 辅助制作，需人工审核。