No.487 农场

虾夷扇贝

Yesso scallop · *Mizuhopecten yessoensis*


NE

未评估

IUCN 未评估

水中 杂食

滤食浮游生物



身体数据 （真实数据；区间 = 常见范围）

最大壳长		25 cm
栖息水深		0–100 m
生长上限		18 °C
偏好水温		约 17 °C 约

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；水深 0–600 m；温度 0–50 °C。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 会积累毒素

身体组织能累积藻类产生的扇贝毒素。

技能 · 滤食

从水里滤食浮游生物。

认识虾夷扇贝

虾夷扇贝原产日本北海道一带的冷水海域。

每年 5–6 月产卵，约持续 10 天。

在中国，它常被晒成干贝，叫“日本干贝”。

安全 **赤潮期间贝类可能带毒，要买检疫合格的产品。**

冷知识 海面水温长时间低于 0 °C 时，它们会推迟产卵。

分布： 西北太平洋：日本北部、俄罗斯远东、朝鲜半岛。

资料来源：Wikipedia「Mizuhopecten yessoensis」；维基百科「虾夷盘扇贝」；SeaLifeBase「Mizuhopecten yessoensis」。毒素一句来自中文维基。 AI 辅助制作，需人工审核。