No.756 昆虫

冈比亚按蚊

Anopheles gambiae · *Anopheles gambiae*


NE

未评估

IUCN 未评估

天空 水中 寄生

雌蚊吸人血来产卵；雄蚊不吸血*



身体数据 （真实数据；区间 = 常见范围）

复合种	至少 7 种
每次产卵	50–200 粒*
卵到成虫	5–14 天*
疟原虫发育	10–21 天*

刻度：数量 0–100；数量 0–400；天数 0–400 天。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 疟疾媒介

是已知最有效的疟疾传播媒介之一，传播最危险的恶性疟原虫。

技能 · 翘尾停歇

按蚊停歇时腹部翘起，和其他蚊子不同*。

认识冈比亚按蚊

冈比亚按蚊复合体至少包含 7 个外形无法区分的种。

它在 1960 年代才被确认为复合种。

它们是撒哈拉以南非洲最重要的疟疾媒介。

安全 **会传播疟疾！去疟疾流行区要防蚊（蚊帐、驱蚊剂），出发前咨询医生。**

冷知识 1930 年它入侵巴西东北部，导致 1938–1939 年的疟疾流行。

分布： 撒哈拉以南非洲。

资料来源：Wikipedia「Anopheles gambiae」；Wikipedia「Anopheles」；维基百科「冈比亚疟蚊」。* 按蚊属级数据。雄蚊不吸血为蚊科通性，待核。 AI 辅助制作，需人工审核。