No.326 爬行两栖

伞蜥

Frilled-neck lizard · *Chlamydosaurus kingii*


LC

无危

IUCN 2017

陆地 肉食

（待核）



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

全长		约 90 cm 约
体重		可达 600 g
伞膜直径		约 30 cm 约
体温		接近 40 °C 约

刻度：长度 10 cm–10 m（对数）；体重 0.1 kg–10 t（对数）；温度 0–50 °C。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 撑开大伞

颈部的伞膜平时贴在身上，完全张开时像圆盘，直径约 30 cm。

技能 · 两脚跑

捕猎或逃跑时能用两条后腿跑。

认识伞蜥

伞蜥生活在澳大利亚北部和新几内亚南部。

在卡卡杜国家公园，雄蜥平均一天走 69 m，雌蜥 23 m。

它白天活动，早晚垂直趴在树干上晒太阳。

冷知识 约 1.7 万年前海平面较低时，它经陆桥进入新几内亚南部。

分布： 澳大利亚北部、新几内亚南部。

资料来源：Wikipedia「Frilled-neck lizard」；IUCN 红色名录（O'Shea 2017）。 AI 辅助制作，需人工审核。