No.378 昆虫

# 台湾乳白蚁

Formosan subterranean termite · *Coptotermes formosanus*


NE

未评估

未见评估 待核

陆地 草食

吃木头



示意图

## 身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

| | | |
|---|---|---|
| 每天吃木 | | 可达约 400 g |
| 卵孵化需 | | 约 20 °C 以上 约 |
| 北界 | | 很少超过北纬 35° |
| 美国分布 | | 11 个州 |

刻度：体重 1 mg–10 kg（对数）；温度 0–50 °C；数量 0–100。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

### 技能 · 吃房子

成熟蚁群最快三个月就能严重破坏一栋房子。

### 技能 · 入侵扩散

1600 年代传到日本，1800 年代后期到夏威夷，被列入世界百大外来入侵种。

## 认识台湾乳白蚁

台湾乳白蚁可能在 20 世纪中叶从新奥尔良港登陆美国。

1990 年以来，美国的扩散速度每年 5.3%（密西西比）到 8.1%（得州）。

美国平均每户损失约 1 万美元。

**冷知识** 因为卵在 20 °C 以下不孵化，它在美国只分布在南方。

**分布：** 原产中国南部和台湾，已入侵日本、夏威夷、美国南部等。

资料来源：Wikipedia「Formosan subterranean termite」；维基百科「臺灣家白蟻」。未见 IUCN 评估（待核）；扩散历史来自中文维基。 AI 辅助制作，需人工审核。