No.362 昆虫

埃及伊蚊

Yellow fever mosquito · *Aedes aegypti*

NE


未评估

未见评估 待核

天空 陆地 杂食

雌蚊吸血，雄蚊吃果汁

示意图



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

体长	4	4–7 mm
成虫寿命	2	2–4 周
吸人血比例	99	99%（泰国研究）
转基因灭蚊	90	种群减少 90% 以上

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；天数 0–400 天；比例 0–100%。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 传播疾病

能传播登革热、黄热病和基孔肯雅热等疾病。

技能 · 闻味找人

雌蚊靠人呼出的二氧化碳和皮肤的乳酸等气味找到目标。

认识埃及伊蚊

埃及伊蚊身上有黑白斑纹，胸部背面有琴形白纹。

它原产北非，现已扩散到热带、亚热带和温带地区。

只有雌蚊吸血，用来让卵成熟。

冷知识 卵在干燥状态下能存活一年以上。

分布： 原产北非，现遍布热带和亚热带。

资料来源：Wikipedia「Aedes aegypti」。未见 IUCN 评估（待核）；转基因 OX513A 试验在开曼群岛、巴西、巴拿马进行。 AI 辅助制作，需人工审核。