No.1267 蛛形甲壳

棕色隐士蜘蛛

Brown recluse · *Loxosceles reclusa*


NE

未评估

未见评估（待核）

陆地 室内 肉食

（维基未详述食性）



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

体长	6–20 mm	
每个卵囊	约 50 粒卵	约
咬伤坏死	37% 病例	
全身症状	14% 病例	

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；数量 0–100；比例 0–100%。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 小提琴斑

头胸部背面有像小提琴的深色花纹，所以也叫“小提琴蛛”。

技能 · 坏死毒液

毒液会引起皮肤坏死，咬伤后 2–8 小时开始疼痒。

认识棕色隐士蜘蛛

棕色隐士蜘蛛是刺客蛛科的隐士蛛。

它和黑寡妇是北美仅有的两种危险毒蛛。

很多“隐士蛛咬伤”其实是误诊，它没有在加州定居。

安全 **咬伤可能造成皮肤坏死，被咬后要尽快就医。**

冷知识 疼痛在咬伤后 12–36 小时加重，之后几天出现坏死。

分布： 美国南部和中部：得克萨斯中部到佐治亚西部，北到肯塔基。

资料来源：Wikipedia「Brown recluse spider」。 AI 辅助制作，需人工审核。