No.1274 蛛形甲壳

# 蓖麻硬蜱

Castor bean tick · *Ixodes ricinus*


NE

未评估

未见评估（待核）

林地 陆地 寄生 三个阶段各吸一次血；成虫吸羊、牛、狗、鹿、人和马的血

示意图



## 身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

| | | |
|---|---|---|
| 雌蜱吸饱 | | 最长 11 mm |
| 雌蜱未吸血 | | 3.0–3.6 mm |
| 雄蜱 | | 2.4–2.8 mm |
| 成虫吸血 | | 6–13 天 |

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；天数 0–400 天。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

### 技能 · 三个宿主

幼虫、若虫、成虫各找一个宿主吸血，吸饱就掉下来。

### 技能 · 传播疾病

能传播莱姆病和蜱传脑炎等病原体。

## 认识蓖麻硬蜱

蓖麻硬蜱是主要分布在欧洲的硬蜱。

它喜欢比较潮湿的地方，夏季干燥的地中海大部地区没有。

被它叮咬还可能让人对红肉过敏（α-gal 综合征）。

**安全** **去草丛林地穿长衣裤，回家检查身体；被叮后发热出疹要就医。**

**冷知识** 幼虫不主动找宿主，通常吸食鼩鼱、刺猬等食虫类的血。

**分布：** 欧洲为主。

资料来源：Wikipedia「Ixodes ricinus」。 AI 辅助制作，需人工审核。