No.988 蘑菇

硫磺菌

Chicken of the woods · *Laetiporus sulphureus*


NE

未评估

IUCN 未评估

朽木 林地 腐生

分解枯木、落叶等获取养分



真菌数据 （真实数据；区间 = 常见范围）

每层宽		5–60 cm
厚		4–12 cm
纪录		45 kg
不良反应		约 10% 人

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；体重 0.1 kg–10 t（对数）；比例 0–100%。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 层层架子

一层层橙黄色的“架子”长在树上。

技能 · 木栖腐生

长在树木上分解木材（中文维基）。

认识硫磺菌

硫色绚孔菌是一种长在树上的多孔菌。

广泛分布在欧亚大陆和美洲。

和许多多孔菌不同，它幼时可以吃。

安全 **生吃有毒，也有人吃后肠胃不适。千万不要采食野生蘑菇。**

冷知识 1990 年英国新森林发现了一个重 45 kg 的，创下吉尼斯纪录。

分布： 欧亚、美洲。

资料来源：Wikipedia「Laetiporus sulphureus」；维基百科「硫色绚孔菌」。未查到 IUCN 全球评估。 AI 辅助制作，需人工审核。